



Resumen de Avistamientos, Julio - Diciembre 2016

por Rodrigo Barros y la red de observadores de aves

Albatros de frente blanca (*Thalassarche cauta*), salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso), 12 noviembre 2016, foto Ivo Tejeda.

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de Julio y Diciembre de 2016, y que llegaron principalmente a través de la base de datos eBird, administrada en el país por la ROC.

¡¡¡Si haces observaciones de aves, tus datos siempre serán muy bienvenidos!!!


Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema eBird. Con eBird puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten. Mientras más información agregues a tus avistamientos, como cantidad, edad, sexo o comportamiento de reproducción, más interesantes y útiles serán tus datos.

Si necesitas información sobre identificación o distribución de las aves en Chile, si quieres anunciar el avistamiento de un ave rara o si tienes cualquier duda sobre las aves chilenas, no dudes en participar en el e-group ObsChile.

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los siguientes 118 observadores:

Jorge Abarca, Verónica Araya, Christian Artuso, Ignacio Azócar, Rubén Barraza, Rodrigo Barros, Josh Beck, Bonnie Bedzin, Chandra Biggerstaff, José Ignacio Briones, Christopher Burney, Pablo Cáceres, Rodrigo Calderón, Santiago Carvalho, César Chávez, Romina Chiappe, Patrich Cerpa, Carolyn Cimino, Rodrigo Condemarín, Nelson Contardo, Humberto Cortés, William Cullen, Maximiliano Daigre, Darío de la Fuente, Jean Paul de la Harpe, Fernando Díaz, Virginia Fairchild, Boris Farías, Vanesa Fernández, Mario Figueroa, Marcelo Flores, Edwin French, Jorge Fuentes, Juan Pablo Gabella, Facundo Gandoy, Matías Garrido, Carlos Gutiérrez, Francisco Guzmán, Kenji Hamasaki, Mark Hauswald, Brendan Higgins, Kristen Horton, Chris Howard, Rosie Howard, Steve Howell, Daniel Imbernón, Santiago Imberti, Cristopher Jara, Álvaro Jaramillo, Tom Johnson, Mats Jonasson, Nancy Kerr, Gonzalo Labarrera, Fidel Lara, Inti Lefort, José López, Juan Eduardo Machuca, Giselle Mangini, Daniel Martínez, Klaudio Maturana, Ricardo Matus, Fernando Medrano, Oscar Mercado, Alberto Minoletti, Santiago Montaner, Diego Monteleone, Charly Moreno, María Fernanda Mosqueira, Eduardo Navarro, Heraldo Norambuena, Gabriel Normand, Freddy Olivares, Luis Olivares, Marcelo Olivares, Ulises Ornstein, Rodrigo Ortega, Nelson Palma, Dionisio Paniagua, Vicente Pantaja, Edward Paxton, Jean Perata, Ronny Peredo, Cristián Pinto, César Piñones, Cristina Pita, Cristóbal Pizarro, Laura Portugal, Andrés Puiggros, Eduardo Quintanilla, Robert Rackliffe, Diego Reyes, Rodrigo Reyes, Juan Pablo Rider, Jessica Rodríguez, Sebastián Saiter, Caroline Sánchez, Fabrice Schmitt, Miguel Selman, Christiane Shannon, Ariel Silva, José Manuel Silva, Rodrigo Silva, Jilian Soller, Cristina Soto, Emilie Strauss, Rodrigo Tapia, Ivo Tejada, Jorge Toledo, Simon Tonge, Marcelo Torrejón, Leo Ugarte, Gilda Valderrama, María José Valencia, Jorge Valenzuela, Diego Valverde, Jean-Christophe Vandeveld, Ana María Venegas, Claudio Vidal.

Los avistamientos particularmente raros para los cuales no recibimos "prueba" (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un *.





Perdiz austral (*Tinamotis ingoufi*), camino a Punta Delgada, San Gregorio (Reg. Magallanes), 19 septiembre 2016, foto Sebastián Saitel.

Perdiz austral (*Tinamotis ingoufi*): Con pocos registros en el país, destacan varios avistamientos para la temporada en el área comprendida entre San Gregorio y Punta Delgada (Reg. Magallanes), entre el 19.09 y 04.11 (C. Biggerstaff, W. Cullen, F. Díaz, M. Figueroa, E. Paxton, C. Pizarro, J.P. Rider, S. Saiter, F. Schmitt, C. Shannon, R. Tapia), con un máximo de 6 ejemplares observados el 22.09 en la Estancia Los Primos, San Gregorio (R. Matus, R. Silva).

Caiquén (*Chloephaga picta*): Raro en la costa de la zona central, 1 macho es fotografiado en la desembocadura del río Maipo (Reg. Valparaíso) el 06.10 (N. Contardo, M. Garrido, K. Hamasaki, C. Soto).

Pimpollo tobiano (*Podiceps gallardoi*): Siempre escaso en Chile, nuevamente 1 ejemplar está presente en Laguna Amarga, Parque Nacional Torres del Paine (Reg. Magallanes) entre el 14 y 16.10 (C. Cimino, S. Imberti, S. Saiter, C. Vidal).

Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*): Al norte de su rango habitual son observados 2 ejemplares en salidas pelágicas frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 27.10 y 02.11 (Ch. Moreno, A. Jaramillo, R. Matus, B. Bedzin, V. Fairchild, C. Howard, R. Howard, J. Perata, R. Rackliffe, E. Strauss).

Albatros de Buller (*Thalassarche bulleri*): 1 ejemplar es fotografiado en una salida pelágica frente a la isla de Robinson Crusoe (Reg. Valparaíso) el 20.11 (F. Schmitt), correspondiendo al primer registro de esta especie para el archipiélago de Juan Fernández.

Albatros de frente blanca (*Thalassarche cauta*): Con solo 3 registros con evidencia para esta especie en el país, destaca la observación de 2 ejemplares en la temporada, en salidas pelágicas frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso): uno el 07.11 (P. Cáceres, F. Medrano) y el otro el 12.11 (P. Cáceres, M. Garrido, M. Hauswald, B. Higgins, N. Kerr, J. Soller, I. Tejada).

Albatros de Chatham (*Thalassarche eremita*): 1 ejemplar es observado en una salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso) el 09.07 (P. Cáceres, R. Condemarín, F. Díaz, M. Flores, E. French, M. Garrido, K. Maturana, F. Medrano, S. Montaner, E. Navarro, F. Olivares, C. Pinto, C. Sánchez, M. Selman, R. Silva); otro ejemplar está presente en la misma área el 12.11. (P. Cáceres, M. Garrido, M. Hauswald, B. Higgins, N. Kerr, J. Soller, I. Tejada); y un tercer ejemplar se informa para el mismo sitio el 10.12 (F. Díaz, M. Garrido, R. Calderón, C. Gutiérrez, E. Quintanilla, M.F. Mosqueira, G. Normand, M.J. Valencia).



Arriba Izq.: **Caiquén** (*Chloephaga picta*), desembocadura del río Maipo (Reg. Valparaíso), 06 octubre 2016, foto Nelson Contardo. Arriba Der.: **Pimpollo tobiano** (*Podiceps gallardoi*), Laguna Amarga, Parque Nacional Torres del Paine (Reg. Magallanes), 14 octubre 2016, foto Claudio Vidal. Abajo Izq.: **Pingüino de Magallanes** (*Spheniscus magellanicus*), salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota), 27 octubre 2016, foto Charly Moreno. Abajo Der.: **Albatros de Buller** (*Thalassarche bulleri*), salida pelágica frente a la isla de Robinson Crusoe (Reg. Valparaíso), 20 noviembre 2016, foto Fabrice Schmitt.

Albatros de las Galápagos (*Phoebastria irrorata*)*: Con muy pocos registros en el país, 1 ejemplar se observa en la isla San Ambrosio (Reg. Valparaíso) el 22.10 (D. Valverde), correspondiendo al primero informado para las Islas Desventuradas.

Fardela del Pacífico (*Ardenna pacifica*): En una salida pelágica frente a Isla de Pascua (Reg. Valparaíso), es fotografiado 1 ejemplar el 21.10 (K. Horton, M. Olivares), correspondiendo al segundo registro con evidencia publicada para esta especie en la Isla.

Fardela atlántica (*Puffinus puffinus*): 1 ejemplar es fotografiado en una salida pelágica frente a Quintero (Reg. Valparaíso) el 27.11 (F. Schmitt, S. Howell); otro es avistado en el Estrecho de Magallanes (Reg. Magallanes) el 14.12 (R. Reyes); 1 ejemplar es observado en la desembocadura del

río Marazzi (Reg. Magallanes) el 16.11. (A. Jaramillo); y uno más en la zona del Cabo de Hornos (Reg. Magallanes) el 16.12 (S. Tonge, T. Johnson).

Piquero de patas azules (*Sula nebouxii*): 1 ejemplar es observado en la península Alacrán, Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 21.09 (Ch. Moreno); 6 ejemplares se registran en una salida pelágica desde Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 07.08 (R. Barros, F. Díaz, F. Medrano, Ch. Moreno, R. Peredo, C. Pinto, A. Puiggros) y 1 ejemplar está presente en la misma área el 02.11 (A. Jaramillo, R. Matus, B. Bedzin, V. Fairchild, C. Howard, R. Howard, J. Perata, R. Rackliffe, E. Strauss); 1 ejemplar es fotografiado en Punta Huanillos (Reg. Tarapacá) el 03.09 (F. Gandoy, G. Mangini); y 1 ejemplar está presente en el Islote González, en las islas Desventuradas (Reg. Valparaíso) el 22.10 (D. Valverde).



Arriba: **Albatros de frente blanca** (*Thalassarche cauta*), salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso), 07 noviembre 2016, foto Pablo Cáceres. Centro Izq.: **Albatros de Chatham** (*Thalassarche eremita*): salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso), 09 julio 2016, foto Freddy Olivares. Centro Der.: **Albatros de Chatham** (*Thalassarche eremita*) salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso), 09 noviembre 2016, foto Fabrice Schmitt. Abajo Izq.: **Albatros de Chatham** (*Thalassarche eremita*) salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso), 12 noviembre 2016, foto Matías Garrido. Abajo Der.: **Albatros de Chatham** (*Thalassarche eremita*) salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso), 10 diciembre 2016, foto Matías Garrido.



Arriba Izq.: **Fardela del Pacífico** (*Ardenna pacifica*), altamar frente a Isla de Pascua (Reg. Valparaíso), 21 octubre 2016, foto Marcelo Olivares. Arriba Der.: **Fardela atlántica** (*Puffinus puffinus*), salida pelágica frente a Quintero (Reg. Valparaíso), 27 noviembre 2016, foto Steve Howell. Abajo Izq.: **Piquero de patas azules** (*Sula nebouxii*), salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota), 07 agosto 2016, foto Jorge Abarca. Abajo Der.: **Pelicano pardo** (*Pelecanus occidentalis*), puerto de Arica (Reg. Arica y Parinacota), 27 octubre 2016, foto Pío Marshall.

Pelicano pardo (*Pelecanus occidentalis*): 1 ejemplar se registra en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 03.11 (A. Jaramillo, R. Matus, B. Bedzin, V. Fairchild, C. Howard, R. Howard, J. Perata, R. Rackliffe, E. Strauss); y otro ejemplar es fotografiado en el puerto de Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 27.10 (Ch. Moreno).

Garza tricolor (*Egretta tricolor*): Permanece 1 ejemplar en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 17.07 y 13.08 (R. Barros, F. Díaz, F. Medrano, Ch. Moreno, F. Olivares, R. Peredo, C. Pinto, A. Puiggros, A. Silva), probablemente el mismo individuo informado en la temporada anterior.

Huairavo de corona amarilla (*Nyctanassa violacea*): 1 ejemplar se observa en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 08 y 23.09 (Ch. Moreno, R. Peredo); y en el puerto de Arica (Reg. Arica y Parinacota), 3 y 2 ejemplares están presentes el 07 y 13.08 respectivamente (R. Barros, F. Díaz, F. Medrano, Ch. Moreno, F. Olivares, R. Peredo, C. Pinto, A. Puiggros).

Tagüita purpúrea (*Porphyrio martinicus*): Con muy pocos registros en el país, 1 juvenil está presente en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 23.10 y el 30.11 (P. Cerpa, M. Garrido, I. Lefort, F. Medrano, I. Azócar, R. Barros, B. Bedzin, F. Díaz, V. Fairchild, Chris Howard, Rosie Howard, A. Jaramillo, R. Matus, O. Mercado,



Arriba Izq.: **Garza tricolor** (*Egretta tricolor*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 03 agosto 2016, foto Cristián Pinto. Arriba Der.: **Huairavo de corona amarilla** (*Nyctanassa violacea*) puerto de Arica (Reg. Arica y Parinacota), 07 agosto 2016, foto Charly Moreno. Centro: **Tagüita purpúrea** (*Porphyrio martinicus*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 27 octubre 2016, foto Pío Marshall. Abajo Izq.: **Tagua chica** (*Fulica leucoptera*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 27 noviembre 2016, foto Charly Moreno. Abajo Der.: **Tagua chica** (*Fulica leucoptera*), Tranque Sobraya (Reg. Arica y Parinacota), 01 noviembre 2016, foto Charly Moreno.



Carau (*Aramus guarauna*), Huentelauquén Sur (Reg. Coquimbo), 05 septiembre 2016, foto Gonzalo Labarrera.

A. Minoletti, Ch. Moreno, E. Navarro, H. Norambuena, L. Olivares, R. Ortega, J. Perata, R. Peredo, C. Pinto, R. Rackliffe, R. Reyes, E. Strauss, I. Tejada, J.C. Valdevelde, J. Valenzuela, G. Valderrama).

Tagua chica (*Fulica leucoptera*): Al norte de su distribución conocida, entre 1 y 2 ejemplar están presente en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 21.10 y el 27.11 (I. Azócar, R. Barros, B. Bedzin, Ch. Biggerstaff, P. Cerpa, W. Cullen, F. Díaz, V. Fairchild, J. Fuentes, M. Garrido, C. Howard, R. Howard, A. Jaramillo, I. Lefort, R. Matus, F. Medrano, O. Mercado, A. Minoletti, Ch. Moreno, E. Navarro, H. Norambuena, L. Olivares, E. Paxton, J. Perata, C. Pinto, R. Rackliffe, Ch. Shannon, F. Schmitt, E. Strauss, I. Tejada, J.C. Valdevelde, J. Valenzuela, G. Valderrama); y entre 1 y 2 ejemplares se observan en el Tranque Sobraya (Reg. Arica y Parinacota) entre el 14.10 y 08.12 (I. Azócar, B. Bedzin, F. Díaz, V. Fairchild, C. Howard, R. Howard, A. Jaramillo, R. Matus, O. Mercado, A. Minoletti, Ch. Moreno, E. Navarro, L. Olivares, J. Perata, C. Pinto, R. Rackliffe, F. Schmitt, E. Strauss, I. Tejada, J.C. Valdevelde, J. Valenzuela, G. Valderrama).

Carau (*Aramus guarauna*): Sorprende el encuentro de 1 ejemplar en Huentelauquén Sur (Reg. Coquimbo), observado entre el 01 y 05.09 (C. Piñones, R. Barros, F. Díaz, G. Labarrera, D. Martínez, E. Navarro, R. Ortega, R. Reyes, R. Silva), correspondiendo al primer registro de esta especie en el país. Para mayor información, se sugiere revisar el artículo sobre este avistamiento aparecido en La Chiricoca N° 22.

Chorlo de la puna (*Charadrius alticola*): Extremadamente raro en el borde costero, 1 ejemplar está presente en el humedal de Los Choros (Reg. Coquimbo) entre el 15.08 y 25.09 (P. Cáceres, K. Maturana, R. Barraza, H. Cortés, F. Olivares, L. Ugarte).

Playero vuelvepiedra (*Arenaria interpres*): Raro en tierras interiores, 1 ejemplar se registra en la laguna de Batuco (Reg. Metropolitana) entre el 25 y 27.11 (C. Pinto, N. Contardo, E. French, S. Montaner, G. Normand, L. Portugal).

Playero canela (*Calidris subruficollis*): 1 ejemplar está presente en la desembocadura del río Lluta



Arriba Izq.: **Chorlo de la puna** (*Charadrius alticola*), humedal de Los Choros (Reg. Coquimbo), 25 septiembre 2016, foto Freddy Olivares. Arriba Der.: **Playero canela** (*Calidris subruficollis*): 1 ejemplar está presente en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 06 diciembre 2016, foto Fabrice Schmitt. Centro Izq.: **Playero occidental** (*Calidris mauri*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 08 diciembre 2016, foto Charly Moreno. Centro Der.: **Playero occidental** (*Calidris mauri*), humedal de Los Choros (Reg. Coquimbo), 25 septiembre 2016, foto Freddy Olivares. Abajo: **Playero vuelvepiedra** (*Arenaria interpres*), laguna de Batuco (Reg. Metropolitana), 25 noviembre 2016, foto Cristián Pinto.



Pollito de mar boreal (*Phalaropus lobatus*), salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota), 07 agosto 2016, foto Andrés Puiggros.

(Reg. Arica y Parinacota) entre el 05 y 15.12 (F. Medrano, H. Norambuena, V. Araya, J. Fuentes, C. Gutiérrez, Ch. Moreno, A. Puiggros, F. Schmitt, M.J. Valencia).

Playero occidental (*Calidris mauri*): entre 1 y 2 ejemplares son observados en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 27.10 y 08.12 (R. Barros, H. Norambuena, V. Araya, J. Fuentes, F. Medrano, Ch. Moreno, E. Navarro, R. Ortega, A. Puiggros, R. Reyes, F. Schmitt); y nuevamente 1 ejemplar se registra en el humedal de Los Choros (Reg. Coquimbo) entre el 28.08 y 17.11 (H. Cortés, S. Saiter, R. Barraza, F. Guzmán, F. Olivares, L. Ugarte).

Pollito de mar boreal (*Phalaropus lobatus*): Con muy pocas evidencias de su presencia en el país, destaca el registro de 1 ejemplar en una salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 07.08 (R. Barros, F. Díaz, F. Medrano, Ch. Moreno, R. Peredo, C. Pinto, A. Puiggros).

Gaviota de las Galápagos (*Creagrus furcatus*): Varios registros en salidas pelágicas frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota), con 1 ejemplar obser-

vado el 07.08 (R. Barros, F. Díaz, F. Medrano, Ch. Moreno, R. Peredo, C. Pinto, A. Puiggros), 3 ejemplares el 20.10 (F. Díaz, M. Garrido, F. Medrano), 1 ejemplar el 22.10 (F. Díaz, I. Azócar, O. Mercado, A. Minoletti, E. Navarro, L. Olivares, C. Pinto, I. Tejeda, J.C. Vandeveld, J. Valenzuela, G. Valde-rrama), y uno más el 01.11 (E. Navarro); 15 ejemplares son observados en la Isla San Ambrosio (Reg. Valparaíso) el 22.10 (D. Valverde); y 1 ejemplar es fotografiado en una salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso) el 10.09 (S. Carvalho, M. Daigre, K. Hamasaki, F. Medrano, E. Navarro, C. Pinto, A. M. Venegas).

Gaviota de Sabine (*Xema sabini*): 1 ejemplar se observa en salidas pelágicas frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 07.08 (R. Barros, F. Díaz, F. Medrano, Ch. Moreno, R. Peredo, C. Pinto, A. Puiggros), el 01.11 (E. Navarro), y el 02.11 (A. Jaramillo, R. Matus, B. Bedzin, V. Fairchild, C. Howard, R. Howard, J. Perata, R. Rackliffe, E. Strauss); 2 ejemplares más son fotografiados en una salida pelágica frente a Quintero (Reg. Valparaíso) el 27.11 (F. Schmitt); 1 ejemplar de la misma especie es fotografiado en la desembocadura del río Aconcagua (Reg. Valparaíso) el 01.09 (K. Maturana); otro ejemplar se informa para un pelágico frente



Arriba: **Gaviota de las Galápagos** (*Creagrus furcatus*) y **Gaviota de Sabine** (*Xema sabini*), salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota), 07 agosto 2016, foto Charly Moreno. Centro Izq.: **Gaviota de las Galápagos** (*Creagrus furcatus*) salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso), 10 septiembre 2016, Santiago Carvalho. Centro Der.: **Gaviota de Sabine** (*Xema sabini*), salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota), 01 noviembre 2016, foto Eduardo Navarro. Abajo Izq.: **Gaviota de Sabine** (*Xema sabini*), salida pelágica frente a Quintero (Reg. Valparaíso), 27 noviembre 2016, foto Fabrice Schmitt. Abajo Der.: **Gaviota de Sabine** (*Xema sabini*), desembocadura del río Aconcagua (Reg. Valparaíso), 01 septiembre 2016, foto Klaudio Maturana.



Arriba Izq: **Gaviota reidora** (*Leucophaeus atricilla*), desembocadura del río Carampangue (Reg. Bío-Bío), 01 julio 2016, foto Romina Chiappe. Arriba Der.: **Gaviotín apizarrado** (*Onychoprion fuscatus*), desembocadura del río Elqui (Reg. Coquimbo), 10 diciembre 2016, foto Jorge Toledo. Abajo Izq.: **Gaviotín apizarrado** (*Onychoprion fuscatus*), desembocadura del río Maipo (Reg. Valparaíso), 14 diciembre 2016, foto Patricia Pagano. Abajo Der.: **Gaviotín apizarrado** (*Onychoprion fuscatus*), salida pelágica frente a la isla Robinson Crusoe (Reg. Valparaíso), 21 noviembre 2016, foto Steve Howell.

a Valparaíso (Reg. Valparaíso) el 10.12 (F. Díaz, M. Garrido, R. Calderón, C. Gutiérrez, E. Quintanilla, M.F. Mosqueira, G. Normand, M.J. Valencia); y 1 ejemplar se observa en el Golfo de Arauco (Reg. Bío-Bío) el 29.12 (C. Artuso, B. Farías, J. E. Machuca).

Gaviota reidora (*Leucophaeus atricilla*): Sorprende la observación de 1 ejemplar en la desembocadura del río Carampangue (Reg. Bío-Bío) el 01.07 (R. Chiappe), correspondiendo al registro más austral conocido para la especie en Chile.

Gaviotín apizarrado (*Onychoprion fuscatus*): Raro en la costa del continente, 1 ejemplar es fotografiado en la desembocadura del río Elqui (Reg. Co-

quimbo) el 10.12 (D. Martínez, J. Toledo) y otro más en la desembocadura del río Maipo (Reg. Valparaíso) el 14.12. (D. Monteleone, U. Ornstein, C. Pita). Por otro lado, también raro en el archipiélago de Juan Fernández, en una salida pelágica frente a la isla Robinson Crusoe (Reg. Valparaíso) se observan 4 ejemplares el 21.11 (S. Howell).

Gaviotín chico boreal (*Sternula antillarum*): Nuevamente se observa en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), con 1 y 2 ejemplares presentes entre el 21.07 y el 04.11 (R. Barros, P. Cerpa, F. Díaz, J. Fuentes, M. Garrido, I. Lefort, F. Medrano, Ch. Moreno, H. Norambuena, F. Olivares, R. Ortega, R. Peredo, A. Puiggros); y sorpren-



Arriba: **Gaviotín chico boreal** (*Sternula antillarum*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 21 julio 2016, foto Ronny Peredo. Abajo: **Gaviotín chico boreal** (*Sternula antillarum*), humedal de Pachingo, Tongoy (Reg. Coquimbo), 12 octubre 2016, foto Marcelo Torrejón.

Arriba: **Gaviotín de pico negro** (*Gelochelidon nilotica*), desembocadura del río Lluta, (Reg. Arica y Parinacota), 15 noviembre 2016, foto Jorge Fuentes. Abajo: **Gaviotín de pico negro** (*Gelochelidon nilotica*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 18 noviembre 2016, foto Verónica Araya.





Arriba: **Gaviotín negro** (*Chlidonias niger*), salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota), 22 octubre 2016, foto Fernando Díaz. Abajo: **Gaviotín de Sandwich** (*Thalasseus sandwicensis*), desembocadura del río Maipo (Reg. Valparaíso), 04 diciembre 2016, foto Nelson Palma.



Arriba Izq.: **Suirirí boreal** (*Tyrannus tyrannus*), valle del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 27 octubre 2016, foto Heraldo Norambuena. Arriba Der.: **Suirirí boreal** (*Tyrannus tyrannus*), Sierra Gorda (Reg. Antofagasta), 13 diciembre 2016, foto Patrich Cerpa. Abajo: **Cazamoscas tijereta** (*Tyrannus savana*), sur de Cuya (Reg. Arica y Parinacota), primera quincena de diciembre 2016, foto Diego Reyes.



Golondrina doméstica (*Progne chalybea*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 27 noviembre 2016, foto Jorge Fuentes.

de la presencia de 1 ejemplar en el humedal de Pachingo, Tongoy (Reg. Coquimbo) el 12.10 (M. Torrejón).

Gaviotín de pico negro (*Gelochelidon nilotica*): Con muy pocos registros en Chile, entre 1 y 6 ejemplar son observados en la desembocadura del río Lluta y playa Las Macha (Reg. Arica y Parinacota) entre el 13 y 18.11 (V. Araya, J. Fuentes, F. Lara).

Gaviotín negro (*Chlidonias niger*): Sorprende el avistamiento de 4 ejemplares en una salida pelágica frente a Arica, el 22.10 (F. Díaz, I. Azócar, O. Mercado, A. Minoletti, E. Navarro, L. Olivares, C. Pinto, I. Tejada, JC Vandavelde, J. Valenzuela, G. Valderrama), correspondiendo a las primeras fotografías de esta especie en Chile, la que cuenta con solo 3 registros anteriores en el país: una piel de 1859 y dos registros visuales.

Gaviotín de Sandwich (*Thalasseus sandvicensis*): 1 ejemplar se observa en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 13.11 (F. Schmitt, Ch. Biggerstaff, W. Cullen, C. Shannon, E. Pax-

ton); otro más está presente en una salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 09.12 (F. Schmitt); y entre 1 y 3 ejemplares son registrados en la desembocadura del río Maipo (Reg. Valparaíso) entre el 21.11 y 14.12 (C. Burney, V. Fernández, C. Gutiérrez, D. Monteleone, U. Ornstein, N. Palma, D. Paniagua, C. Pita, M.J. Valencia).

Vencejo de chimenea (*Chaetura pelagica*)*: se registra en el valle del Lluta (Reg. Arica y Parinacota), con 1 ejemplar en Molinos el 12.12 (C. Burney) y otro en Linderos el 25.12 (J. Beck).

Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*): 1 ejemplar es fotografiado en el valle del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), el 27.10 (R. Barros, H. Norambuena); y otro está presente en Sierra Gorda (Reg. Antofagasta) el 13.12 (P. Cerpa).

Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*): 1 ejemplar es fotografiado al sur de Cuya (Reg. Arica y Parinacota) en la primera quincena de diciembre (D. Reyes) y otro ejemplar se observa en el valle



Tenca de alas blancas (*Mimus triurus*). Arriba Izq.: Baquedano (Reg. Antofagasta), 16 julio 2016, foto Charly Moreno. Arriba Der.: Isla Choros (Reg. Coquimbo), 14 noviembre 2016, foto César Chávez. Centro Izq.: Embalse La Laguna (Reg. Coquimbo), 19 noviembre 2016, foto Marcelo Olivares. Centro Der.: La Colorada (Reg. Coquimbo), 19 noviembre 2016, foto Marcelo Olivares. Abajo Izq.: Colina (Reg. Metropolitana), 15 agosto 2016, foto Jean Paul de la Harpe. Abajo Der.: Calle Tobalaba, La Reina (Reg. Metropolitana), 24 septiembre 2016, foto Juan Pablo Gabella.



Chirihue de Raimondi (*Sicalis raimondii*), valle de Chaca (Reg. Arica y Parinacota), 16 noviembre 2016, foto Fabrice Schmitt.

de Chaca (Reg. Arica y Parinacota) el 30.12 (Ch. Moreno).

Golondrina doméstica (*Progne chalybea*): 1 ejemplar es observado en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 27.11 y el 10.12 (J. Fuentes, Ch. Moreno, V. Araya, F. Medrano, H. Norambuena, A. Puiggros, F. Schmitt), obteniéndose imágenes que confirman la presencia de esta especie en el país.

Tenca de alas blancas (*Mimus triurus*): Se informa de 9 registros para la temporada: 1 ejemplar observado en Baquedano (Reg. Antofagasta) el 16.07 (Ch. Moreno); 1 ejemplar en Isla Choros (Reg. Coquimbo) el 14.11 (C. Chávez); 1 ejemplar en Punta Lengua de Vaca (Reg. Coquimbo) el 13.11 (M. Olivares); 1 ejemplar en el Embalse La Laguna (Reg. Coquimbo) el 19.11 (M. Olivares); 1 ejemplar en La Colorada (Reg. Coquimbo) el 19.11 (M. Olivares); 1 ejemplar en Papudo (Reg. Valparaíso) el 17.09 (C. Jara); 1 ejemplar en el estero Mantagua (Reg. Valparaíso) el 31.10 (M. Jonasson); 1 ejemplar en Colina (Reg. Metropolitana) el 15.08 (J.P. del Harpe); 1 ejemplar en calle Tobalaba, La Reina (Reg. Metropolitana), entre el 11.08 y 24.09 (O. Mercado,

I. Azócar, R. Barros, R. Calderón, N. Contardo, D. de la Fuente, F. Díaz, E. French, J.P. Gabella, M. Garrido, K. Hamasaki, E. Navarro, V. Pantoja, C. Pinto, L. Portugal, C. Sánchez, R. Silva, C. Soto, I. Tejada, G. Valderrama); y 1 ejemplar en Rulos, Embalse Colbún (Reg. Maule) el 30.07 (J. López).

Chirihue de Raimondi (*Sicalis raimondii*): 40 ejemplares son observados en la quebrada de Chiza (Reg. Tarapacá) el 05.08 (R. Barros, F. Díaz, F. Medrano, R. Peredo), y otros 10 el 08.08 (C. Pinto), correspondiendo a los primeros registros conocidos de esta especie en Chile, observaciones que se detallan en un artículo de La Chiricoca N° 21. A lo anterior se suman otros registros en la temporada, en el mismo sitio y en los valles de Chaca y Camarones (Reg. Arica y Parinacota). Destaca un gran grupo de entre 100 y 300 ejemplares observados en campos de alfalfa del valle de Camarones (sector de Cuya), y en laderas rocosas donde se les observó vocalizar activamente y entrar a cavidades. (V. Araya, R. Barros, C. Biggerstaff, W. Cullen, F. Díaz, F. Medrano, O. Mercado, A. Minoletti, Ch. Moreno, E. Navarro, H. Norambuena, E. Paxton, C. Pinto, A. Puiggros, F. Schmitt, C. Shannon, I. Tejada, G. Valderrama).

OTROS REGISTROS

Como en otras oportunidades, de forma separada informamos de registros interesantes que llegaron recientemente a nuestra base de datos, y que se refieren a observaciones realizadas con anterioridad al período que cubre el presente Resumen de Avistamientos.

Jacana (*Jacana jacana*): En el sector de Puerto Los Lloles, ribera sur del río Calcurrupe (Reg. Los Ríos) es fotografiado un ejemplar juvenil el 30.04.2015 (J.I. Briones, J. Rodríguez), correspon-

diendo al tercer registro documentado para esta especie en Chile.

Gaviotín apizarrado (*Onychoprion fuscatus*): En la desembocadura del río Aconcagua (Reg. Valparaíso), 1 ejemplar es fotografiado el 02.01.2008 (M. Jonasson).

Benteveo (*Pitangus sulphuratus*): 2 ejemplares* son observados en Casa Chueca (Reg. Maule) el 06.03.2016 (D. Imbernón); y 1 ejemplar es fotografiado en Las Quemadas, Osorno (Reg. Los Lagos) el 14.06.2016 (J. M. Silva).



Arriba: **Jacana** (*Jacana jacana*), Puerto Los Lloles, ribera sur del río Calcurrupe (Reg. Los Ríos), 30 abril 2015, foto José Ignacio Briones. Abajo Izq.: **Gaviotín apizarrado** (*Onychoprion fuscatus*), desembocadura del río Aconcagua (Reg. Valparaíso), 02 enero 2008, foto Mats Jonasson. Abajo Der.: **Benteveo** (*Pitangus sulphuratus*), Las Quemadas, Osorno (Reg. Los Lagos) el 14 junio 2016, foto José Manuel Silva.