

Algunas evidencias inéditas de aves raras en Chile

por Rodrigo Barros




Figura 1. Cigüeña de cabeza pelada (*Mycteria americana*), mayo de 1989, embalse Huechún (Reg. Met.), foto de Juan Aguirre.

En el presente artículo se publican por primera vez algunas fotografías de especies cuyo estatus en nuestro país es poco claro. Estas evidencias han permanecido inéditas hasta la fecha o sólo se conocen a través de su publicación en algunas páginas web. En ciertos casos se trata de avistamientos conocidos a través de trabajos, pero en donde las fotografías obtenidas quedaron en poder de sus autores. El objetivo de esta nota es que esta valiosa información pueda ser compartida con el resto de la comunidad ornitológica, y en varios casos permita sacar de su calidad de “hipotéticas” para Chile a algunas especies.

Para todos los registros presentados se señala claramente al autor o autores del avistamiento, la fecha, el lugar y al autor de la correspondiente fotografía.

Pimpollo tobiano (*Podiceps gallardoi*)

Con una pequeña población que decrece, estimada entre 250 y 2499 ejemplares, el Pimpollo tobiano se encuentra clasificado como En Peligro (BirdLife 2010).

Pocos años después de que Rumboll describiera en 1975 esta especie en la Patagonia Argentina, Venegas & Jory (1979) ya señalaban la posibilidad de que también pudiese encontrarse en territorio chileno. Sin embargo, sólo a partir de los años 90 existen algunas observaciones de Pimpollo tobiano para Chile, pero ninguna con una evidencia física conocida (Marín 2004). Entre estos registros, el 26 de octubre de 1997 Ricardo Matus (Matus 1998) observó y fotografió un ejemplar de esta especie (Fig. 2) en la laguna Santa María, en Tierra del Fuego (XII Región).



Figura 2. Pimpollo tobiano (*Podiceps gallardoi*), 26 de octubre de 1997, laguna Santa María, Tierra del Fuego (Reg. XII), foto de Ricardo Matus.

Albatros de las Galápagos (*Phoebastria irrorata*)

Este albatros, clasificado En Peligro Crítico (BirdLife 2010), nidifica en la isla Española (archipiélago de las Galápagos) y en isla de la Plata (Ecuador), presentándose como un visitante relativamente común durante todo el año en las costas peruanas, hasta el sur de Ica, siendo raro más al sur (Schulenberg *et al.* 2007).

Su presencia en Chile se vincula con las aguas cálidas del fenómeno El Niño y existen varios registros entre Arica (XV Región) y Coquimbo (IV Región), pero ninguno con evidencia publicada (Marín 2004).

El 27 de noviembre de 1997, en un tour pelágico liderado por Armas Hill, saliendo aproximadamente 15 millas frente a Arica (XV Región), se observaron 15 ejemplares de Albatros de las Galápagos, obteniéndose algunas fotografías (Fig. 3a). Por otro lado, en la mañana del 02 de marzo de 2004, entre 15 y 17 millas mar adentro, también frente a Arica, Barbara Knapton y Raúl Herrera observaron y fotografiaron un ejemplar de la misma especie (Fig. 3b). El individuo se encontraba posado en el agua, y emprendió vuelo hacia el sur cuando se acercaron en la embarcación.



Figura 3. Albatros de las Galápagos (*Phoebastria irrorata*), Arica (Reg. XV). a): 27 de noviembre de 1997, foto de Armas Hill. b): 02 de marzo de 2004, foto de Barbara Knapton.

Piquero de patas rojas (*Sula sula*)

Existen dos registros conocidos para esta especie en Chile, ambos en Sala y Gómez (V Región), pequeña y remota isla, distante 3420 km. al oeste de Chile continental. El primero, un juvenil en marzo de 1985 (Harrison *et al.* 1988) y el otro, 2 ejemplares en diciembre de 1997 (Vilina *et al.* 1999). Como ninguno cuenta con evidencia publicada, Marín (2004) calificó a la especie como “hipotética” para el país.

Entre el 06 y el 11 de diciembre de 1997, Yerko Vilina y Francisca Gazitúa permanecieron en Sala y Gómez estudiando su avifauna. En esos días, tuvieron la oportunidad de observar y fotografiar dos ejemplares de Piquero de patas rojas (Fig. 4).



Figura 4. Piquero de patas rojas (*Sula sula*) inmaduro, diciembre de 1997, isla Sala y Gómez (Reg. V), foto de Yerko Vilina.



Cigüeña de cabeza pelada (*Mycteria americana*)

El 15 de mayo de 1973, Robert W. McFarlane observó y fotografió (foto no publicada) un ejemplar juvenil de Cigüeña de cabeza pelada en la desembocadura del río Lluta, Arica (XV Región), correspondiendo al primer registro de esta especie para Chile (McFarlane 1974).

El 23 de abril de 1989 en el embalse Huechún, al norte de Santiago (Región Metropolitana), Guillermo Egli y Juan Aguirre avistaron un ejemplar juvenil de esta cigüeña. El ave estuvo en el mismo lugar hasta mediados de junio, siendo observada y fotografiada por varias personas (Fig. 1 y 5). Según datos de lugareños, el ejemplar fue finalmente abatido por cazadores. Este registro corresponde al segundo conocido para esta especie en el país, y fue informado en su oportunidad sin publicar las fotos obtenidas (UNORCH 1989, Tala 1990).

Figura 5. Cigüeña de cabeza pelada (*Mycteria americana*), mayo de 1989, embalse Huechún (Reg. Met.), foto de Harald Kocksch.

Pato de alas azules (*Anas discors*)

Marín (2004) da cuenta de tres registros conocidos en Chile para este pato migrante desde América del Norte. El primero corresponde a un ejemplar capturado por Francisco Behn al sur de Los Vilos (IV Región) el 20 de octubre de 1965; otro en el embalse Huechún (Región Metropolitana) el 25 de noviembre de 1989 informado por Charif Tala; y un tercero mencionado por Ronny Peredo y Loreto Miranda, con 2 ejemplares observados en la desembocadura del río Lluta (XV Región) en agosto de 1998.

Existe un cuarto registro publicado para esta especie, con un macho (Fig. 6) observado durante un censo en noviembre de 1989 en las lagunas de Llo-lleo (V Región) realizado por Juan Aguirre y Harald Kocksch (Aguirre *et al.* 1990).



Figura 6. Pato de alas azules (*Anas discors*) macho, noviembre de 1989, lagunas de Llo-lleo (Reg. V), fotos de Juan Aguirre.

Pitotoy solitario (*Tringa solitaria*)

El primer registro conocido para el Pitotoy solitario en Chile lo realizó Robert W. McFarlane en un tranque cerca de San Miguel de Azapa, Arica (XV Región) el 05 de octubre de 1972 (McFarlane 1974). Otros avistamientos para esta especie los realizaron Ronny Peredo y Loreto Miranda en el estuario del río Lluta (XV Región), con observaciones en junio de 1999, enero y febrero de 2000 (Peredo *et al.* 2001). Existe un registro en la V Región, pero sin mayores antecedentes (Jaramillo 2005).

Hay dos observaciones de Juan Aguirre no publicados para esta especie en la XV Región. La primera corresponde a un ejemplar encontrado el 10 de agosto de 2000 en la desembocadura del río Lluta, Arica. El segundo registro se realizó el 28 de octubre de 2008, con un ejemplar en la desembocadura del río Camarones (Fig. 7) .



Figura 7. Pitotoy solitario (*Tringa solitaria*), 28 de octubre de 2008, desembocadura del río Camarones (Reg. XV), foto de Juan Aguirre.

Becacina chica (*Limnodromus griseus*)

Según Marín (2004), existen tres avistamientos publicados para esta especie en Chile. El primero realizado por K. Steiof entre el 18 y 22 de noviembre de 1996 en Tongoy (IV Región), quien fotografió un ejemplar; el segundo en el mismo lugar el 22 de enero de 1997 por F. Vuilleumier, quien observó probablemente al mismo individuo; y el tercero corresponde a un ejemplar observado entre el 10 y 12 de septiembre de 1997 en Playa Changa (IV Región) por S. Howell y S. Webb.

A lo anterior se debe sumar la observación de Barbara Knapton de un ejemplar el 03 de abril de 2001 en la desembocadura del río Lluta, Arica (XV Región), publicándose una fotografía de ese registro (Peredo *et al.* 2007).

Existen otros registros no publicados para esta especie realizados por Juan Aguirre en el estero Tongoy (IV Región), donde se observó un ejemplar el 10 de octubre y 30 de diciembre de 1999, y el 02 de septiembre de 2000 (Fig. 8).



Figura 8. Becacina chica (*Limnodromus griseus*), 02 de septiembre de 2000, estero Tongoy (Reg. IV), foto de Juan Aguirre.



Zarapito polinésico (*Numenius tahitiensis*)

El Zarapito polinésico presenta una pequeña población estimada en 7000 individuos, la que se cree está disminuyendo, por lo que ha sido categorizado como Vulnerable (BirdLife 2010). Anida en las colinas de la tundra al oeste de Alaska, pasando el invierno boreal en las islas oceánicas del Pacífico.

Para nuestro país existen dos avistamientos atribuidos a esta especie en la isla de Pascua (Región V), ambos de un individuo solitario. Uno entre el 16 y 23 de septiembre de 1991, registrado por Yerko Vilina y Jorge Gibbons en la región norte de Hanga Roa; y el segundo entre el 20 de Abril y 21 de Mayo de 1992 (Fig. 9), observado y fotografiado por Antonio Larrea en el sector de Vaihu (Vilina *et al.* 1992).

Las fotografías del segundo de estos avistamientos que aquí se publican, fueron enviadas a varios especialistas, generándose una interesante discusión sobre la identificación del ejemplar, concluyéndose que no es posible identificarlo como un *Numenius tahitiensis*. Algunos de los expertos consultados lo identificaron como un **Zarapito** (*Numenius phaeopus*) y otros como un aparente híbrido entre *N. tahitiensis* y *N. phaeopus*. El ejemplar de la fotografía muestra una coloración canela en la rabadilla, pero con bandas oscuras, lo que no corresponde a *N. tahitiensis*, especie que presenta una rabadilla sin marcas. Por otro lado, se pueden observar las terciarias y escapulares con manchas grandes doradas, y muslos emplumados y “chascones” que sí caracterizan a *N. tahitiensis*.

Con estos nuevos antecedentes, podemos concluir que a la fecha no existe evidencia conocida para la presencia de Zarapito polinésico en Chile.

Este ejemplo demuestra la importancia de la “evidencia” frente a la observación de las especies raras, la que siempre debería quedar disponible para su revisión, y así evitar eventuales errores de identificación.



Figura 9. Zarapito sp. (*Numenius sp.*), mayo de 1992, sector de Vaihu, isla de Pascua (Reg. V), fotos de Antonio Larrea.

Gaviotín chico boreal (*Sternula antillarum*)

Durante varios años, posiblemente entre diciembre de 2001 y octubre de 2006, permaneció publicada en la página web www.avesdechile.cl la fotografía de un ave obtenida por Nelson Amado en la zona portuaria de Iquique. La especie fue identificada como **Gaviotín chico** (*Sternula lorata*). Sin embargo, en 2006, Álvaro Jaramillo detectó que la especie fotografiada se trataba de un ejemplar de *Sternula antillarum* (Fig. 10), correspondiendo al primer registro de esta especie para Chile.

El avistamiento se realizó en junio de 1990, en el puerto de Iquique (I Región), en un viejo muelle hoy desaparecido que se encontraba al lado de la costanera. En esa ocasión Nelson Amado, Jorge Herreros y Ronny Peredo encontraron un ejemplar solitario que identificaron como Gaviotín chico, logrando obtener 3 fotografías del ave, cuyos negativos conserva Jorge Herreros. Sólo 16 años después, dichos observadores se enterarían que su notable registro correspondía a una nueva especie para el país.



Figura 10. Gaviotín chico boreal (*Sternula antillarum*), junio de 1990, puerto de Iquique (Reg. I), foto de Nelson Amado.



Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*)

El primer registro de Suirirí boreal para Chile corresponde a un ejemplar capturado por Sergio Barros en Chinchorro, Arica (XV Región), el 7 de mayo de 1960 (Phillippi 1967), existiendo varios registros posteriores para esta especie en el país (Marín 2004). Dentro de éstos, Lorenzo Demetrio observó y fotografió un ejemplar solitario (Fig. 11a) en el sector Las Torpederas, Calama (II Región), entre los días 29 de mayo y 27 de junio de 1994 (Demetrio 1995).

Por otro lado, entre el 18 y 25 de mayo de 1996, Harald Kocksch observó un ejemplar de esta especie (Fig. 11b) en los arbustos de Altramuz (*Lupinus arboreus*) que rodean la laguna El Peral (V Región), logrando obtener algunas fotografías.



Figura 11. Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*). a): Junio de 1994, Las Torpederas, Calama (Reg. II), foto de Lorenzo Demetrio.
b): Mayo de 1996, laguna El Peral (Reg. V), foto de Harald Kocksch.

Suirirí real (*Tyrannus melancholicus*)

Entre los días 20 y 31 de diciembre de 1992, en el sector nororiente de la laguna de Bатуco (Región Metropolitana),

Juan Aguirre y Guillermo Egli observaron y fotografiaron un ejemplar de Suirirí real, correspondiendo al primer registro para esta especie en Chile (Aguirre *et al.* 1993).



Un segundo registro fue realizado por Nelson Amado, Ronny Peredo, Jorge Herreros y Walter Sielfeld el 10 de abril de 1993 en caleta Chipana, localidad ubicada aproximadamente a 150 km. al sur de Iquique (I Región), observando un ejemplar (Fig. 12a), del cual pudieron obtener fotografías (Amado *et al.* 1994).



Hay un tercer registro no publicado para esta especie, de Juan Aguirre y Rodrigo Araya en San Pedro de Atacama. Entre el 8 y 12 de marzo de 2002 se observó un ejemplar de Suirirí real (Fig. 12b) en las afueras de este poblado, el que se desplazaba en compañía de tres individuos juveniles de **Cazamoscas tijereta** (*Tyrannus savana*).

Figura 12. Suirirí real (*Tyrannus melancholicus*). **a)**: 10 de abril de 1993, caleta Chipana, Iquique (Reg. I), fotos de Nelson Amado. **b)**: Marzo de 2002, San Pedro de Atacama (Reg. II), junto a Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*), foto de Juan Aguirre.

Rey del bosque (*Pheucticus aureoventris*)

El 16 de diciembre de 1998, Juan Carlos y Federico Johow observaron en la zona periférica del poblado de Socoroma (XV Región), un ejemplar de **Rey del bosque**, correspondiendo al primer registro de esta especie para el país. En dicha oportunidad se obtuvieron fotografías del ave, permaneciendo éstas en poder del autor (Johow 2000). En dichas imágenes (Fig. 13), se puede observar que se trata de un macho adulto de la subespecie *aureoventris*, la que se caracteriza por presentar la espalda de un color negro uniforme.

En febrero de 2000, Loreto Miranda observó en la desembocadura del río Lluta (XV Región) otro ejemplar de la misma especie, sumando un segundo registro para Chile (Miranda 2000).



Figura 13. Rey del bosque (*Pheucticus aureoventris*), 16 de diciembre de 1998, Socoroma (Reg. XV), fotos de Federico Johow.

Reinita acuática (*Seiurus noveboracensis*)

En la mañana del 20 de julio de 2005, en el estero que atraviesa el pueblo de Toconao, 38 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama (II Región), Jean Paul de la Harpe, Pete Moroz, Jo Ann Moroz, Drew Moroz, Chary Moroz y Geraldine Saintard, observaron un ejemplar de *Seiurus noveboracensis*, alimentándose de pequeños insectos. De vez en cuando volaba a los árboles que bordean el lugar, para luego volver al curso de agua para alimentarse. En dicha oportunidad fue posible observar la conducta típica de desplazamiento de esta especie, balanceando la cola arriba y abajo al caminar. Se obtuvieron fotografías muy claras del ave (Fig. 14). Este notable avistamiento corresponde al primer registro de esta especie para Chile, e x t e n d i e n d o considerablemente hacia el sur su rango de distribución en el continente sudamericano.



Figura 14. Reinita acuática (*Seiurus noveboracensis*), 20 de julio de 2005, Toconao (Reg. II), fotos de Jean Paul de la Harpe.

Agradecimientos

Agradezco muy sinceramente a Juan Aguirre, Nelson Amado, Lorenzo Demetrio, Jean Paul de la Harpe, Jorge Herreros, Armas Hill, Federico Johow, Barbara Knapton, Harald Kocksch, Antonio Larrea, Ricardo Matus, Ronny Peredo y Yerko Vilina, por la información entregada respecto a sus valiosas observaciones y su confianza al permitir publicar las fotografías que ilustran este trabajo; a Humberto Cordero, Álvaro Jaramillo, Fabrice Schmitt y Alejandro Simeone por sus acertados comentarios; y a Álvaro Jaramillo por realizar las consultas a varios especialistas para identificar al *Numenius sp.* fotografiado en la isla de Pascua.

Referencias

- Aguirre, J. & Egli, G.** (1993). Primer registro de *Tyrannus melancholicus* para Chile. *Boletín Informativo Unión de Ornitólogos de Chile* 15: 6-7.
- Aguirre, J. & Kocksch, H.** (1990). Diversidad y censo anual de la comunidad de aves de las lagunas de Llo-lleo, provincia de San Antonio, V Región. (33°36'S; 71°30'W). *Boletín Informativo Unión de Ornitólogos de Chile* 10: 16-17.
- Amado, N., Peredo, R., Herreros, J. & Sielfeld, W.** (1994). Nuevo avistamiento de *Tyrannus melancholicus* para Chile en Caleta Chipana 21° 48' Lat. S, Primera Región. *Boletín Chileno de Ornitología* 1: 27.
- Demetrio, L.** (1995). Registro de Benteveo blanco y negro *Tyrannus tyrannus* (Linné, 1758) en Calama. *Boletín Chileno de Ornitología* 2: 24.
- Harrison, P. & Jehl, J.R.** (1988). Notes on the seabirds of Sala y Gomez. *Condor* 90:259-261.
- Jaramillo, A.** (2005). Aves de Chile. Lynx Edicions, Barcelona.
- Johow, J.C.** (2000). Primer registro de *Pheucticus aureoventris* (Passeriformes, Emberizidae) para Chile. *Boletín Chileno de Ornitología* 7: 34.
- Marín, M.** (2004). Lista comentada de las Aves de Chile. Lynx Edicions, Barcelona.
- Matus, R.** (1998). Presencia accidental de *Corvus splendens* (Aves, Corvidae) y nuevos registros de aves raras en Magallanes: *Rolandia gallardoi* y *Eremobius phoenicurus*. *Anales del Instituto de la Patagonia* 26: 137-139.
- McFarlane, R.W.** (1974). Inusual avian migrants in Tarapacá. *Idesia* 3: 181-184.
- Miranda, L.** (2000). Avistamiento de *Pheucticus aureoventris* (Passeriformes, Emberizidae) en la desembocadura del Río Lluta, I Región de Chile. *Boletín Chileno de Ornitología* 7: 37.
- Peredo, R. & Miranda, L.** (2001). Nuevos registros para la avifauna del estuario del Río Lluta (Arica, Región de Tarapacá). *Boletín Chileno de Ornitología* 8: 2-9.
- Peredo, R., Knapton, B., Jaramillo, A. & Schmitt, F.** (2007). Lista de las aves de la desembocadura del río Lluta. *La Chiricoca* 2: 5-11.
- Philippi, R.A.** (1967). Tres especies de aves capturadas por primera vez en Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural* 29: 121-124.
- Schulenberg, T.S., Stotz, D.F., Lane, D.F., O'Neil, J.P. & Parker III, T.A.** (2007). Bird of Peru. Christopher Helm, London.
- Tala, C.** (1990). Catastro mensual del "Embalse Huechún". *Boletín Informativo Unión de Ornitólogos de Chile* 10: 14-15.
- UNORCH** (1989). Observaciones Ornitológicas. *Boletín Informativo Unión de Ornitólogos de Chile* 8:9
- Venegas, C. & Jory, J.** (1979). Guía de campo para las aves de Magallanes. Instituto de la Patagonia, Punta Arenas.
- Vilina, Y.A. & Gazitúa, F.J.** (1999). The birds of Sala y Gomez Island, Chile. *Waterbirds* 22:459-462.
- Vilina, Y.A., Larrea, A. & Gibbons, J.E.** (1992). First record of the Bristle-thighed Curlew *Numenius tahitiensis* en Easter Island, Chile. *Water Study Group Bull.* 66: 43-44.