



Aves Raras en Chile,
Enero 2004–Diciembre 2014
por Rodrigo Barros y Fabrice Schmitt

Espátula (*Platalea ajaja*), 18 de marzo de 2014, desembocadura del río Huasco, provincia de Huasco, foto Philippe Dandois.

Hace 50 años Philippi-B. (1964) publicó el “Catálogo de las aves de Chile con su distribución geográfica”, señalando 387 especies descritas para el país, no incorporando Isla de Pascua ni Salas y Gómez en su revisión, pero sí el denominado “territorio antártico chileno”. Hace 10 años Marín (2004) actualizó este listado con su “Lista Comentada de las Aves de Chile”, llegando a 438 especies para el territorio continental e islas oceánicas (se excluyó en este trabajo el territorio antártico). Si bien en ambos listados se trabaja sobre territorios distintos, al compararlos se observa que en este período de 40 años se suman 59 nuevas especies a la lista de aves para el país.

En el presente artículo publicamos registros para 112 especies y 4 subespecies consideradas como aves raras en Chile, realizados entre Enero 2004 y Diciembre 2014. En el período de 10 años que cubre este trabajo se sumaron 65 nuevas especies para el país, 16 de ellas consideradas como hipotéticas por Marín (2004). Lo anterior sin contabilizar 4 especies nuevas productos de cambios taxonómicos (subespecies que subieron a la categoría de especie).

Este incremento en el registro de nuevas especies en los últimos años se debe principalmente a la siempre mayor cantidad de observadores aficionados interesados por las aves de Chile y por el desarrollo de varias herramientas de comunicación, las que han facilitado la transmisión de información sobre ellas.

Para seleccionar las especies presentadas en este artículo se ha definido como “aves raras” las especies que presentan menos de 5 registros al año en el país, aunque se incluyen algunas especies que pasan ocasionalmente el límite de 5 registros anuales. También se han sumado algunas especies pelágicas muy raras en el continente, a pesar de ser regulares en las islas oceánicas de Chile.

Metodología

La mayoría de los avistamientos presentados en este trabajo fueron informados por los mismos observadores a través de la base de datos eBird-Chile (www.ebird.org/content/chile). Esta plataforma de colecta de registros de terreno, desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de Cornell, ha facilitado considerablemente la transmisión de información sobre las aves en general y las especies raras en particular. eBird-Chile cuenta con un Comité de Validación de las observaciones más raras y en este

artículo solo se consideran los registros validados por este Comité.

Además de las observaciones enviadas en eBird, presentamos avistamientos publicados en otros trabajos y registros inéditos transmitidos directamente por los observadores. Para estos casos solo se informan registros que cuentan con evidencias físicas verificables (especimen de museo, fotografía, grabación de sonido, película o video).

Presentación de los avistamientos

1. La taxonomía y los nombres comunes en inglés siguen a Clements et al. (2015). El nombre común chileno sigue a Barros et al. (2015).
2. En algunos casos se presentan registros de subespecies errantes para Chile, ya que los autores piensan que a futuro estas subespecies podrían ser reconocidas como especies.
3. Para cada especie se presenta en cursiva su distribución general, en época reproductiva y no reproductiva.
4. Luego se señala de manera resumida su estatus en Chile con anterioridad a 2004.
5. Sigue una tabla en la cual se presenta fecha del avistamiento, cantidad de ejemplares observados, lugar del avistamiento, nombre de los observadores y antecedentes (dato validado en eBird, fotografía publicada o espécimen de museo).
6. Cuando son varios observadores, se menciona en primer lugar el nombre de la o las personas quienes descubrieron el ave o quien difundió el registro. Los otros nombres siguen el orden alfabético.
7. Los números en la columna “Antecedentes” corresponden a: (1) registro en eBird, aceptado por el Comité de Validación; (2) foto publicada (entre paréntesis se cita la publicación); (3) espécimen de museo (entre paréntesis se indica colección y número de registro); (4) foto publicada en este artículo.
8. Para las colecciones de museo se utilizan las siguientes abreviaciones:

CBUCN	Colecciones Biológicas de la Universidad Católica del Norte, Coquimbo
CZIP	Colección Zoológica del Instituto de la Patagonia, Punta Arenas
MNHNCL	Museo Nacional de Historia Natural, Santiago

Perdiz austral*Tinamotis ingoufi*

Patagonian Tinamou

Especie casi endémica de Argentina. Residente en la estepa del suroeste de Argentina, con tendencia a realizar movi-

mientos hacia la costa en invierno.

Con uno o 2 especímenes capturados en la provincia de Coihaique y algunas referencias para la provincia de Magallanes, Marín (2004) la incorpora a su lista como una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
diciembre 2007	3	Bahía Posesión, Provincia de Magallanes	C. González B.	2 (Barros & Schmitt 2008b)
2 febrero 2008	3	Sector Punta Delgada, Provincia de Magallanes	Info. C. Silva	1

Pato silbón pampa*Dendrocygna viduata*

White-faced Whistling-Duck

En las Américas, presente desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina; también presente en África. Puede realizar movimientos locales según niveles de agua y disponibilidad de comida en sus lugares de reproducción.

Con algunos registros en las provincias de Iquique, Antofagasta, El Loa, Choapa, Chacabuco y Valdivia, Marín (2004) la incorpora a su lista como una “especie rara”.



Pato silbón pampa (*Dendrocygna viduata*), 28 de julio de 2004, Parral, provincia de Linares, foto Ana Hinojosa.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
29 mayo 2004	15	Laguna El Peral, Provincia de San Antonio	R. Barros	1
18 julio 2004	49	Laguna de Batuco, Provincia de Chacabuco	R. Barros, J. Ferrada	1, 4
28 julio 2004	1 muerto	10 km. al este de Parral, Provincia de Linares	En Hinojosa & González 2004	4
Entre 17 octubre y 7 noviembre 2004	10	Laguna de Batuco, Provincia de Chacabuco	R. González, Á. Jaramillo	1
1 noviembre 2004	38	Puente Negro, Lampa, Provincia de Chacabuco	R. Barros, R. González, B. Rosende, R. Rosende	1
25 agosto 2007	1	Hacienda Compañía, Vallenar, Provincia de Huasco	F. Olivares	1, 2 (Barros & Schmitt 2008a)
13 diciembre 2009	2	Tranque La Cadellada, Provincia de Chacabuco	F. Díaz, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2010b)
28 agosto 2010	1	Laguna de Batuco, Provincia de Chacabuco	R. Reyes, C. Uribe	1
1 octubre 2010	1	Laguna de Batuco, Provincia de Chacabuco	F. Díaz	1



Pato silbón pampa (*Dendrocygna viduata*), 18 de julio de 2004, Laguna de Batuco, provincia de Chacabuco, foto Rodrigo Barros.

Pato silbón de ala blanca*Dendrocygna autumnalis*

Black-bellied Whistling-Duck

*Nidifica desde el sur de Estados Unidos hacia el norte de Argentina. Principalmente residente pero puede realizar movi-**mientos locales.*

Con solo 2 registros conocidos en las provincias de Osorno y Valparaíso, Marín (2004) la señala en su lista como una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
23 diciembre 2008	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	V. López	1, 2 (Barros & Schmitt 2009b)
Entre 12 y 20 abril 2012	1	Estero El Culebrón y desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	A. Araya, P. Valencia	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)

Pato silbón colorado*Dendrocygna bicolor*

Fulvous Whistling-Duck

*En las Américas, presente desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina; también presente en África y en el subcontinente de India. Principalmente residente pero puede**realizar movimientos según niveles de agua y disponibilidad de comida en sus lugares de reproducción.*

Con pocos registros en la zona central del país y un avistamiento en la desembocadura del río Lluta, Marín (2004) la suma a su lista como una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
9 julio 2005	4	Laguna de Batuco, Provincia de Chacabuco	R. Barros, R. González, B. Rosende, R. Rosende	1, 2 (Schmitt & Barros 2006a)
8 enero 2006	1	Laguna de Batuco, Provincia de Chacabuco	R. Barros, F. Schmitt, J. Aguirre, R. Demangel	1
16 marzo 2008	1	Tranque La Cadellada, Provincia de Chacabuco	F. Schmitt, R. Barros	1, 2 (Barros & Schmitt 2008c)
10 agosto 2008	1	Laguna de Batuco, Provincia de Chacabuco	R. Barros, F. Díaz	1
7 febrero 2010	1	Tranque La Cadellada, Provincia de Chacabuco	R. Barros, J. Troncoso, H. Díaz	1, 2 (Barros & Schmitt 2010b)
28 diciembre 2010	1	Tranque La Cadellada, Provincia de Chacabuco	F. Díaz, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
Entre 6 y 28 febrero 2012	1	Tranque La Cadellada, Provincia de Chacabuco	F. Díaz, F. Schmitt, L. Frid, K. Holloway	1

Pato de alas azules*Anas discors*

Blue-winged Teal

Migratorio boreal, nidificando en América del Norte desde Canadá hasta el centro de Estados Unidos, y migrando hasta el norte de América del Sur, llegando regularmente hasta Perú.

Marín (2004) informa de 3 registros conocidos para Chile en Los Vilos, embalse Huechún y desembocadura del río Lluta, considerándola una “especie rara”. Existe un cuarto registro en las lagunas de Llo-lleo en noviembre de 1998, cuya fotografía se publica posteriormente (Barros 2010).

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 1 junio y 13 julio 2013	2	Desembocadura río La Ligua, Provincia de Petorca	P. Cáceres, R. Jiménez, N. Muggli, I. Azócar, R. Barros, M. Daigre, F. Díaz, V. Escobar, S. Lizana, V. Maturana, T. McKay, E. Navarro, R. Ortega, C. Pinto, V. Raimilla, N. Torés, C. Yáñez	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)

Pimpollo tobiano*Podiceps gallardoi*

Hooded Grebe

Especie casi endémica de Argentina, nidificando en los lagos interiores de la Región de Santa Cruz, y migrando hacia la costa atlántica en invierno.

Marín (2004) menciona varios registros conocidos, pero por no existir evidencia la considera como una “especie hipotética”. Posteriormente se publican fotografías de 2 de estos registros, en las provincias de Magallanes en 1993 (Barros 2015b) y Tierra del Fuego en 1997 (Barros 2010).

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 12 octubre 2013 y 4 enero 2014	1 – 2	Laguna Inia Kampenaike, Provincia de Magallanes	M. Figueroa, H. Gómez, J. Quezada, S. Saiter, F. Díaz, Á. Jaramillo, R. Reyes, F. Schmitt, R. Tapia	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)

Pingüino papúa*Pygoscelis papua*

Gentoo Penguin

Nidifica en la Península Antártica y varias islas subantárticas. Colonias más cercanas a Chile en la costa norte del canal

Beagle en Argentina y en las Islas Malvinas. Migratorio parcial en las aguas subantárticas.

Con 2 avistamientos en la Isla Hornos, provincia Antártica Chilena, Marín (2004) lo incorpora a su lista como una “especie rara”.


Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
26 diciembre 2009	1	Canal Beagle, Provincia Antártica Chilena	S. Dardanelli	1
2 enero 2013	1	Punta Gusano, Puerto Williams, Provincia Antártica Chilena	V. Raimilla, H. York	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)

Pingüino antártico*Pygoscelis antarcticus*

Chinstrap Penguin

Nidifica en la Península Antártica y en algunas islas subantárticas. Colonias más cercanas a Chile en las Islas Shetland del Sur. Migratorio parcial en las aguas subantárticas.

Con pocos registros en la provincia de la Antártica Chilena, Marín (2004) lo incorpora a su lista como una “especie rara”.



Pingüino antártico (*Pygoscelis antarcticus*), **a**) 15 de diciembre de 2008, Bahía Azul, provincia de Tierra del Fuego, foto Enrique Couve; **b**) 6 de noviembre de 2013, Punta Delgada, provincia de Magallanes, foto Claudio Vidal.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
15 diciembre 2008	1	Bahía Azul, Provincia Tierra del Fuego	E. Couve	4
12 enero 2009	2	Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena	E. French	1
16 enero 2013	1	Punta Gusano, Puerto Williams, Provincia Antártica Chilena	J. Jiménez	2 (Barros & Schmitt 2014a)
6 noviembre 2013	1	Punta Delgada, Provincia de Magallanes	C. Vidal	4

Pingüino azul

Eudyptula minor

Little Penguin

Nidifica en el sur de Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. Residente.

Con registros en las provincias de Chañaral y Huasco, y un espécimen capturado en la provincia de San Antonio, Marín (2004) lo incorpora a su lista como una “especie rara”.



Pingüino azul (*Eudyptula minor*), 20 de diciembre de 2005, Isla Magdalena, provincia de Magallanes, foto Mark Pearman.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
29 marzo 2004	1	Punta Arenas, Provincia de Magallanes	Info. R. Matus	3 (CZIP A-599)
20 diciembre 2005	1	Isla Magdalena, Provincia de Magallanes	M. Pearman	4

Albatros de frente blanca

Thalassarche cauta

White-capped Albatross

Nidifica en Tasmania y en la Isla Auckland. Se desplaza principalmente en aguas subantárticas, llegando regularmente hasta África del Sur. Errante en la costa pacífica de Esta-

dos Unidos.

Con un solo avistamiento conocido cerca de Valparaíso, Marín (2004) lo consideró como una “especie hipotética”. El primer registro con evidencia para el país se realiza en 2004.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
2 noviembre 2004	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	E. Couve, C. Vidal	2 (Couve & Vidal 2005)
4 abril 2009	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	P. Cáceres, M. Marín, F. Schmitt, J. Tassara	1, 2 (Barros & Schmitt 2010a, Marín 2011)
7 noviembre 2011	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	L. Seitz	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)

Albatros de Chatham

Thalassarche eremita

Chatham Albatross

Toda la población mundial nidifica en una sola isla de Nueva Zelanda. Después de la reproducción se desplaza al este, llegando hasta las costas de Perú y Chile. Un migratorio raro pero regular en Chile, con avistamientos que deberían ir creciendo en el futuro con la realización más regular de salidas pelágicas y un mejor conocimiento de los criterios de identificación de los inmaduros.

Con 2 registros en el Archipiélago de Juan Fernández, uno en las afueras de Viña del Mar y 2 más frente a Quintero, Marín (2004) lo considera una “especie rara”.



Albatros de Chatham (*Thalassarche eremita*), 2 de diciembre de 2012, pelágico frente a Valparaíso, provincia de Valparaíso, foto Pablo Cáceres.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
10 noviembre 2005	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	Á. Jaramillo	1

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
15 y 16 noviembre 2006	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	Á. Jaramillo, R. Matus, P. Burke, P. Cáceres	1, 2 (La Chiricoca 2007)
23 noviembre 2006	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	R. Tapia	1
6 enero 2007	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Barros, P. Cáceres, F. Díaz, F. Schmitt	1, 2 (Schmitt 2008)
30 octubre 2007	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	S.N.G. Howell	2 (Howell 2012)
25 octubre 2008	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	K. Horn, R. Horn	1
1 noviembre 2008	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	Á. Jaramillo, R. Matus	1
4 diciembre 2008	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	Á. Jaramillo, R. Matus, R. Reyes	1
14 diciembre 2008	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Reyes	1, 2 (Barros & Schmitt 2009b)
25 septiembre 2009	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	P. Cáceres, R. González, R. Jiménez, N. Muggli, R. Tapia	1, 2 (Barros & Schmitt 2010a)
2 octubre 2010	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Barros, P. Cáceres, F. Díaz, S. Egaña, C. Poblete, P. Valenzuela	1
27 noviembre 2010	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	F. Díaz	1
30 diciembre 2010	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
8 diciembre 2011	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	P. Cáceres, F. Díaz, F. Schmitt	1
13 noviembre 2012	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	R. Reyes, R. Tapia, C. Yáñez	1
2 diciembre 2012	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	G. Alfsen, P. Cáceres, F. de Groote, F. Díaz, R. Jiménez, A. Minoletti, N. Muggli, C. Pinto, F. Schmitt, N. Torés	1, 4
8 marzo 2013	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	Á. Jaramillo, R. Matus	1
27 diciembre 2013	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	D. Martínez	1
18 febrero 2014	1	Frente al Golfo de Penas, Provincia Capitán Prat	F. Schmitt	1
11 octubre 2014	1	Ruta entre Juan Fernández y Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Reyes	1
15 noviembre 2014	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	R. Reyes, C. Yáñez	1

Albatros de manto claro

Phoebastria palpebrata

Light-mantled Albatross

Nidifica en islas subantárticas, con la colonia más cercana a Chile en las Islas Georgias del Sur. Después de la reproduc-

ción se dispersa en aguas subantárticas.

Es posible que sea regular en las aguas oceánicas del extremo sur de Chile, pero los registros con evidencias de esta especie son escasos en el país.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
16 diciembre 2010	1	Seno Almirantazgo, Provincia Tierra del Fuego	R. Matus	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
22 febrero 2014	1	Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena	F. Díaz, F. Schmitt	1

Albatros de las Galápagos

Phoebastria irrorata

Waved Albatross

Nidifica en Isla Española (Galápagos) e Isla La Plata en Ecuador. Después de la reproducción se desplaza por la corriente de Humboldt, en la costa de Ecuador y Perú, llegando regularmente al menos hasta Lima.

Con algunos registros entre Arica y Coquimbo, Marín (2004) lo considera como una “especie hipotética”, por no existir evidencias. Posteriormente se publica la fotografía de uno de ellos (Barros 2010). Es muy probable que los registros de 2012 y 2013 en la provincia de Valparaíso correspondan al mismo ejemplar.



Albatros de las Galápagos (*Phoebastria irrorata*), 13 de noviembre de 2012, pelágico frente a Quintero, provincia de Valparaíso, foto Rodrigo Tapia.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
2 marzo 2004	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	B. Knapton, R. Herrera	1, 2 (Barros 2010)
3 marzo 2012	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	J. Boulanger, R. Reyes	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
13 noviembre 2012	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	R. Reyes, R. Tapia, C. Yáñez	1, 4
6 febrero 2013	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	J. Córdova, D. Reyes, R. Reyes, C. Vásquez, C. Yáñez	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)

Petrel antártico

Thalassoica antarctica

Antartic Petrel

Una especie restringida a aguas antárticas, observada excepcionalmente al norte de la Convergencia Antártica. Ejemplares errantes observados en África del Sur, Nueva Zelanda y Tasmania.

Basado en registros históricos en el extremo sur del país, Marín (2004) la incorpora a su lista como una “especie rara”.



Petrel antártico (*Thalassoica antarctica*), 16 de octubre de 2009, Cabo de Hornos, provincia de la Antártica Chilena, foto Carlos Olavarría.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
16 octubre 2009	1	Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena	C. Olavarría, E. Newcombe	4

Petrel de Kerguelen

Aphrodroma brevirostris

Kerguelen Petrel

Nidifica en unas pocas islas subantárticas (las más cercanas a Chile son Gough y Tristan da Cunha en el Atlántico Sur). Después de la reproducción se dispersa en las aguas antárticas y subantárticas alrededor del mundo, con avistamientos raros pero regulares en el paso Drake.

Con un ejemplar encontrado muerto en Mehuín (Valdivia) y 2 ejemplares observados al suroeste de Valdivia, Marín (2004) la suma como una “especie rara”.



Petrel de Kerguelen (*Aphrodroma brevirostris*), 25 de febrero de 2014, Cabo de Hornos, provincia de la Antártica Chilena, foto Enrique Couve.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
22 febrero 2014	2	Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena	F. Díaz, F. Schmitt	1
25 febrero 2014	5	Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena	E. Couve	4

Petrel de Murphy

Pterodroma ultima

Murphy's Petrel

Especie poco conocida, que nidifica en algunas islas del Pacífico tropical. Recientemente descubierta intentando nidificar en Isla de Pascua (Marín & Cáceres 2010) y nidificando en Isla Salas y Gómez.

La primera evidencia para el país se obtiene en septiembre de 2007.

Petrel de Murphy (*Pterodroma ultima*), 1 de septiembre de 2014, Isla Salas y Gómez, provincia de Isla de Pascua, foto Diego Miranda.



Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
27 septiembre 2007	1	Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2008a)
Entre 11 y 20 agosto 2009	4	Volcán Rano Raraku y entre Tongariki y Hanga Taharoa, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	M. Marín	2 (Marín & Cáceres 2010)
23 julio 2013	2	Sector de Poike, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	1
4 septiembre 2013	25	Isla Salas y Gómez, Provincia de Isla de Pascua	M. Flores	1
26 junio 2014	2	Motus, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	R. Tapia	1
27 junio 2014	12	Rano Kau, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	R. Tapia	1
1 agosto 2014	1	Poike, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	M. Bravo, P. Lazo	1
1 septiembre 2014	12	Isla Salas y Gómez, Provincia de Isla de Pascua	D. Miranda	4

Petrel de Henderson

Pterodroma atrata

Henderson Petrel

Especie poco conocida, nidificando en algunas islas del Pacífico tropical. Recientemente descubierta nidificando en Isla de Pascua (Marín & Cáceres 2010).

El 4 de marzo 2003 se fotografía esta especie en Isla de Pascua, correspondiendo a la primera evidencia para el país (Jaramillo et al. 2008).

Petrel de Henderson (*Pterodroma atrata*), 4 de julio de 2014, Motus, Isla de Pascua, provincia Isla de Pascua, foto Rodrigo Tapia.



Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
18 febrero 2007	1	Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	A. Farnsworth	1

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
16 febrero 2009	1	Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	Á. Jaramillo	1
12 junio 2009	5	Motu Nui, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Cáceres	1, 2 (Barros & Schmitt 2010a)
15 y 16 agosto 2009	31	Motu Nui, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	M. Marín	2 (Marín & Cáceres 2010)
16 mayo 2011	6	Motu Nui y Motu Iti, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	1
15 noviembre 2011	5	Motu Nui, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	1
20 febrero 2012	6	Motu Nui, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	1
17 marzo 2012	1	Motu Nui, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	Á. Jaramillo	1
4 marzo 2013	9	Motus, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	1
15 al 18 marzo 2013	Entre 1 y 10	Motus, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	Á. Jaramillo, P. Lazo	1
26 junio 2013	2	Motus, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	1
22 julio 2013	5	Motus, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	1
Entre 15 y 19 marzo 2014	1 y 4	Motus, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	Á. Jaramillo, C. Carr, S. Whiting, S. Yankovic	1
4 julio 2014	17	Motus, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	R. Tapia	4
1 agosto 2014	1	Poike, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	M. Bravo, P. Lazo	1

Petrel de collar gris

Pterodroma mollis

Soft-plumaged Petrel

Nidifica en islas subantárticas. Las colonias más cercanas a Chile en Tristan da Cunha y Gough en el Atlántico Sur, y en las Islas Antípoda en el Pacífico. Desplazamiento en aguas subantárticas, con bandadas grandes observadas regularmente en los alrededores de las Islas Malvinas.

El único registro conocido para el país se realiza en noviembre de 2007.

Petrel de collar gris (*Pterodroma mollis*), 10 de noviembre de 2007, Cabo de Hornos, provincia de la Antártica Chilena, foto Rodrigo Tapia.



Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
10 noviembre 2007	1	Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena	R. Tapia	1, 4

Petrel de alas negras*Pterodroma nigripennis*

Black-winged Petrel

Nidifica en islas del suroeste del Pacífico, desde el este de Australia hasta el norte de Nueva Zelanda y las Islas Chatham. Migra hacia el norte y este en el Pacífico, llegando comúnmente al noroeste del Pacífico.

El primer registro para el país se realiza en febrero de 2012.

Petrel de alas negras (*Pterodroma nigripennis*), 17 de abril de 2014, 177 millas al norte de las Islas Desventuradas, provincia de Valparaíso, fotos Stephen Copsy.



Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
20 febrero 2012	2	Sector Motu Nui, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	1
17 marzo 2012	1	Sector Motu Nui, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	Á. Jaramillo	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
4 marzo 2013	6	Sector Motus, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	1
18 marzo 2013	7	Motu Nui, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	Á. Jaramillo, P. Lazo	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
17 abril 2014	1	177 millas al norte de las Islas Desventuradas, Provincia de Valparaíso	S. Copsy	4

Petrel de Gould*Pterodroma leucoptera*

Gould's Petrel

Especie oceánica que nidifica principalmente en Australia y Nueva Caledonia, migrando después de la reproducción hacia el este del Pacífico.

El único registro conocido para el país se realiza en septiembre de 2004.

Petrel de Gould (*Pterodroma leucoptera*), septiembre 2004, Isla Robinson Crusoe, Archipiélago de Juan Fernández, provincia de Valparaíso, fotos Enrique Couve.



Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Septiembre 2004	1	Isla Robinson Crusoe Provincia de Valparaíso	E. Couve	4

Petrel-paloma de pico ancho*Pachyptila vittata*

Broad-billed Prion

Nidifica en Tristan da Cuna y Cough en el Atlántico Sur, y en las Islas Chatham e islas del sur de Nueva Zelanda en el

Pacífico Sur. No se conocen movimientos o migraciones importantes, pero hay ejemplares observados en África del Sur, y errante en la costa peruana.

El primer registro para el país se realiza en julio de 2009.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
10 julio 2009	1	Guaneras de Cutipa, Arica, Provincia de Arica	R. Herrera	2 (Barros & Schmitt 2011a)
marzo 2014	1 muerto	Bahía de Coquimbo, Provincia de Elqui	M. Portflitt, D. Miranda, G. Luna	3 (CBUCN EC_5241.00), 4



Petrel-paloma de pico ancho (*Pachyptila vittata*), marzo de 2014, bahía de Coquimbo, provincia de Elqui, fotos Diego Miranda (izquierda) y Víctor Castelleto (derecha).

Petrel Gris

Procellaria cinerea

Gray Petrel

Nidifica en islas subantárticas, las más cercanas a Chile en Tristan da Cuna y Gough en el Atlántico Sur, y en las Islas Campbell y Antípodas en el Pacífico Sur. Después de la reproducción se dispersa a través de los mares australes, llegando a zonas subtropicales siguiendo corrientes frías, como la de Humboldt.

Marín (2004) lo incorpora a su lista sin hacer comentarios, indicando su presencia en la zona oceánica como poco común o accidental. La única evidencia conocida para el país se obtiene en marzo de 2014.



Petrel gris (*Procellaria cinerea*), 3 de marzo de 2014, Islas Diego Ramírez, provincia de la Antártica Chilena, foto Enrique Couve.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
3 marzo 2014	5	Islas Diego Ramírez, Provincia Antártica Chilena	E. Couve	4

Petrel de Parkinson

Procellaria parkinsoni

Parkinson's Petrel

Nidifica en el noreste de Nueva Zelanda. Migra hacia el noreste, llegando hacia el centro del Pacífico y a la costa pacífica

de América Central y norte de América del Sur.

Los primeros registros para el país se realizan en julio de 2008, dentro de las 200 millas frente a las Islas Desventuradas y Archipiélago de Juan Fernández.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
18 julio 2008	2	200 millas frente al Archipiélago Juan Fernández, Provincia de Valparaíso	J. Ruiz	2 (Cabezas et al. 2012)
23 y 25 julio 2008	1	200 millas frente a Islas Desventuradas, Provincia de Valparaíso	J. Ruiz	2 (Cabezas et al. 2012)
20 diciembre 2010	1	Pelágico frente a Mejillones, Provincia de Antofagasta	R. Barros, F. Schmitt, F. Díaz, A. Minoletti J., N. Torés	1, 2 (Schmitt 2011, Barros & Schmitt 2011b)

Fardela de patas pálidas*Ardenna carneipes*

Flesh-footer Shearwater

Nidifica en islas del Océano Índico Sur y suroeste del Pacífico. Después de la reproducción (invierno austral), la población del Pacífico migra al norte, llegando a las costas de Japón y Norteamérica, siendo raro al sur de California.

Con un espécimen capturado a las afueras de Valdivia, otro en la Isla Robinson Crusoe y un tercer ejemplar fotografiado frente a Quintero, Marín (2004) la incorpora a su lista como una “especie rara”. Los ejemplares de Valdivia y Quintero corresponden a Fardela blanca (*A. creatopus*) y el ejemplar de Robinson Crusoe no es posible de identificar sin un examen de ADN (Barros 2015b). La única evidencia definitiva para esta especie en el país se obtiene en diciembre de 2005.



Fardela de patas pálidas (*Ardenna carneipes*), 2 de diciembre de 2005, 7,5 km al NE de la Isla Robinson Crusoe, Archipiélago de Juan Fernández, foto Enrique Couve.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
2 diciembre 2005	1	Isla Robinson Crusoe, Archipiélago Juan Fernández, Provincia de Valparaíso	E. Couve	4

Fardela atlántica*Puffinus puffinus*

Manx Shearwater

Nidifica en varias islas del Atlántico Norte. Migra en el hemisferio sur, principalmente en la costa atlántica de América

del Sur. Errante en el Océano Pacífico, pero con avistamientos regulares en la costa pacífica de Estados Unidos.

Con varios avistamientos sin evidencia física, Marín (2004) la consideró como una “especie hipotética” para el país.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
9 febrero 2004	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, A. Lazere	1
22 noviembre 2005	1	Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena	A. Wilson	1
30 agosto 2008	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	P. Cáceres, R. Reyes, R. Tapia, C. Vásquez	1, 2 (Barros & Schmitt 2009a)
11 febrero 2010	3	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	P. Burke, R. Matus	1
8 enero 2012	3	Canal Beagle, Provincia Antártica Chilena	S. Imberti	1
9 febrero 2012	5	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	P. Burke, R. Matus	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
22 abril 2012	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	P. Moysons, S. Pardo, R. Reyes, C. Rogers, R. Tapia, C. Yáñez	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
28 septiembre 2012	2	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Matus	1
27 enero 2013	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	H. Arnal, R. Barros, F. Díaz, T. McKay, C. Pinto	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)
16 febrero 2013	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	C. Rutt, J. Stone	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)
18 diciembre 2014	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	N. Contardo, R. Ortega, L. Portugal, R. Reyes	1

Fardela chica*Puffinus assimilis elegans*

Little Shearwater

Los ejemplares observados en Chile pertenecen a la subespecie “*elegans*”, a veces considerada como una especie distinta,



Fardela chica (*Puffinus assimilis elegans*), marzo 2010, Golfo de Corcovado, provincial de Chiloé, foto Jordi Plana.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
marzo 2010	2	Golfo de Corcovado, Provincia de Chiloé	J. Plana	4
21 febrero 2012	1	Isla Metalqui, Provincia de Chiloé	C. Vidal	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)

Fardela tropical / de Rapa*Puffinus bailloni / myrtae*

Tropical / Rapa Shearwater

P. bailloni nidifica en islas del Pacífico tropical. Por su lado, *P. myrtae* se reproduce en la Isla Rapa, parte de las islas Australes de la Polinesia Francesa.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
10 enero 2011	1	Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	V. López, P. Lazo	2 (Barros & Schmitt 2011b)
15 noviembre 2011	1	Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	1
4 marzo 2013	1	Sector Motus, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	1

Golondrina de mar de vientre blanco*Fregetta grallaria*

White-bellied Storm-Petrel

Esa especie tiene un rango importante en varios océanos del hemisferio sur. En Chile nidifica en las Islas Desventuradas y

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
8 junio 2007	1	Puerto de Arica, Provincia de Arica	R. Herrera	2 (Barros & Schmitt 2007c)

Golondrina de mar de vientre negro*Fregetta tropica*

Black-bellied Storm-Petrel

Nidifica en varias islas subantárticas (las colonias más cercanas en las islas Shetland del Sur). Después de la reproducción se dispersa al norte llegando hasta la latitud del Ecuador en

la que nidifica en algunas islas subantárticas. Aunque los registros con evidencias son escasos en Chile, es posible que nidifique en el sur del país.

Marín (2004) da cuenta del registro de varios ejemplares en la zona de Chiloé en 1970, incorporándola a su lista como una “especie rara”.

La única evidencia publicada de esta nueva especie para Chile es una fotografía de enero 2011, la que probablemente corresponde a *P. bailloni*, pero con esta única imagen disponible no es posible separarla de *P. myrtae*.

Sin poder precisar la especie, se propone señalarla como *P. bailloni/myrtae* en la Lista de las Aves de Chile.


en el archipiélago de Juan Fernández, siendo escasos los avistamientos en aguas continentales.

El primer registro documentado para esta especie cerca de Chile continental se realiza en junio de 2007.

los Océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

Marín (2004) la incorpora a su lista sin hacer comentarios. Seguramente se trata de una especie regular, pero con pocas observaciones por la dificultad de llegar a los sectores donde está presente. La primera evidencia conocida para el país se obtiene en febrero de 2007.

Golondrina de mar de vientre negro (*Fregetta tropica*), Paso Drake cerca del Cabo de Hornos, provincial de la Antártica Chilena, foto Enrique Couve. **a)** 24 de febrero de 2007; **b)** 26 de febrero de 2014.



Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
24 febrero 2007	1	Paso Drake, cerca del Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena	E. Couve	4
2 noviembre 2013	1	Estrecho de Magallanes, Provincia de Magallanes	S. Imberti	1
15 marzo 2013	1	Al sur del Golfo de Penas, Provincia Capitán Prat	F. Schmitt	1
26 febrero 2014	1	Paso Drake, cerca del Cabo de Hornos, Provincia Antártica Chilena	E. Couve	4

Golondrina de mar peruana

Oceanodroma tethys

Wedge-rumped Storm-Petrel

Se reproduce en las Islas Galápagos en Ecuador, Islas Pescadores y San Gallán en Perú, y en Chile se conoce una colonia

de reproducción en Isla Grande, al sur de Caldera (Simeone et al. 2003, Simeone et al. 2005).

Marín (2004) la incorpora a su lista sin hacer comentarios. A pesar de conocerse un sitio de reproducción en el país, sus registros son siempre escasos.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
13 noviembre 2004	1 o 2	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	Á. Jaramillo	1
15 marzo 2013	2	Pelágico frente a Taltal, Provincia Antofagasta	F. Schmitt	1
15 marzo 2013	1	Pelágico frente a Papos, Provincia Antofagasta	F. Schmitt	1

Ave del trópico de cola roja

Phaeton rubricauda

Red-tailed Tropicbird

Tiene un rango muy extenso, del Océano Indico al Pacífico,

nidificando en una multitud de islas. En Chile nidifica en las islas Desventuradas, Isla Salas y Gómez e Isla de Pascua, pero los avistamientos en aguas continentales son escasos.

Muy raro en la costa continental de Chile.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
11 enero 2012	1	Balneario de Flamenco, Provincia de Chañaral	G. Alfsen, F. de Groote	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)

Pillo

Ciconia maguari

Maguari Stork

Tiene un rango amplio en América del Sur, ocupando las sabanas del norte y del centro-sur del continente. Relativamente común en la Pampa y humedales en Argentina, donde los ejemplares que nidifican al sur son migratorios.

Marín (2004) lo señala como un errante casual en el país, incorporándolo como una “especie rara”, mencionando un último registro en la provincia de Cautín en 1971.



Pillo (*Ciconia maguari*), 13 de noviembre de 2014, desembocadura del río Lluta, provincia de Arica, foto Rodrigo Tapia.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
13 noviembre 2014	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Tapia	1, 4

Piquero blanco*Sula dactylatra*

Masked Booby

Especie pantropical, nidificando en una multitud de islas tropicales. En Chile nidifica en las Islas Desventuradas, Isla Sa-

las y Gómez e Isla de Pascua, siendo escasos los registros en aguas continentales.

Los únicos registros documentados para esta especie en Chile continental se realizan en 2012.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
9 mayo 2012	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	R. Herrera	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
24 agosto 2012	1	Cachagua, Provincia de Petorca	R. Reyes, R. Tapia	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)

Piquero de patas azules*Sula nebouxii*

Blue-footed Booby

Nidifica en las aguas tropicales desde el noroeste de México al norte de Perú. Raro en el norte de Chile, que corresponde al extremo sur de su rango habitual. Se desplaza según disponibilidad de alimento, y en Chile se puede observar en cantidades mayores en épocas de El Niño.

Con registros en Arica y Antofagasta, Marín (2004) lo incorpora a su lista como una “especie rara”, señalando que se puede considerar para Chile como un errante ocasional asociado con el fenómeno de El Niño. Con posterioridad se informa de su nidificación en la Isla San Félix (Aguirre et al. 2009).



Piquero de patas azules (*Sula nebouxii*), 1 de agosto 2012, guaneras al sur de Arica, provincia de Arica, foto Fabrice Schmitt.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
3 octubre 2004	1	Arica, Provincia de Arica	B. Knapton	1
25 noviembre 2008	1	Desembocadura río Camarones, Provincia El Tamarugal	I. Azócar, R. Barros, F. Díaz, R. Reyes, R. Tapia	1
19 diciembre 2009	5	Arica, Provincia de Arica	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2010b)
17 noviembre 2011	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
1 agosto 2012	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
1 agosto 2012	3	Guaneras al sur de Arica, Provincia de Arica	F. Schmitt	1, 4
1 agosto 2012	1	Puerto de Arica, Provincia de Arica	F. Schmitt	1
3 mayo 2013	3 (2 muertos)	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
6 octubre 2014	1	Puerto de Arica, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus	1
4 noviembre 2014	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	F. Díaz	1

Piquero café*Sula leucogaster*

Brown Booby

Especie pantropical, nidificando en una multitud de islas tropicales.

Marín (2004) incorpora esta especie a su lista, sin comentarios, a pesar de no existir evidencias para el país. El primer registro documentado para Chile se realiza en noviembre de 2012.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
14 noviembre 2012	1	Motu Nui, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	M. Flores, R. Hucke-Gaete, P. Lazo	1, 2 (Flores et al. 2013, Barros & Schmitt 2014a)

Piquero de patas rojas*Sula sula*

Red-footed Booby

Especie pantropical, nidificando en una multitud de islas tropicales.

Marín (2004) menciona 2 registros para la Isla Salas y Gómez, pero por no existir evidencias la considera como una “especie hipotética”. Posteriormente se publica la fotografía de uno de ellos (Barros 2010).

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 14 febrero y 20 abril 2010	1	Motu Nui, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	D. González-Acuña, P. Lazo, C. Chávez, K. Ardiles	2 (González-Acuña et al. 2010)
19 marzo 2013	2	Sector Motus, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	Á. Jaramillo, P. Lazo	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)

Pelícano pardo*Pelecanus occidentalis*

Brown Pelican

Presente en la costa atlántica de América del Norte y Central, el Caribe, y en la costa pacífica nidifica desde California hasta el norte de Perú e Islas Galápagos. Llega regularmente hasta Lima.

El primer registro para Chile se realiza en enero de 2004.



Pelícano pardo (*Pelecanus occidentalis*), 18 de octubre de 2014, caleta de Coquimbo, provincia de Elqui, foto Manuel Rojas.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
7 enero 2004	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	D. Vander P.	1
Entre 8 y 10 febrero 2004	4	Arica, Provincia de Arica	Á. Jaramillo	1
10 febrero 2004	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo	1
12 noviembre 2004	2	Arica, Provincia de Arica	Á. Jaramillo	1
19 y 20 noviembre 2006	1	Arica, Provincia de Arica	P. Burke, Á. Jaramillo, R. Matus	1
12 diciembre 2007	1	Puerto de Arica, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus	1, 2 (Barros & Schmitt 2008b)
29 marzo 2008	1	Puerto de Arica, Provincia de Arica	H. Cordero	1, 2 (Barros & Schmitt 2008c)
18 febrero 2012	1	Antofagasta, Provincia de Antofagasta	Ch. Moreno	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
22 diciembre 2012	1	Bahía La Herradura, Coquimbo, Provincia de Elqui	V. Pastén-Marambio	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)
2 abril al 12 mayo 2013	1	Antofagasta, Provincia de Antofagasta	O. Gómez, Ch. Moreno	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
23 noviembre 2013	1	Caleta de Coquimbo, Provincia de Elqui	M. Rojas	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
Entre 12 enero y 23 febrero 2014	1	Antofagasta, Provincia de Antofagasta	Ch. Moreno	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
19 julio 2014	1	Puerto de Coquimbo, Provincia de Elqui	L. Valdivia, C. Vallejos	1
15 agosto 2014	1	Estero El Culebrón, Provincia de Elqui	C. Piñones	1
18 octubre 2014	1	Caleta de Coquimbo, Provincia de Elqui	R. Barraza, I. Lefort, F. Medrano, M. Rojas, C. Pizarro, L. Ugarte, M. Vanerio, D. Villagrán	1, 4

Garza tricolor

Egretta tricolor

Tricolored Heron

Presente en la costa atlántica desde el sureste de Estados Unidos hasta el noreste de Brasil, y en la costa pacífica desde Baja California hasta el sur de Perú.

Con varios avistamientos sin evidencia verificable, Marín (2004) la consideró como una “especie hipotética” para el país. Posteriormente se publican imágenes de algunos de ellos (Barros 2015b).

Garza tricolor (*Egretta tricolor*), 9 de agosto de 2014, Antofagasta, provincia de Antofagasta, foto Charly Moreno.



Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
22 octubre 2004	1	Península Alacrán, Arica, Provincia de Arica	B. Knapton	1
Entre 11 mayo y 5 octubre 2007	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo, S. Pardo	2 (Barros & Schmitt 2007c, 2008a)
Entre 22 y 30 agosto 2010	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo	1, 2 (Barros & Schmitt 2011a)
2 septiembre 2010	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo	2 (Barros & Schmitt 2011b)
Entre 10 junio y 18 julio 2014	1-2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Jara, E. Price, Ch. Moreno, F. Olivares, R. Peredo, A. Puiggros, A. Silva	1
Entre 16 julio y 24 agosto 2014	1	Antofagasta, Provincia de Antofagasta	Ch. Moreno, F. de Groote, A. Silva	1, 4
Entre 6 y 27 octubre 2014	1	Tranque Sobraya, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus, R. Silva, D. Terán	1

Garcita azulada

Butorides striata

Striated Heron

Rango extenso en el mundo, encontrada en América del Sur, África y Australasia. En la costa pacífica se encuentra regu-

larmente hasta Lima.

Con registros en las provincias de Arica, Tocopilla, Elqui y Valparaíso, Marín (2004) la agrega a su lista como una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
17 noviembre 2010	1	Valle del río Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus	1
Entre 8 diciembre 2010 y 6 enero 2011	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	P. Valencia, C. Piñones, M. Rojas, L. Betinelli	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
31 marzo 2012	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	M. Olivares	1
10 y 25 junio 2012	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	C. Tirado, P. Valencia	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
17 septiembre 2012	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	P. Cáceres, R. Jiménez, N. Muggli	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)

Garza chiflón

Syrigma sibilatrix

Whistling Heron

Presente en el extremo norte de América del Sur (este de Colombia y oeste de Venezuela), y desde Bolivia hacia el sureste

de ese país y noreste de Argentina. Residente, pero algunos movimientos pueden ocurrir debido a variaciones en condiciones locales (niveles de agua).

El primer registro para el país se realiza en diciembre de 2009.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 22 diciembre 2009 y 9 enero 2010	1	Laguna de Batuco, Provincia de Chacabuco	F. Díaz S., F. Schmitt, P. Crithlow, M. Crithlow, I. Azócar, R. Barros, G. Cassus, M. Gutiérrez, C. Henríquez, R. Moraga, P. Valenzuela	1, 2 (Díaz & Schmitt 2010, Barros & Schmitt 2010b)
Entre 11 y 12 mayo 2012	1	Quitacalzón, norte de Valdivia, Provincia de Valdivia	P. Contreras, M. Sepúlveda, P. Stowhas	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)

Huairavo de corona amarilla

Nyctanassa violacea

Yellow-crowned Night-Heron

Presente en el centro y este de Estados Unidos, hasta la costa atlántica brasilera y hasta el centro de Perú en la costa pacífica. Rango en expansión hacia el sur en la costa pacífica, nidificando actualmente en los alrededores de Lima.

El primer registro para el país se realiza en noviembre de 2009.



Huairavo de corona amarilla (*Nyctanassa violacea*), 16 de octubre de 2011, puerto de Arica, provincia de Arica, foto Juan Aguirre.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
11 noviembre 2009	1	Puerto de Arica, Provincia de Arica	S. Howell, R. Herrera	2 (Howell & Herrera 2010, Barros & Schmitt 2010b)
6 julio 2010	2	Puerto de Arica, Provincia de Arica	R. Herrera	2 (Barros & Schmitt 2011a)
Entre 7 y 9 enero 2011	1 y 2	Desembocadura del río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
24 abril 2011	2	Puerto de Arica, Provincia de Arica	P. Cáceres	1, 2 (Barros & Schmitt 2012a)
16 octubre 2011	2	Puerto de Arica, Provincia de Arica	J. Aguirre	4
1 agosto 2012	3	Puerto de Arica, Provincia de Arica	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
22 agosto 2013	2	Puerto de Arica, Provincia de Arica	R. Tapia	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
19 septiembre 2013	1	Llico, Provincia de Curicó	T. Rannou	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
24 octubre 2013	1	Puerto de Arica, Provincia de Arica	F. Medrano	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
10 diciembre 2013	1	Puerto de Arica, Provincia de Arica	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)

Cuervo de pantano de cara pelada

Phimosus infuscatus

Bare-faced Ibis

Desde el norte de América del Sur hasta el noreste de Argen-

tina y Uruguay. Movimientos locales ocurren según las precipitaciones y niveles de agua en sus sectores de reproducción.

El único registro para el país se realiza en junio de 2012.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
8 junio 2012	1	Quitor, San Pedro Atacama, Provincia de El Loa	N. Amaro	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)

Bandurria de la puna

Theristicus melanopis branickii

Andean Ibis

Esta subespecie, a veces considerada como especie distinta, se encuentra en los Andes desde Ecuador hacia el sur de Perú y noroeste de Bolivia. No se conocen los movimientos post-reproductivos de esta subespecie.

Marín (2004) da cuenta de un único registro en 1853 en Parinacota. Subespecie rara pero probablemente regular en el extremo norte de Chile, donde también se observa la subespecie nominal.

Bandurria de la puna (*Theristicus melanopis branickii*), 13 de noviembre de 2013, Valle del Lluta, provincia de Arica, foto Fabrice Schmitt.



Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
5 julio 2004	1	Valle de Azapa (km 20), Provincia de Arica	C. Estades, J. Aguirre y Ch. Tala	2 (Estades et al. 2004)
14 junio 2006	7	Molinos, Valle del Lluta, Provincia de Arica	R. Barros, N. Ferriz	1, 2 (Barros & Schmitt 2006)
21 noviembre 2006	7	Poconchile, Provincia de Arica	P. Burke	1
10 septiembre 2007	10	Valle del Lluta, Provincia de Arica	S. Pardo	2 (Barros & Schmitt 2008a)
18 noviembre 2009	1	Valle del Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus, M. Bowen	1
24 octubre 2013	10	Valle del Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus, S. Hull, R. Lewis, W. Mortimer	1
13 noviembre 2013	9	Valle del Lluta, Provincia de Arica	F. Schmitt	1, 4
22 agosto 2014	7	Valle del Lluta, Provincia de Arica	R. González	1
27 diciembre 2014	2	Valle del Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno, A. Puiggros	1

Espátula*Platalea ajaja*

Roseate Spoonbill

Repatriación extensa desde el sureste de Estados Unidos hasta el noreste de Argentina. Generalmente sedentario, siendo sus movimientos en América del Sur poco conocidos, probablemente solamente dispersión post-reproductiva o según los niveles de agua de los humedales.

Con pocos registros en el país, Marín (2004) la considera una “especie rara”, señalando la posibilidad que en el pasado nidificara en Chile, pero actualmente se trata de un raro errante. Agrega que algunos registros históricos podrían ser errores por cambios de frontera.



Espátula (*Platalea ajaja*), 18 de marzo de 2014, desembocadura del río Huasco, provincia del Huasco, foto Philippe Dandois.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 23 y 30 marzo 2008	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	H. Cordero, R. Demangel	1, 2 (Barros & Schmitt 2008c)
19 noviembre 2010	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus, R. Peredo	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
18 marzo 2014	1	Desembocadura río Huasco, Provincia de Huasco	P. Dandois	1, 4

Vari huevetero*Circus buffoni*

Long-winged Harrier

Parte de la población nidifica desde Colombia hasta las Guayanas y norte de Brasil, y otra parte nidifica desde Bolivia

hasta el centro y norte de Argentina. Las aves que nidifican más al sur, migran al norte después de la reproducción.

Con varios registros para Chile, Marín (2004) la incorpora a su lista como una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
29 septiembre 2005	1	Cerca de Estación Colina, Provincia de Chacabuco	R. Demangel	2 (Demangel 2006)
Entre 14 octubre y 7 diciembre 2006	1	Santa Inés, Lampa, Provincia de Chacabuco	R. Barros, J. Ferrada, P. Cáceres, R. González, Á. Jaramillo, R. Matus, R. Moraga	1, 2 (Barros & Schmitt 2007a)
Entre 4 octubre y 15 noviembre 2007	1	Santa Inés, Lampa, Provincia de Chacabuco	F. Schmitt, R. Barros, P. Berrigan, F. Díaz	1

Aguilucho langostero*Buteo swainsoni*

Swainson's Hawk

Migratorio boreal. Nidifica en el oeste y centro de América del Norte, migrando principalmente al norte de Argentina, sur de Brasil y Paraguay.

Marín (2004) lo incorpora como una “especie rara” en su

lista, a partir de 2 registros conocidos: en la Isla Alejandro Selkirk y en la cordillera de Curicó. Este último se trata de un error de identificación (Barros 2015b). En noviembre 2007 se informa de un ejemplar presente en el Centro de Rescate de Fauna de la Universidad de Antofagasta, sin que se tenga certeza de la forma en que éste llegó a Chile, ni dónde y cuándo fue capturado.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
noviembre 2007	1	Antofagasta, Provincia de Antofagasta	Info. C. González B.	2 (Barros & Schmitt 2008b)

Tagüita purpúrea*Porphyrio martinicus*

Purple Gallinule

Repartición extensa en las Américas, desde el sureste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Principalmente residente en América del Sur, pero poblaciones más sureñas migran al norte durante el invierno austral. Las condiciones locales como el nivel de agua en los humedales también pueden provocar desplazamientos.

Con 2 ejemplares capturados en Pica y uno en San Pedro de Atacama, Marín (2004) la incorpora a su lista como una “especie rara”.



Tagüita purpúrea (*Porphyrio martinicus*), 28 de mayo de 2014, Mejillones, provincia de Antofagasta, foto Milenka Sánchez.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
14 julio 2011	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	J. Aguirre	1, 2 (Barros & Schmitt 2012a)
5 enero 2012	1	Iquique, Provincia de Iquique	Info. V. Malinarich (SAG)	2 (Barros & Schmitt 2014a)
Entre 9 y 16 noviembre 2013	1	Tranque Sobraya, Azapa, Provincia de Arica	F. Díaz, R. Barros, P. Burke, D. Davis, F. de Groote, R. Matus, F. Medrano, R. Peredo, E. Sandvig, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
28 mayo 2014	1 muerto	Mejillones, Provincia de Antofagasta	Info. M. Sánchez	4

Chorlo dorado del Pacífico*Pluvialis fulva*

Pacific Golden-Plover

Migratorio boreal de larga distancia, nidificando en el extremo norte de Rusia y oeste de Alaska, y migrando hacia Australasia. Migratorio raro pero regular en el oeste de Estados Unidos y en islas del Pacífico tropical. Sin registros confirmados para América del Sur.

El único registro con evidencia para Chile se realiza en marzo-abril de 2014 en la Isla de Pascua.



Chorlo dorado del Pacífico (*Pluvialis fulva*), 2 de abril de 2014, sector Vaihu, Isla de Pascua, provincia de Isla de Pascua, foto Sebastián Yancovic.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 19 marzo y 2 abril 2014	1	Sector Vaihu, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	E. Quezada, S. Yancovic	4

Chorlo de pico grueso*Charadrius wilsonia*

Wilson's Plover

Especie costera presente en el lado Atlántico desde el este de Estados Unidos hasta el noreste de Brasil, y del lado Pacífico nidifica desde Baja California hasta el norte de Perú. Migra-

torio parcial, llegando hasta Lima y ocasionalmente más al sur en la costa peruana.

Con un solo avistamiento en la provincia de Arica, al no existir evidencia, Marín (2004) lo consideró como una “especie hipotética”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
7 diciembre 2008	1	Desembocadura río Loa, Provincia de Tocopilla	J.C. Torres-Mura	2 (Torres-Mura 2009)

Pitotoy solitario*Tringa solitaria*

Solitary Sandpiper

Migratorio boreal, nidificando en Canadá y norte de Estados Unidos, y migrando hacia América Central y América del Sur, llegando hasta el centro de Argentina.

Con observaciones en la provincia de Arica, por no existir evidencias Marín (2004) lo consideró como una “especie hipotética”. El primer registro documentado para el país se realiza en octubre de 2008.



Pitotoy solitario (*Tringa solitaria*), 21 de octubre de 2014, desembocadura del río Huasco, provincia del Huasco, foto Philippe Dandois.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
28 octubre 2008	1	Desembocadura río Camarones, Provincia de Arica	J. Aguirre	2 (Barros 2010)
Entre 21 y 25 octubre 2014	1	Desembocadura río Huasco, Provincia de Huasco	P. Dandois	1, 4

Playero gris*Tringa incana*

Wandering Tattler

Migratorio boreal, nidificando en el extremo este de Rusia y Alaska, y migrando principalmente a las islas del Pacífico

tropical. Migratorio regular en la costa pacífica de Estados Unidos y México, y en las Islas Galápagos. Llega raramente a la costa peruana.

Con registros en las provincias de Arica y Antofagasta, Marín (2004) lo suma a su lista como una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 19 y 21 febrero 2007	1	Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	A. Farnsworth	1
Marzo 2011	2	Sector Tahai, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	2 (Barros & Schmitt 2012a)
20 marzo 2012	1	Sector Tahai, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	Á. Jaramillo	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
25 octubre 2012	2	Península de Cavancha, Iquique, Provincia de Iquique	P. Villegas	1, 2 (Villegas 2013)
26 noviembre 2012	1	Península de Cavancha, Iquique, Provincia de Iquique	P. Villegas	1, 2 (Villegas 2013; Barros & Schmitt 2014a)
Entre 15 y 16 marzo 2013	1	Tahai, Isla de Pascua, Provincia de Isla de Pascua	Á. Jaramillo	1
26 abril 2013	1	Península de Cavancha, Iquique, Provincia de Iquique	P. Villegas	1, 2 (Villegas 2013; Barros & Schmitt 2014b)

Batitú*Bartramia longicauda*

Upland Sandpiper

Migratorio boreal, nidificando en Canadá y norte de Estados Unidos, y migrando principalmente hacia Paraguay, sur de Brasil y centro de Argentina.

Marín (2004) da cuenta de 2 especímenes capturados en

la cordillera de Santiago en 1888 y un avistamiento en 1987 en el Salar de Pedernales. Posteriormente se publica la fotografía de un ejemplar capturado en Arica en 2003 (Barros 2014). Los avistamientos realizados en los últimos años muestran que se trata de una especie migratoria rara, pero regular en Chile.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
1 abril 2005	1	Mina Escondida, Provincia de Antofagasta	A. Aguilar	1, 2 (Barros 2014)
17 marzo 2009	1	Mejillones, Provincia de Antofagasta	N. Zeller	2 (Barros & Schmitt 2010a)
26 marzo 2009	1	Cerca de Salar de Tara, Provincia de El Loa	A. Muñoz, A. Castro	2 (Barros & Schmitt 2011a)
15 marzo 2011	1	21 km al sur de Mejillones, Provincia de Antofagasta	J. Aguayo	1, 2 (Barros & Schmitt 2012a)
13 abril 2011	1	Chabunco, Punta Arenas, Provincia de Magallanes	A. Campbell	1, 2 (Barros 2014)
12 marzo 2012	1	Los Monteros, Vallenar, Provincia de Huasco	V. Escobar, E. Riveros	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
28 marzo 2012	1	Sureste de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta	J. Bendek	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
1 abril 2012	2	Acceso P.N. Llullaillaco, Provincia de Antofagasta	D. Demangel	1, 2 (Barros 2014)
3 abril 2012	1	Punta Cachos, Hacienda Castilla, Provincia de Copiapó	N. Torés	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
7 abril 2012	1	Ayllu de Coyo, Provincia de El Loa	C. Pizarro (CONAF)	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
12 abril 2012	4	Mejillones, Provincia de Antofagasta	N. Biaggini, M. Fernández	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
17 abril 2012	1	Cerro Challacollo, Provincia de El Tamarugal	J.P. Gabella, B. Zúñiga	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
22 marzo 2013	1	Punta Yayas, Hornitos, Provincia de Antofagasta	M. Sánchez, S. Hernández	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
8 abril 2013	1	Huala Huala, Hornitos, Provincia de Antofagasta	M. Sánchez, S. Hernández, M. Fernández, N. Biaggini	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
9 marzo 2014	1	Iquique, Provincia de Iquique	Info. V. Malinarich (SAG)	1, 2 (Barros 2014)
24 marzo 2014	6	Salar de Punta Negra, Provincia de Antofagasta	F. de Groote, R. Pino	1, 2 (Barros 2014)
27 marzo 2014	5	Sector Aguas Blancas, Provincia de Antofagasta	F. Medrano, B. Segura	1, 2 (Barros 2014)
2 abril 2014	1	Arica, Provincia de Arica	Info. A. Jara (SAG)	1, 2 (Barros 2014)
4 abril 2014	1	Salar de Punta Negra, Provincia de Antofagasta	F. de Groote	1
5 abril 2014	3	PN Llullaillaco, ladera oeste, Provincia de Antofagasta	F. de Groote	1
5 abril 2014	3	PN Llullaillaco, Qda. Zorrita, Provincia de Antofagasta	F. de Groote	1, 2 (Barros 2014)

Zarapito de cola barrada*Limosa lapponica*

Bar-tailed Godwit

Migratorio boreal, nidificando en el extremo norte de Europa y Rusia y oeste de Alaska, migrando hacia las costas de Euro-

pa, África y Australasia. Migratorio muy raro pero regular en la costa pacífica de Estados Unidos.

En primer registro para el país se realiza en noviembre de 2013.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
8 noviembre 2013	1	Quetalmahue, Chiloé, Provincia de Chiloé	S. Hansson	2 (Hansson 2014; Barros & Schmitt 2015)

Zarapito moteado*Limosa fedoa*

Marbled Godwit

Migratorio boreal, nidificando principalmente en el centro de Canadá y Estados Unidos, y migrando hacia las costas atlánticas y pacíficas de América Central, llegando regularmente hasta el norte de Perú.

Con registros en las provincias de Arica, Iquique, Petorca, Valparaíso y Llanquihue, Marín (2004) lo incorpora a su lista como una "especie rara". Los 6 avistamientos realizados en la desembocadura del río Elqui corresponden muy probablemente al mismo ejemplar que ha regresado cada año.



Zarapito moteado (*Limosa fedoa*), 14 de noviembre de 2014, desembocadura del río Elqui, provincia de Elqui, foto Marcelo Olivares.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
17 octubre 2004	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo	2 (Peredo et al. 2007)
Entre 5 octubre y 11 noviembre 2005	1	Desembocadura río Aconcagua, Provincia de Valparaíso	R. Reyes, R. Tapia	1, 2 (Tapia 2005, Schmitt & Barros 2006a)
Entre 14 enero y 4 marzo 2007	1	Estero Mantagua, Provincia de Valparaíso	C. Bell, H. Cordero, R. Reyes	1, 2 (Barros & Schmitt 2007b)
1 enero 2008	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	P. Valencia	1
Entre 14 enero y 12 febrero 2008	1	Estero Mantagua, Provincia de Valparaíso	R. Reyes	1, 2 (Barros & Schmitt 2008b)
Entre 6 diciembre 2008 y 16 enero 2009	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	P. Valencia, R. Barros, F. Díaz	1, 2 (Barros & Schmitt 2009b)
Entre 8 de diciembre 2010 y 1 marzo 2011	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	P. Valencia, C. Piñones, L. Betinelli, E. Buchel, Y. Kayser, F. Sane, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b, 2012a)
7 noviembre 2012	1	Punta Ester, Calderilla, Provincia de Copiapó	F. Díaz, E. Riveros	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)
Entre 9 noviembre 2012 y 2 febrero 2013	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	L. Hostens, M. Olivares, M. Rojas, F. Schmitt, P. Valencia	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)
Entre 11 noviembre 2013 y 31 marzo 2014	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	R. Barraza, P. Cáceres, K. Hamasaki, E. Navarro, F. Olivares, M. Olivares, X. Olivares, S. Pardo, C. Piñones, M. Rojas, P. Valencia, D. Valverde	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
Entre 13 noviembre y 9 diciembre 2014	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	R. Barraza, K. Horton, F. Méndez, N. Mercado, C. Piñones, F. Olivares, M. Olivares, L. Valdivia, D. Valverde, C. Vallejos, L. Ugarte	1, 4

Playero de patas largas*Calidris himantopus*

Stilt Sandpiper

Migratorio boreal, nidificando en el extremo norte de Canadá, y migrando principalmente a Bolivia, sur de Brasil y centro y norte de Argentina.

Con pocos registros para el país, Marín (2004) lo suma a su lista como una “especie rara”.



Playero de patas largas (*Calidris himantopus*), 11 de diciembre de 2008, desembocadura del río Lluta, provincia de Arica, foto Álvaro Jaramillo.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
16 septiembre 2005	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	B. Knapton	1
11 octubre 2007	1	Desembocadura río Huasco, Provincia de Huasco	F. Olivares Z.	2 (Barros & Schmitt 2008a)
Entre 27 y 28 marzo 2008	1 y 2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	H. Cordero, R. Demangel	1, 2 (Barros & Schmitt 2008c)
6 septiembre 2008	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo	1, 2 (Barros & Schmitt 2009a)
11 diciembre 2008	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus	4
Entre 1 y 5 marzo 2009	1 a 7	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	F. Schmitt, R. Barros, R. Peredo	1, 2 (Barros & Schmitt 2010a)
Entre 19 y 20 noviembre 2009	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus, M. Bowen, B. Knapton	1
9 abril 2010	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo	1, 2 (Barros & Schmitt 2011a)
21 abril 2011	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	P. Cáceres	1, 2 (Barros & Schmitt 2012a)
16 febrero 2012	2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo	1
6 mayo 2012	1	Punta Teatinos, Provincia del Elqui	V. Bravo, D. Rodríguez	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
25 octubre 2012	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)
Entre 4 y 17 marzo 2013	1-2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
3 abril 2013	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	P. Arce, R. Barros, M. Daigre, F. Díaz, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
11 abril 2013	1	Hacienda El Tangué, Tongoy, Provincia de Elqui	C. Piñones, C. Zuleta	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
Entre 10 septiembre y 16 noviembre 2013	1 - 4	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Barros, P. Burke, D. Davis, F. Díaz, Á. Jaramillo, R. Matus, F. Medrano, Ch. Moreno, R. Peredo, E. Sandvig, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
Entre 17 febrero y 3 abril 2014	1 - 5	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno, R. Peredo, A. Puiggros	1
5 abril 2014	2	Puente Negro, Lampa, Provincia de Chacabuco	S. Bitrán	1
3 mayo 2014	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Barros	1

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
21 agosto 2014	2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. González	1
Entre 22 y 31 octubre 2014	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	F. Medrano, R. Silva, D. Terán, A. Vielma	1
15 y 18 noviembre 2014	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno,	1
20 noviembre 2014	2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Reyes	1

Playero zarapito

Calidris ferruginea

Curlew Sandpiper

Migratorio boreal, nidificando en el extremo norte de Rusia y migrando hacia las costas de África y Australasia. Avista-

mientos raros pero regulares en Estados Unidos. Registros escasos en América del Sur.

El único registro para el país se realiza en noviembre de 2013.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 7 y 10 noviembre 2013	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo, F. Díaz, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)

Playero canela

Calidris subruficollis

Buff-breasted Sandpiper

Migratorio boreal, nidificando en la tundra del extremo este de Rusia y de Canadá, y migrando hacia el sureste de Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y norte de Argentina.

El primer registro para el país se realiza en octubre de 2004.



Playero canela (*Calidris subruficollis*), 15 de noviembre de 2014, desembocadura del río Lluta, provincial de Arica, foto Charly Moreno.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
22 octubre 2004	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	B. Knapton	1
15 noviembre 2008	2	Playa de Choros, Provincia del Elqui	R. Moraga	1, 2 (Barros & Schmitt 2009b)
Entre 14 y 28 noviembre 2014	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	P. Burke, J. Collins, R. Matus, L. Nuttall, R. Siebert, F. Díaz, Ch. Moreno, R. Peredo, A. Puiggros, R. Reyes, R. Silva	1, 4

Playero occidental

Calidris mauri

Western Sandpiper

Migratorio boreal, nidificando en el extremo este de Rusia y Alaska, y migrando hacia las costas atlánticas y pacíficas de América Central y del norte de América del Sur. Llega regularmente hasta el sur de Perú.

Con un solo registro en la provincia de Elqui, por no existir evidencias Marín (2004) lo considera como una "especie hipotética".



Playero occidental (*Calidris mauri*), 7 de noviembre de 2014, desembocadura río Lluta, provincia de Arica, foto Fernando Díaz.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 22 octubre y 23 noviembre 2004	1-3	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	B. Knapton, Á. Jaramillo	1
20 y 23 agosto 2006	1	Salinas del Yali, Provincia de San Antonio	F. Schmitt, R. Barros, R. González	1, 2 (Barros & Schmitt 2007a)
10 y 18 noviembre 2006	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo, P. Burke	1, 2 (Barros & Schmitt 2007b)
5 febrero 2008	1	Laguna Petrel, Pichilemu, Provincia Cardenal Caro	R. Barros, F. Díaz	1, 2 (Barros & Schmitt 2008b)
22 junio 2008	1	Playa de Cartagena, Provincia de San Antonio	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2008c)
29 noviembre 2008	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	P. Valencia	1, 2 (Barros & Schmitt 2009b, Schmitt & Barros 2009)
Entre 27 junio y 5 julio de 2009	1	Desembocadura estero San Sebastián, Provincia de San Antonio	R. Demangel, R. Barros, P. Cáceres, F. Díaz, R. Reyes, R. Tapia	1, 2 (Barros & Schmitt 2010a)
19 noviembre 2010	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
20 enero 2011	1	Calderilla, Provincia de Copiapó	J. Jerez	1
3 octubre 2011	1	Laguna Petrel, Pichilemu, Provincia Cardenal Caro	R. Barros, F. Díaz	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
25 enero y 17 febrero 2012	2-3	Calderilla, Provincia de Copiapó	J. Jerez	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
25 octubre 2012	2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)
11 febrero 2013	1	Calderilla, Provincia de Copiapó	J. Jerez	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)
2 marzo 2013	1	Calderilla, Provincia de Copiapó	M. Daigre, F. Díaz, E. Navarro	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
12 junio 2013	1	Desembocadura río La Ligua, Provincia de Petorca	S. Lizana, R. Ortega, C. Yáñez	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
26 octubre 2013	1	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	I. Azócar, R. Barros, P. Burke, L. Caldera, D. Ivulic, Á. Jaramillo, R. Matus, O. Mercado, R. Petitpas, C. Soto, N. Torés, N. Velasco	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
25 agosto 2014	1	Esteros El Culebrón, Provincia de Elqui	R. Barraza, F. Olivares	1
Entre 3 octubre y 20 noviembre 2014	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus, F. Díaz, R. Reyes	1, 4

Pollito de mar boreal

Phalaropus lobatus

Red-necked Phalarope

Migratorio boreal nidificando en el extremo norte de Europa, Rusia y América del Norte, y migrando en algunos sectores de alta mar en el Pacífico frente a Perú y Ecuador, en el Golfo Árabe y en Melanesia.

Marín (2004) lo suma a su lista sin ningún comentario, a pesar de ser una especie con muy pocos registros documentados en Chile (Barros 2015b).



Pollito de mar boreal (*Phalaropus lobatus*), 7 de diciembre de 2014, laguna de Batuco, provincia de Chacabuco, foto Nelson Contardo.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
7 diciembre 2014	1	Laguna de Batuco, Provincia de Chacabuco	N. Contardo, L. Portugal	1, 4

Salteador polar

Stercorarius maccormicki

South Polar Skua

Nidifica en la Antártica y migra hacia el norte del Océano Pacífico y del Océano Atlántico.

Marín (2004) no incorpora esta especie en su lista para Chile, mientras Jaramillo (2003) señala que ha sido registrado en varios puntos frente a la costa chilena, pero no se dispone de fotos o de especímenes para su identificación.



Salteador polar (*Stercorarius maccormicki*), 24 de octubre de 2008, pelágico frente a Iquique, foto Steve Bird.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
12 mayo 2007	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	R. Reyes, R. Tapia	1, 2 (Reyes & Tapia 2007)
24 octubre 2008	1	Pelágico frente a Iquique, Provincia de Iquique	S. Bird	4
12 diciembre 2010	1	Fiordo Parry, seno Almirantazgo, Provincia Tierra del Fuego	R. Matus	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)

Salteador pardo

Stercorarius antarcticus

Brown Skua

Nidifica en Península Antártica y muchas islas subantárticas. Las colonias más cercanas a Chile se encuentran en las

Islas Malvinas.

Marín (2004) suma esta especie a su lista sin ningún comentario, a pesar de no existir evidencias para el país. El único registro confirmado para Chile se realiza en 2011 (Barros 2015b).

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 29 septiembre y 21 octubre 2011	1 y 2	Isla Bartolomé, archipiélago Diego Ramírez, Provincia Antártica Chilena	V. Raimilla	1, 2 (Raimilla 2012, Barros & Schmitt 2012b)

Gaviota de las Galápagos

Creagrus furcatus

Swallow-tailed Gull

Nidifica en las Islas Galápagos, y se dispersa después de la reproducción en el este del Pacífico, llegando regularmente hasta el centro de Perú; más rara más al sur.

Con registros frente a Chañaral, Algarrobo, Isla de San Ambrosio y otros puntos en el norte del país, Marín (2004) lo incorpora a su lista como una “especie rara”.



Gaviota de las Galápagos (*Creagrus furcatus*), 17 de octubre de 2014, ruta entre Juan Fernández y Valparaíso, provincia de Valparaíso, foto Rodrigo Reyes.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
13 noviembre 2004	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	Á. Jaramillo	1
11 noviembre 2006	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Barros, P. Cáceres, R. González, R. Moraga, R. Reyes, B. Rosende, R. Rosende	1
7 marzo 2009	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	R. Barros, S. Dardanelli, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2010a)
6 diciembre 2009	5	Pelágico frente a Caldera, Provincia de Copiapó	P. Robertson	2 (Barros & Schmitt 2010b)
30 diciembre 2010	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	F. Díaz, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
24 abril 2011	6	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	P. Cáceres	1, 2 (Barros & Schmitt 2012a)
15 marzo 2013	17	Pelágico frente a Antofagasta, Provincia de Antofagasta	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
10 y 14 diciembre 2013	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	F. Schmitt, R. Tapia	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
17 octubre 2014	1	Ruta entre Juan Fernández y Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Reyes	1, 4
12 noviembre 2014	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	M. Sos	1

Gaviota de Sabine

Xema sabini

Sabine's Gull

Migratorio boreal, nidificando en el extremo norte de Rusia y de América del Norte y en Groenlandia. Migra en alta mar por las costas occidentales de América del Sur y África. Llega regularmente hasta Perú.

Con pocos registros entre las provincias de Arica y Concepción, Marín (2004) la considera una “especie hipotética” por no existir evidencia disponible. Con posterioridad se publica la fotografía de un ejemplar en la desembocadura del río Maipo observado en abril de 1996 (Aguirre & Simeone 2006).



Gaviota de Sabine (*Xema sabini*), 4 de noviembre de 2014, pelágico frente a Arica, provincia de Arica, foto Fernando Díaz.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
2 noviembre 2006	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	R. Heil	1
11 noviembre 2006	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Barros, P. Cáceres, R. González, R. Moraga, R. Reyes, B. Rosende, R. Rosende	1, 2 (La Chiricoca 2007)
21 noviembre 2006	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus	1
23 noviembre 2006	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	R. Reyes	1
16 noviembre 2007	6	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	J. Levene	1

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
8 marzo 2008	1	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	P. Cáceres	1, 2 (Barros & Schmitt 2008c)
26 septiembre 2008	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	R. Barros, F. Díaz, R. Reyes, R. Tapia	1
14 octubre 2008	2	Caleta Teniente, Provincia de Limarí	F. Schmitt, F. Díaz	1
1 noviembre 2008	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	Á. Jaramillo, R. Matus	1
14 diciembre 2008	6	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Reyes, E. Artigau	1, 2 (Barros & Schmitt 2009b)
5 noviembre 2009	2	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Reyes, R. Tapia, C. Vásquez, G. Vásquez	1
12 noviembre 2009	8	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	Á. Jaramillo, R. Matus, M. Bowen	1, 2 (Barros & Schmitt 2010b)
20 noviembre 2009	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus	1
15 diciembre 2009	2	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Barros, F. Díaz, F. Schmitt, R. Silva, P. Valenzuela	1
5 enero 2010	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Barros, P. Cáceres, F. Díaz, F. Schmitt	1
6 noviembre 2010	2	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Barros, F. Schmitt, R. Silva, D. Terán	1
27 noviembre 2010	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Barros, F. Díaz, V. Raimilla	1
30 diciembre 2010	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Barros, F. Schmitt, F. Díaz, R. Silva, D. Terán	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
24 abril 2011	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	P. Cáceres	1
20 octubre 2013	2	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	S. Hull, Á. Jaramillo, R. Matus, W. Mortimer	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
7 noviembre 2013	1	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Matus, P. Burke	1
9 octubre 2014	3	Pelágico frente a Valparaíso, Provincia de Valparaíso	R. Matus	1
4 noviembre 2014	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	F. Díaz	1, 4
5 noviembre 2014	1	Pelágico frente a Quintero, Provincia de Valparaíso	F. Schmitt, P. Bengtson, M. Sos	1

Gaviota de Bonaparte

Chroicocephalus philadelphia

Bonaparte's Gull

Nidifica en Canadá y norte de Estados Unidos, y migra hacia las costas pacíficas y atlánticas de Estados Unidos llegando hasta México.

Los únicos registros para el país se realizan en 2013 y 2014 en la desembocadura del río Elqui, correspondiendo probablemente al mismo ejemplar. Estos avistamientos son las primeras evidencias para esta especie en América del Sur.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 20 febrero y 15 abril 2013	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	P. Valencia, P. Arce, R. Barros, P. Cáceres, M. Daigre, F. Díaz, F. Schmitt, M. Silva, R. Silva	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a, 2014b)
15 noviembre 2013	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	P. Valencia	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)

Gaviota de capucho gris*Chroicocephalus cirrocephalus*

Gray-hooded Gull

Se encuentra en gran parte de África, en la costa pacífica de Ecuador y Perú, y en la costa atlántica en Brasil y al sur hasta el norte de Argentina. En la costa pacífica es común hasta el sur de Perú.

Con registros en la desembocadura del río Lluta, Marín (2004) lo considera una “especie hipotética” por no existir evidencia disponible. Posteriormente se publican imágenes de algunos de ellos (Barros 2015b).



Gaviota de capucho gris (*Chroicocephalus cirrocephalus*), 29 de diciembre de 2014, desembocadura del río Lluta, provincia de Arica, foto Charly Moreno.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
16 octubre 2005	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	B. Knapton	1
noviembre 2005	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo	2 (Schmitt & Barros 2006a)
23 junio 2006	2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Barros, N. Ferriz	1, 2 (Barros & Schmitt 2006)
23 septiembre 2006	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2007a)
5 noviembre 2006	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	B. Knapton	1
20 noviembre 2006	1	Arica, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus	1, 2 (Barros & Schmitt 2007b)
31 octubre 2007	2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	B. Knapton	1
27 marzo 2008	1	Playa de Chinchorro, Arica, Provincia de Arica	H. Cordero	2 (Barros & Schmitt 2008c)
31 julio 2008	3	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo	2 (Barros & Schmitt 2009a)
Entre 6 y 15 septiembre 2008	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	I. Azócar, R. Barros, F. Díaz, R. Peredo, R. Reyes, R. Tapia	1, 2 (Barros & Díaz 2008)
19 marzo y 4 abril 2009	1	Playa Las Machas, Arica, Provincia de Arica	R. Peredo	1, 2 (Barros & Schmitt 2010a)
16 diciembre 2009	2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	F. Schmitt	1
23 septiembre y 9 noviembre 2010	1 y 2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Moraga, R. Peredo	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
3 abril 2011	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	J. Herreros	1
4 abril 2011	1	Puerto de Arica, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
11 abril 2011	1	Desembocadura río San José, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
21 abril 2011	2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	P. Cáceres	1
24 julio 2011	1	Arica, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
19 septiembre 2011	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
5 octubre 2011	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. González	1
4 noviembre 2011	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
10 y 11 noviembre 2011	1	Arica, Provincia de Arica	K. Seymour	1
6 enero 2012	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
4 febrero 2012	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	F. Schmitt	1
14 abril 2012	5	Desembocad. río San José, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
15 abril 2012	1	Arica, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
15 abril 2012	1	Arica, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
18 abril 2012	1	Playa Las Machas, Provincia de Arica	R. Peredo	1
Entre 13 mayo y 2 noviembre 2012	1-2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
Entre 3 enero y 3 mayo 2013	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
8 junio 2013	1	Desembocad. río San José, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
Entre 9 junio y 11 agosto 2013	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
21 agosto 2013	1	Playa Las Machas, Provincia de Arica	R. Tapia	1
21 septiembre y 22 octubre 2013	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	F. Medrano, Ch. Moreno, R. Peredo	1
11 julio 2014	1	Playa Las Machas, Provincia de Arica	R. Peredo	1
18 julio 2014	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo	1
26 septiembre 2014	1	Puerto de Arica, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
2 octubre y 29 diciembre 2014	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1, 4

Gaviota reidora*Leucophaeus atricilla*

Laughing Gull

Nidifica en la costa atlántica desde el norte de Estados Unidos hasta América Central e islas del Caribe, y en la costa

pacífica desde California hasta el oeste de México. Migra hasta América Central, el norte de América del Sur, y del lado pacífico llega regularmente hasta el centro de Perú.

Con pocos registros en las provincias de Arica e Iquique, Marín (2004) la considera una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
9 febrero 2004	1	Pelágico frente a Arica, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, A. Lazere	1
15 septiembre 2008	2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	I. Azócar, R. Barros, F. Díaz, R. Reyes, R. Tapia	1, 2 (Barros & Díaz 2008)
3 enero 2013	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)

Gaviota argétea

Larus argentatus

Herring Gull

Una especie con un rango amplio en el Viejo y Nuevo Mundo. En las Américas nidifica en Canadá y el norte de Estados

Unidos y migra hacia las costas atlánticas y pacíficas de Estados Unidos y América Central.

Los únicos registros para el país se realizan en 2009 y 2013 en Antofagasta, correspondiendo probablemente al mismo ejemplar.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 14 febrero y 3 abril 2009	1	Antofagasta, Provincia de Antofagasta	Ch. Moreno, L. Demetrio, C. Moreno	1, 2 (Barros & Schmitt 2009b, 2010a)
01 abril 2013	1	Rinconada de Antofagasta, Provincia de Antofagasta	O. Gómez	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)

Gaviotín apizarrado

Onychoprion fuscatus

Sooty Tern

Se encuentra en todos los mares tropicales y nidifica en una multitud de islas. En Chile nidifica en las Islas Desventuradas, Isla Salas y Gómez e Isla de Pascua. Después de la reproducción es una especie muy pelágica, acercándose raramente a la costa.

Con muy pocos registros en la costa continental de Chile.



Gaviotín apizarrado (*Onychoprion fuscatus*), 21 de noviembre de 2014, desembocadura del río Elqui, provincia de Elqui, foto Nicolás Mercado.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
21 noviembre 2014	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	N. Mercado, D. Valverde	1, 4

Gaviotín pascuense

Onychoprion lunatus

Grey-backed Tern

Nidifica en islas tropicales del Pacífico occidental, desplazándose en sus alrededores después de la reproducción. Muy rara al este de su rango habitual.

Marín & Cáceres (2010) dan cuenta de solo 3 registros históricos en la Isla de Pascua. El primer registro para la Isla Salas y Gómez se realiza en marzo de 2012.



Gaviotín pascuense (*Onychoprion lunatus*), 26 de noviembre de 2012, Isla Salas y Gómez, provincia de Isla de Pascua, foto Diego Miranda.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
21 marzo 2012	5	Isla Salas y Gómez, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo	1
26 noviembre 2012	6	Isla Salas y Gómez, Provincia de Isla de Pascua	P. Lazo, D. Miranda	4

Gaviotín de pico negro

Gelochelidon nilotica

Gull-billed Tern

Una especie con un rango importante, presente en las Américas, Europa, África y Australasia. En las Américas nidifica en la costa atlántica desde Estados Unidos hasta Brasil y el norte de Argentina, y en la costa pacífica desde Estados Unidos hasta el oeste de México. Migra al sur, llegando regularmente hasta Ecuador y el norte de Perú. El primer registro para el país se realiza en febrero de 2009.



Gaviotín de pico negro (*Gelochelidon nilotica*), 29 de diciembre de 2014, desembocadura del río Lluta, provincia de Arica, foto Charly Moreno.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 20 febrero y 3 abril 2009	1-2	Desembocadura río Lluta y playa Las Machas, Provincia de Arica	I. Azócar, R. Peredo	1, 2 (Barros & Schmitt 2009b, 2010a)
29 diciembre 2014	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1, 4

Gaviotín negro

Chlidonias niger

Black Tern

Rango importante, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. En América, nidifica en humedales interiores de Canadá y Estados Unidos y luego migra hasta las costas de América

Central y del norte de América del Sur (regular hasta el centro de Perú). Especie marina fuera de la época de reproducción.

Marín (2004) da cuenta de un único registro para Chile señalado erróneamente para las “cercanías de Santiago”, correspondiendo la localidad de captura a Valparaíso (Barros 2015b).

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
02 febrero 2009	1	Canal Chacao, Provincia Llanquihue/Chiloé	Á. Jaramillo, R. Matus	1

Gaviotín real

Thalasseus maximus

Royal Tern

En el Atlántico está presente en la costa occidental de África, siguiendo la costa desde Estados Unidos hasta el norte de

Argentina. En el Pacífico nidifica en Baja California y el oeste de México y migra al sur hasta Perú, donde llega comúnmente hasta Pisco.

El único registro para el país se realiza en noviembre de 2004.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
10 noviembre 2004	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	S. Howell, D. Ward, K. Ward	2 (Howell 2007)

Gaviotín de Sandwich

Thalasseus sandvicensis

Sandwich Tern

Una especie costera, con un rango importante en América, Europa, África y Medio Oriente. La subespecie “acuflavidus”

nidifica en la costa este de Estados Unidos y el Caribe, y migra hasta el sur de Perú.

Con registros en Arica, Tongoy, Iquique, Concepción y la desembocadura del río Maipo, Marín (2004) lo incorpora a su lista como una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 23 y 28 enero 2004	1-3	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	Á. Jaramillo	1

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
9 febrero 2005	1	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	J. Aguirre	2 (Aguirre 2006)
11 marzo 2006	6	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2006)
8 y 16 abril 2006	3-2	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	F. Schmitt, R. Barros	1
13 y 27 enero 2007	1-5	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	R. Barros, F. Schmitt, I. Azócar, R. Moraga, B. Rosende	1, 2 (Barros & Schmitt 2007b)
3 febrero 2008	1	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	R. Barros, F. Díaz	1
Entre 2 y 13 marzo 2008	1-3	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	F. Schmitt, A. Mauss, P. Cáceres	1, 2 (Barros & Schmitt 2008c)
14 febrero 2009	3	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	R. Barros, F. Díaz	1
15 marzo 2009	2	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	R. González	1
19 diciembre 2009	1	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	I. Azócar, R. Barros	1
5 diciembre 2010	1	Laguna Cartagena, Provincia de San Antonio	P. Cáceres, N. Muggli	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
Entre 6 y 23 febrero 2011	2	Laguna Cartagena, Provincia de San Antonio	R. Barros, F. Díaz, C. Fuentes, V. Maturana, T. Solís de Ovando, Y. Kayser	1
Entre 6 y 23 febrero 2011	1-4	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	R. Barros, F. Díaz, V. Maturana, Y. Kayser	1
30 abril 2011	2	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	R. Tapia	1
8 y 11 febrero 2012	2	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	I. Azócar, P. Burke, R. Matus	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
26 febrero 2012	8	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	F. Schmitt, L. Frid, K. Holloway	1
Entre 4 marzo y 13 abril 2012	1	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	F. Schmitt, S. Pardo	1
20 diciembre 2012	1	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	F. Schmitt, C. Feger	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)
7 febrero 2013	1	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	D. Reyes, C. Vásquez	1
30 diciembre 2013	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
Entre 8 y 10 febrero 2014	1	Desembocadura estero Tongoy, Provincia de Elqui	C. Piñones, R. Jiménez	1
Entre 8 y 27 febrero 2014	1	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	R. Barros, B. Rosende, S. Pardo	1
29 diciembre 2014	1	Desembocadura estero Tongoy, Provincia de Elqui	M. Torrejón	1

Paloma picazuró*Patagioenas picazuro*

Picazuro Pigeon

*Se encuentra desde Bolivia hasta el noreste de Brasil y por el**sur hasta el centro-sur de Argentina. Movimientos locales son registrados en el sur de Brasil y Paraguay.*

El único registro para el país se realiza en diciembre de 2013.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
4 diciembre 2013	1	Laguna Chaxa, Provincia de El Loa	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)

Paloma manchada (*maculosa*)*Patagioenas maculosa maculosa*Spot-winged Pigeon (*maculosa*)*Esta subespecie se encuentra en baja altura hasta 1000m, desde el extremo sur de Bolivia hasta el sureste de Brasil y el**centro-sur de Argentina. Sin movimientos o migraciones importantes conocidas.*

El único registro conocido para esta subespecie en Chile ocurre en febrero de 2010.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
5 febrero 2010	1	El Escorial, Paine, Provincia de Maipo	E. Villanueva	1, 2 (Barros & Schmitt 2010b)

Tortolita rojiza*Columbina talpacoti*

Ruddy Ground Dove

*Repartición extensa desde México hasta el norte de Argenti-**na. No se conocen migraciones importantes en América del Sur.*

Marín (2004) da cuenta de 2 registros conocidos cerca de Angol y Rancagua, considerándola una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
28 abril 2008	1 muerto	Salar de Pedernales, Provincia de Chañaral	F. Olivares Z., I. Troncoso, A. Cepeda	1, 2 (Barros & Schmitt 2008c)
26 abril 2009	1	Humedal de Campiche, Ventanas, Provincia de Valparaíso	R. Reyes, N. Morales, C. Peña	1, 2 (Barros & Schmitt 2010a)

Cuclillo de pico negro*Coccyzus melacoryphus*

Dark-billed Cuckoo

*Migratorio austral. Se encuentra en gran parte de América del Sur, desde el norte de Colombia hasta el centro de Argen-**tina. Las poblaciones más sureñas migran hacia el norte después de la reproducción.*

Marín (2004) da cuenta de un único registro conocido en la provincia de Arica en 1969, considerándola una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
31 enero 2011	1	Providencia, Provincia de Santiago	J. Galaz, P. Valenzuela	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b, Cáceres 2012)
8 mayo 2011	1 muerto	R.N. Lago Peñuelas, Provincia de Valparaíso	P. Cáceres	1, 2 (Cáceres 2012, Barros & Schmitt 2012a), 3 (MNHCL 5382)

Cuclillo de pico amarillo*Coccyzus americanus*

Yellow-billed Cuckoo

*Migratorio boreal, nidificando desde el sur de Canadá hasta**México, y migrando en América del Sur desde Colombia hasta el norte de Argentina. Aves errantes encontradas en Europa y África del Norte.*

El único registro para el país se realiza en mayo de 2013.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
4 mayo 2013	1 muerto	Valle de Chaca, Provincia de Arica	P. Johow	2 (Torés et al. 2013, Barros & Schmitt 2014b), 3 (MNHCL 5396)

Gallina ciega peruana*Chordeiles acutipennis*

Lesser Nighthawk

*Rango desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Bolivia, generalmente en alturas inferiores a 1200 m. En la costa pa-**cífica se encuentra hasta el sur de Perú.*

Marín (2004) da cuenta de un único espécimen de la provincia de Arica y de otro avistamiento en la provincia de Tocopilla, considerándola una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
12 septiembre 2009	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	M. Flores	2 (Flores 2010, Barros & Schmitt 2010a)
18 marzo 2011	2	Patache, Provincia de Iquique	J.P. Gabella	1

Gallina ciega boreal*Chordeiles minor*

Common Nighthawk

*Migratorio boreal, nidificando desde Canadá hasta Panamá**y migrando en América del Sur desde Colombia hasta el norte de Argentina. Aves errantes encontradas hasta Europa.*

El único registro para el país se realiza en enero de 2008.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
2 enero 2008	1	Iquique, Provincia de Iquique	S. Ostria	2 (Barros & Schmitt 2008b)

Guácharo*Steatornis caripensis*

Oilbird

Nidifica en cuevas desde Panamá hasta el norte de América del Sur, y en los Andes hasta Bolivia. Realiza dispersión post-reproductiva.

El primer registro para el país ocurre en marzo de 2009.

**Guácharo** (*Steatornis caripensis*), marzo de 2009, Antofagasta, provincia de Antofagasta, foto Johanna Hodär.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
marzo 2009	1	Antofagasta, Provincia de Antofagasta	Info. J. Hodär	4
28 junio 2012	1	Iquique, Provincia de Iquique	Info. J.P. Gabella	1, 2 (Barros & Schmitt 2013), 3 (MNHCL 5383)

Vencejo de chimenea*Chaetura pelagica*

Chimney Swift

Nidifica principalmente en el este de Estados Unidos y migra después de la reproducción por el este de Ecuador, en Perú y noroeste de Brasil. Parte de la población inverna en la costa pacífica de Perú.

Marín (2004) lo incorpora a su lista sin hacer comentarios. La primera evidencia para el país corresponde a la captura de 4 ejemplares cerca de Molinos, Valle del Lluta en diciembre de 1971 (Araya et al. 1972). Es una especie regular pero rara en el norte del país.

Vencejo de chimenea (*Chaetura pelagica*), 5 enero de 2007, km. 36, Valle del Lluta, provincia de Arica, foto Juan Aguirre.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
6 enero 2004	1	Valle del Lluta, Provincia de Arica	D. Vander P.	1
18 noviembre 2006	1	Chacalluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus, P. Burke	1, 2 (Barros & Schmitt 2007b)
5 enero 2007	1	Km. 36, Valle del Lluta, Provincia de Arica	J. Aguirre	4
16 noviembre 2009	6	Valle del Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus, M. Bowen	1

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
18 noviembre 2010	1	Tranque Sobraya, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus	1
17 diciembre 2010	1	Parque del Loa, Provincia de Tocopilla	R. Barros	1
17 diciembre 2010	9	Ayllu de Catarpe, Provincia de El Loa	R. Tapia	1
18 noviembre 2011	2	Valle de Chaca, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus	1 (Barros & Schmitt 2011b)
22 noviembre 2012	1	Salinas Chicas, Tongoy, Provincia de Elqui	F. Schmitt	1
24 noviembre 2012	1	Guatacondo, Provincia El Tamarugal	D. Martínez	1
15 enero 2013	1	Poconchile, Provincia de Arica	H. Norambuena	1
12 noviembre 2014	1	Poconchile, Provincia de Arica	P. Burke, J. Collins, R. Matus, L. Nutall, R. Siebert	1

Picaflor de pico rojo

Chlorostilbon lucidus

Glittering-bellied Emerald

Rango desde el este de Brasil hasta el noreste de Argentina.

Aparentemente sedentario.

En primer registro para el país se realiza en diciembre de 2011, observación que se repite en el mismo sitio 2 años después, correspondiendo probablemente al mismo ejemplar.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
27 diciembre 2011	1	Cerro Los Piques, Las Condes, Provincia de Santiago	B. Rosende, R. Rosende	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
Entre 30 diciembre 2013 y 1 enero 2014	1	Cerro Los Piques, Las Condes, Provincia de Santiago	B. Rosende, R. Rosende, C. Pinto, R. Barros, V. Maturana, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)

Halcón de pecho naranja

Falco deiroleucus

Orange-breasted Falcon

Rango desde el sur de México hasta el norte de Argentina.

Una especie rara y sedentaria, cuya llegada a Chile es muy sorprendente.

El único registro para el país se realiza en julio-octubre 2007.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 4 julio y mediados de octubre 2007	1	Calama, Provincia de El Loa	L. Demetrio	2 (Demetrio 2008, Barros & Schmitt 2008a)

Pibí occidental / oriental

Contopus sordidulus / virens

Western / Eastern Wood-Pewee

C. sordidulus es un migrante boreal que nidifica desde Alaska hasta América Central, migrando hacia América del Sur principalmente en el lado este de los Andes, desde Colombia hasta Bolivia. Por otro lado, *C. virens* también es un migrante boreal que nidifica al este de Estados Unidos y sureste de Canadá, migrando hacia Sudamérica principalmente desde Colombia y sur de Venezuela, hasta el centro de Bolivia. La identificación de estos cazamoscas en el terreno es extremada-

mente difícil y casi imposible sin una grabación o una excelente descripción de sus vocalizaciones.

Los primeros registros para este género en Chile son en noviembre y diciembre de 2007, correspondiendo el segundo de ellos muy probablemente a la especie *C. sordidulus*. Sin embargo, y a pesar de existir buenas fotografías de estos avistamientos y de un tercero más, con la información disponible no es posible identificarlos a nivel de especie, por lo que se propone señalarlos como *C. sordidulus / virens* en la Lista de las Aves de Chile.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
noviembre 2007	1	Río Loa, sector María Elena, Provincia Tocopilla	C. González B., R. Olivares, A. Ugarte	2 (Barros & Schmitt 2008b)
12 diciembre 2007	1	Valle de Chaca, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus	1, 2 (Barros & Schmitt 2008b)
14 diciembre 2013	1	Desembocadura río San José, Arica, Provincia Arica	Ch. Moreno	2 (Barros & Schmitt 2015)

Cazamoscas de pico chato [*fasciatus group*]

Myophobus fasciatus auriceps/flammiceps

Bran-colored Flycatcher [*grupo fasciatus*]

Varias subespecies se extienden desde Costa Rica hasta el norte de Argentina. La subespecie “*rufescens*” residente de la costa pacífica de Perú y del extremo norte de Chile se considera a veces como una especie aparte. Las poblaciones más sureas son migratorias.

El primer registro de esta subespecie (*auriceps/flammiceps*) en el país se realiza en noviembre 2008.



Cazamoscas de pico chato (*Myophobus fasciatus auriceps/flammiceps*), 5 de marzo de 2014, embalse del Yeso, provincia Cordillera, foto Sebastián Pardo.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
20 noviembre 2008	1	Valle del río Yeso, Provincia Cordillera	R. Donoso, R. Coombs	1, 2 (Barros & Schmitt 2009b)
Entre 5 y 6 marzo 2014	1	Embalse del Yeso, Provincia Cordillera	S. Pardo, B. Rosende	1, 4

Saca-tu-real (*rubinus*)

Pyrocephalus rubinus rubinus

Vermilion Flycatcher (*rubinus*)

Varias subespecies extendiéndose desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. La población presente en el extremo norte de Chile pertenece a la subespecie residente “*cocachacrae*”, presente en la costa pacífica hasta el noroeste

de Perú. La subespecie nominal se encuentra desde Bolivia hasta el sureste de Brasil y el norte de Argentina, y parte de esa población migra hacia el norte después de la reproducción.

La primera evidencia para esta subespecie nominal migratoria en el país se obtiene en marzo de 2010.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
2 marzo 2010	1	Chacayes, río Cachapoal Provincia de Cachapoal	C. Pernollet, G. Méndez, T. Valle, E. Pavez	1, 2 (Barros & Schmitt 2011a)
17 enero 2012	1	Valle termas del Plomo, Provincia Cordillera	F. Schmitt, A. Minoletti, N. Torés	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)

Monjita coronada

Xolmis coronatus

Black-crowned Monjita

Nidifica en el centro de Argentina y migra hacia el norte hasta el centro de Bolivia, Paraguay y el sureste de Brasil.

El único registro para el país se realiza en diciembre 2014.



Monjita coronada (*Xolmis coronatus*), 1 de diciembre de 2014, sector tongoy, península de Rilán, Chiloé, provincia de Chiloé, foto Carlos García.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
1 diciembre 2014	1	Sector Tongoy, península de Rilán, Chiloé, Provincia de Chiloé	C. García	4

Monjita castaña

Xolmis rubetra

Rusty-backed Monjita

Especie endémica de Argentina, nidificando desde el sur de

Mendoza hasta Chubut, y migrando hacia el norte de Argentina.

El único registro para el país se realiza en octubre de 2013.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 19 y 20 octubre 2013	1	Desembocadura río Maipo, Provincia de San Antonio	Á. Jaramillo, R. Matus, I. Azócar, R. Barros, S. Hull, R. Lewis, W. Mortimer, C. Pinto	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)

Birro gris

Polioxolmis rufipennis

Rufous-webbed Bush-Tyrant

Una especie residente de los Andes, desde el norte de Perú hasta Bolivia y noroeste de Argentina. Probablemente un nidificante muy local y raro en Chile.

Marín (2004) lo incorpora a su lista sin hacer comentarios, a pesar de que los únicos registros conocidos en esa fecha son los de Knapton (2002) en 1998, en las provincias de Parinacota e Iquique.



Birro gris (*Polioxolmis rufipennis*), 3 de Julio 2007, Belén, provincia de Parinacota, foto Raphaël Jordan.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
9 octubre 2006	1	Belén, Provincia de Parinacota	F. Schmitt	1
3 julio 2007	1	Belén, Provincia de Parinacota	R. Jordan	4
24 marzo 2008	1	Belén, Provincia de Parinacota	B. Knapton	1

Cazamoscas de cola corta

Muscigralla brevicauda

Short-tailed Field Tyrant

Una especie residente de la costa pacífica, desde el suroeste de Ecuador hasta el sur de Perú.

Con solo 3 registros en la provincia de Arica, Marín (2004) la señala en su lista como una “especie rara”.



Cazamoscas de cola corta (*Muscigralla brevicauda*), 23 de octubre de 2009, Valle de Azapa, provincia de Arica, foto Ana María Venegas.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
23 octubre 2009	2	Valle de Azapa, Provincia de Arica	J. Aguirre, C. Estades, P. González, V. López, A.M Venegas, M.A. Vukasovic	4

Benteveo*Pitangus sulphuratus*

Great Kiskadee

Rango desde el extremo sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina. Movimientos pocos conocidos, aunque parte de la población que nidifica en Argentina migra hacia el norte.

Con registros en las provincias de Iquique, El Loa, San Antonio, Talagante y Ñuble, Marín (2004) lo incorpora a su lista como una “especie rara”.

Benteveo (*Pitangus sulphuratus*), 17 de mayo de 2014, desembocadura del río Elqui, provincia de Elqui, foto Rubén Barraza.



Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 4 y 14 junio 2009	1	Quilicura, Provincia de Santiago	S. Fletcher, C. Sarmiento, F. Schmitt, R. Barros, F. Izquierdo, A. Salce	1, 2 (Barros & Schmitt 2010a)
Entre 29 octubre y 6 noviembre 2011	2 y 1	Duao, Provincia de Talca	E. Velásquez, R. Velásquez	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
Entre 2 y 6 enero 2012	1	Zapallar, Provincia de Petorca	T. McKay	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
29 enero y 6 febrero 2012	1	Las Cuevas, P.N. Lauca, Provincia de Parinacota	C. Vidal, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
11 mayo al 15 septiembre 2014	1	Desembocadura río Elqui, Provincia de Elqui	J. Sarratosa, R. Barraza, N. Mercado, F. Olivares, M. Rojas, L. Ugarte, D. Valverde	1, 4

Benteveo de vientre azufre*Myiodynastes luteiventris*

Sulphur-bellied Flycatcher

Migratorio boreal que nidifica principalmente desde México

hasta Costa Rica, y migrando a América del Sur por el lado este de los Andes desde el este de Ecuador hasta Bolivia.

En único registro para el país se realiza en noviembre 2009.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
19 noviembre 2009	1	Tranque Sobraya, Provincia de Arica	R. Matus, Á. Jaramillo, M. Bowen	1, 2 (Jaramillo & Matus 2010, Barros & Schmitt 2010b)

Suirirí real*Tyrannus melancholicus*

Tropical Kingbird

Rango desde el extremo suroeste de Estados Unidos hasta el centro de Argentina. La población que nidifica en Argentina migra al norte durante el invierno austral.

Marín (2004) da cuenta de 2 avistamientos para el país

en las provincias de Iquique y Santiago, pero al no haber evidencia conocida lo considera como una “especie hipotética”. Con posterioridad se publica la fotografía del registro de 1993 en la provincia de Iquique y de un tercer registro en la provincia de El Loa en marzo de 2002 (Barros 2010).

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
26 diciembre 2011	1	Baquedano, Provincia de Antofagasta	F. Díaz, E. Riveros	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
21 enero 2012	2	Valle de Azapa, Provincia de Arica	N. Senner, H. Batcheller, A. Johnson	1
17 febrero 2012	1	Vega San Jorge, Provincia Magallanes	R. Matus	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
21 enero 2013	1	Totoral, Provincia de Copiapó	F. Díaz	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre 04 y 17 febrero 2013	2	Tranque La Laguna, Lo Barnechea, Provincia de Santiago	F. Neder, R. Barros, P. Cáceres, F. Díaz, M. Herrera, A. Minoletti, E. Navarro, H. Norambuena, L. Ortiz, C. Pinto, C. Poblete, E. Sandvig, F. Schmitt, M. Silva, R. Silva, T. Valle	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)

Suirirí boreal

Tyrannus tyrannus

Eastern Kingbird

Migratorio boreal, nidificando en Canadá y Estados Unidos, y migrando hacia América del Sur hasta el norte de Argentina.

Con registros en las provincias de Arica, Tocopilla, El Loa y San Antonio, Marín (2004) lo suma a su lista como una “especie rara”.



Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*), 17 de noviembre de 2012, Totoral, provincia de Copiapó, foto Philippe Dandois.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
5 febrero 2009	1	Bahía Inglesa, Provincia de Copiapó	J. Jerez	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a)
4 mayo 2010	1	Parque del Loa, María Elena, Provincia de Tocopilla	R. Barros, F. Díaz, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2011a)
28 octubre 2010	1	Moquella, Provincia de El Tamarugal	P. González, V. López	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
17 noviembre 2012	1	Totoral, Provincia de Copiapó	P. Dandois	4

Cazamoscas tijereta

Tyrannus savana

Fork-tailed Flycatcher

Varias subespecies extendiéndose desde América Central hasta el centro de Argentina. La población que nidifica en el sur de su rango es migratoria.

Considerado como una “especie hipotética” por Marín (2004), por no existir evidencia conocida. Con posterioridad se publica la fotografía de un ejemplar en san Pedro de Atacama, en marzo de 2002 (Barros 2010).



Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*), 22 de noviembre de 2014, Av. Rendic, Antofagasta, provincia de Antofagasta, foto Charly Moreno.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
19 noviembre 2006	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	P. Burke	1
30 diciembre 2006	1	Laguna Matanza, Provincia de San Antonio	F. Magnasco	1

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
26 febrero 2007	1	Totoral, Provincia de Copiapó	J. L. Brito	2 (Barros & Schmitt 2007b)
3 octubre 2007	1	Quillagua, Provincia de Tocopilla	P. Contreras, C. González	2 (Barros & Schmitt 2008a)
2 diciembre 2007	1	Carrizal Bajo, Provincia de Huasco	F. Olivares Z., G. Jara, A. Gahona	2 (Barros & Schmitt 2008b)
26 y 29 marzo 2008	2 – 1	Poconchile, Provincia de Arica	H. Cordero, R. Demangel	1, 2 (Barros & Schmitt 2008c)
Diciembre 2009	1	R. N. El Yali, Provincia de San Antonio	S. Brookman J. Sherwood	2 (Barros & Schmitt 2010b)
23 enero 2011	1	Laguna El Peral, Provincia de Valparaíso	A. Cabrera	1
26 octubre 2011	1	Arica, Provincia de Arica	A. M. Venegas	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
Entre 16 y 20 marzo 2012	1	Viña del Mar, Provincia de Valparaíso	P. Lisboa, P. Cáceres, F. Díaz, F. Magnasco, N. Muggli, R. Reyes, R. Tapia, J. Tassara, C. Yáñez	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
11 abril 2012	1	Playa Los Reyes, Provincia de Concepción	P. Ortiz, C. Yáñez	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
22 noviembre 2014	1	Av. Rendic, Antofagasta Provincia de Antofagasta	Ch. Moreno	1, 4
21 diciembre 2014	1	El Toyo, Provincia Cordillera	C. Pinto	1

Golondrina de cabeza rojiza

Alopochelidon fucata

Tawny-headed Swallow

Rango principal desde Bolivia hasta el sur de Brasil y norte

de Argentina. Las poblaciones que nidifican en el sur del rango son migratorias.

El único registro para el país se realiza en marzo de 2006.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
19 marzo 2006	1	Desembocadura río Huasco, Provincia de Huasco	F. Schmitt, R. Barros, A. Cánepa, J.M. Hernández, R. González	1, 2 (Barros & Schmitt 2006; Schmitt & Barros 2006b; Schmitt & Cánepa 2007)

Golondrina sp. (posible Golondrina doméstica)

Progne sp. (posible *Progne chalybea*)

Martin sp. (Gray-breasted Martin possible)

P. chalybea se distribuye desde México hasta el norte de Argentina. La subespecie "macrorhamphus" nidifica desde Bolivia hasta el este de Brasil y el norte de Argentina, migrando hacia el norte de América del Sur durante el invierno austral. Sin embargo, el género *Progne* presenta dificultades de identificación para varias especies migrantes en Sudamérica y que podrían llegar ocasionalmente a Chile, siendo pobremente conocida la distribución invernal de varias especies migratorias boreales.

En octubre de 2010 y octubre de 2011 son fotografiados ejemplares de *Progne* sp., siendo altamente probable que correspondan a *P. chalybea*. Pero a pesar de existir fotografías, no se ha podido descartar de manera concluyente que se trate de otra especie del mismo género (podrían corresponder a hembras de *P. subis*, *P. cryptoleuca*, *P. sinaloae* o *P. dominicensis*, descartando se trate de *P. tapera*, *P. modesta*, *P. murphyi* o *P. elegans*).

Correspondiendo a una nueva especie para Chile, se propone sumarla a la Lista de las Aves de Chile como *Progne* sp. (posible *P. chalybea*).

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
30 octubre 2010	1	La Barra, Toltén, Provincia de Cautín	R. Barros, H. Norambuena, V. Raimilla	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b)
18 octubre 2011	1	Hacienda María Isabel, río Copiapó, Provincia de Copiapó	F. Díaz, A. Muñoz, O. Robayo, E. Riveros	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)

Golondrina negra*Progne elegans*

Southern Martin

*Migratorio austral, nidifica desde Bolivia a Chubut en Argentina, y migrando al norte y oeste de la cuenca amazónica. Marín (2004) la comenta como subespecie *P. modesta elegans*, señalando que no encontró evidencia, salvo un espécimen etiquetado como “Chili”, que es probable provenga originalmente de Mendoza, Argentina. La primera evidencia para el país se obtiene en noviembre de 2006.*



Golondrina negra (*Progne elegans*), 7 de noviembre de 2014, Chaihuín, provincia de Valdivia, foto Heraldo Norambuena.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
1 noviembre 2006	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	B. Knapton, R. Nagtegaal	2 (Peredo et al. 2007)
7 noviembre 2014	1	Chaihuín, Provincia de Valdivia	H. Norambuena	1, 4

Golondrina peruana*Progne murphyi*

Peruvian Martin

Especie residente de la costa pacífica de Perú y del extremo norte de Chile. Especie muy poca conocida; solo se conocen unos pocos sitios de reproducción en Perú. No hay informa-

ción sobre movimientos, y no se sabe si los ejemplares observados en Chile son nidificantes locales o migratorios.

Con pocos registros en las provincias de Arica, Iquique y Antofagasta, Marín (2004) incorpora a la subespecie *P. modesta murphyi* dentro de una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
12 febrero 2004	4	Valle del Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo	1
13 septiembre 2008	1	Estación Rosario, Valle del Lluta, Provincia de Arica	I. Azócar, R. Barros, F. Díaz, R. Reyes, R. Tapia	1
19 septiembre 2010	1	Valle del Lluta, Provincia de Arica	R. Moraga	2 (Barros & Schmitt 2011b)
3 enero 2011	3	Arica, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1
18 agosto 2013	1	Molinos, Valle del Lluta Provincia de Arica	R. Tapia	1
13 noviembre 2013	3	Molinos, Valle del Lluta Provincia de Arica	F. Schmitt	1
16 noviembre 2013	4	desembocadura río Lluta Provincia de Arica	R. Barros, D. Davis, F. Medrano, E. Sandvig	1
22 agosto 2014	4	Valle del Lluta, Provincia de Arica	R. González	1

Zorzalito de Swainson*Catharus ustulatus*

Swainson's Thrush

Migratorio boreal nidificando en Canadá y Estados Unidos y migrando hacia América Central y del Sur principalmente por el lado este de los Andes.

El primer registro para el país se realiza en diciembre de 2009.

Zorzalito de Swainson (*Catharus ustulatus*), 20 de noviembre de 2014, río Putana, provincia de El Loa, foto Rodrigo Tapia.



Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
15 diciembre 2009	1	Putre, Provincia de Parinacota	R. Drijvers	2 (Barros & Schmitt 2010b)
20 noviembre 2014	1	Vados del río Putana, Provincia de El Loa	R. Tapia	1, 4

Zorzal chalchalero

Turdus amaurochalinus

Creamy-bellied Thrush

Nidifica desde Bolivia hasta el sur de Brasil y el centro de Argentina. Las poblaciones más sureñas migran hacia el nor-

te.

Marín (2004) da cuenta del único registro documentado para el país, correspondiendo a un ejemplar capturado en la provincia de Huasco en 1962, considerándola una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
15 noviembre 2004	1	Chungará, P.N. Lauca, Provincia de Parinacota	Á. Jaramillo	1
20 noviembre 2006	1	Putre, Provincia de Parinacota	Á. Jaramillo, R. Matus	1
20 diciembre 2009	1	Codpa, Provincia de Arica	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2010b)

Tenca de alas blancas

Mimus triurus

White-banded Mockingbird

Migratorio austral nidificando desde Bolivia hasta el este de Argentina y migrando hasta el norte de Bolivia y sureste de Brasil.

Con registros en las provincias de Huasco, San Antonio, Santiago y Valdivia, Marín (2004) la considera una “especie rara”.

Tenca de alas blancas (*Mimus triurus*), 20 de abril de 2013, La Guardia, provincia de Copiapó, foto Philippe Dandois.



Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
7 agosto 2005	1	San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa	R. Barros	1
17 y 18 abril 2006	1	Caleta Gonzalo, Parque Pumalín, Provincia de Palena	N. Gálvez, B. González	2 (Gálvez & González 2006)
31 octubre 2008	2	Estero Huaquén, Pichicuy, Provincia de Petorca	R. Jara, U. Nancuante	1, 2 (Barros & Schmitt 2009a)
08 febrero 2009	1	Santa María del Mar, Santo Domingo, Provincia de San Antonio	J. Aldunate	2 (Barros & Schmitt 2010a)
Entre 12 y 20 marzo 2009	1	Las Cruces, Provincia de San Antonio	A. Jullian, R. Barros, F. Díaz, F. Schmitt	1
11 abril 2009	1	Tranque Santa Julia, Mantagua, Provincia de Valparaíso	R. Rojas	1
27 abril 2009	1	Carrizalillo, Provincia de Huasco	F. Schmitt	1
1 mayo 2009	1	Punta Choros, Provincia de Elqui	V. Sabaj	1, 2 (Barros & Schmitt 2010a)
Entre 26 junio y 1 julio 2009	1	Laguna Cartagena, Provincia de San Antonio	A. M. Venegas, R. Demangel, R. Barros, F. Díaz, A. Salce, R. Reyes, R. Tapia, P. Cáceres	1
29 junio 2009	1	Chincolco, Provincia de Petorca	J. P. Gabella	1

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
25 marzo 2010	1	Camar, Peine, Provincia de El Loa	C. de la Rivera	1, 2 (Barros & Schmitt 2011a)
Entre 6 junio y 17 julio 2010	1	La Platina, La Pintana, Provincia de Santiago	E. Villanueva	1
Entre 27 y 31 mayo 2011	1	Rocas de Santo Domingo, Provincia de San Antonio	D. Reyes	1, 2 (Barros & Schmitt 2012a)
14 agosto y 25 septiembre 2011	1	Desembocadura estero San Sebastián, Provincia de San Antonio	I. Azócar, C. Pinto	1, 2 (Barros & Schmitt 2012a, 2012b, Azócar & Pinto 2014)
15 diciembre 2011	1	Embalse La Dehesa, Provincia de Santiago	B. Rosende, R. Rosende	1, 2 (Barros & Schmitt 2012b)
27 mayo 2012	1	Juntas del Toro, Provincia de Elqui	P. Valencia	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
31 mayo 2012	1	Salar de Tara, Provincia de El Loa	R. Tapia	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
9 junio 2012	1	Arica, Provincia de Arica	Ch. Moreno	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)
15 abril 2013	2	Cordillera de Copiapó, Provincia de Copiapó	A. Vielma	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
20 abril 2013	2	La Guardia, Provincia de Copiapó	P. Dandois	4
27 abril y 26 mayo 2013	1	La Suiza, Provincia de Talca	D. Reyes, C. Yáñez	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
4 mayo 2013	1	Caldera, Provincia de Copiapó	R. Tapia	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
15 junio 2013	1	Huentelauquén, Provincia de Choapa	C. Piñones	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b)
6 julio 2013	1	Vivero municipal Antofagasta, Provincia de Antofagasta	J.M. Contreras	1
Entre 4 agosto y 6 octubre 2013	1	Parque Juan López, Antofagasta, Provincia de Antofagasta	O. Gómez, Ch. Moreno, A. Silva	1, 2 (Barros & Schmitt 2014b, 2015)
Entre 18 y 21 septiembre 2013	1	Algarrobo, Provincia de San Antonio	R. Barros, V. Maturana, C. Moya	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
Entre 22 sep- tiembre y 21 octubre 2013	1	San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa	F. de Groote	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
7 octubre 2013	1	Punta Choros, Provincia de Elqui	D. Reyes	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
22 diciembre 2013	1	Termas de Colina, Provincia Cordillera	E. Navarro	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
14 enero 2014	1	La Reina, Santiago, Provincia de Santiago	R. González	1
23 enero 2014	1	Canela (Ruta 5), Provincia del Choapa	D. Martínez	1, 2 (Barros & Schmitt 2015)
2 julio 2014	1	San Esteban, Los Andes, Provincia de Los Andes	G. Santibáñez	1
Entre 10 agosto y 6 septiembre 2014	1	Sector Hotel Antofagasta, Provincia de Antofagasta	Ch. Moreno, A. Silva	1
17 septiembre 2014	1	Carrizal Bajo, Provincia de Huasco	R. Barros, V. Maturana	1
9 noviembre 2014	1	M. N. El Morado, Provincia Cordillera	E. Costoya	1

Tenca de cola larga

Mimus longicaudatus

Long-tailed Mockingbird

Residente de la costa pacífica entre Ecuador y Perú, hasta Arequipa por el sur. Especie que se mantiene como aves de jaula en el norte del Perú.

El único registro para el país se realiza en agosto de 2011. Aunque es posible que este ejemplar haya llegado de forma natural, no es descartable que tenga su origen como ave de jaula, por lo que se propone considerarla como una especie hipotética para el país.



Tenca de cola larga (*Mimus longicaudatus*), 13 de agosto de 2011, km 4 del Valle de Azapa, Provincia de Arica y Parinacota, foto Jorge Fuentes.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
13 agosto 2011	1	Km 4, valle de Azapa, Provincia de Arica y Parinacota	J. Fuentes	4

Bailarín chico peruano

Anthus lutescens peruvianus

Yellowish Pipit

La subespecie "peruvianus" es residente de la costa Pacífica de Perú y del extremo Norte de Chile.

Históricamente conocido solo para la planicie costera al norte de Arica, siendo su número fluctuante según la vegetación disponible (Jaramillo 2003).

Bailarín chico peruano (*Anthus lutescens peruvianus*), 28 de abril de 2006, desembocadura del río Lluta, provincia de Arica, foto Ronny Peredo.



Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
28 abril 2006	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo	4
25 septiembre 2008	2	Desembocadura río Camarones, Provincia de Arica	I. Azócar, R. Barros, F. Díaz, R. Reyes, R. Tapia	1, 2 (Barros & Díaz 2008)
8 marzo 2011	1	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Y. Kayser	1
15 enero 2012	2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	M. Parker	1
Entre 25 octubre y 13 diciembre 2013	1 y 2	Desembocadura río Lluta, Provincia de Arica	Á. Jaramillo, R. Matus, G. Alfsen, R. Barros, F. de Groote, F. Medrano, E. Sandvig, R. Tapia	1

Reinita acuática

Parkesia noveboracensis

Northern Waterthrush

Migratorio boreal, nidificando en Canadá y Estados Unidos

y migrando en América Central y norte de América del Sur, llegando raramente hasta el norte de Perú. Aves errantes observadas hasta Europa.

El único registro para el país se realiza en julio de 2005.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
22 julio 2005	1	Toconao, Provincia de El Loa	J.P. de la Harpe, P. Moroz, J.A. Moroz, D. Moroz, C. Moroz, G. Saintard	2 (Barros 2010)

Candelita americana*Setophaga ruticilla*

American Redstart

Migratorio boreal, nidificando en Canadá y Estados Unidos y migrando en América Central y norte de América del Sur, llegando hasta Ecuador y ocasionalmente hasta el centro de

Perú. Aves errantes observadas hasta Europa.

Con registros en el valle de Azapa y valle del Lluta, provincia de Arica, y en Putre, provincia de Parinacota, por no existir evidencias Marín (2004) la considera una “especie hipotética”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
9 octubre 2006	1	Putre, Provincia de Parinacota	F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2007a)
20 noviembre 2006	1	Putre, Provincia de Parinacota	Á. Jaramillo, R. Matus	1, 2 (Barros & Schmitt 2007b)
21 enero 2011	1	Pica, Provincia de El Tamarugal	Info. V. Malinarich, P. Rossi (SAG)	2 (Barros & Schmitt 2014a)

Reinita de garganta naranja*Setophaga fusca*

Blackburnian Warbler

Migratorio boreal, nidificando en Canadá y Estados Unidos

y migrando hacia el norte de América del Sur y por el lado este de los Andes hasta el centro de Bolivia.

El único registro para el país se realiza en junio de 2012.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
6 junio 2012	1	Sector Chug Chug, Provincia de El Loa	J. C. Castillo (Info. J.P. Gabella)	1, 2 (Barros & Schmitt 2013)

Reinita de dorso verde*Setophaga virens*

Black-throated Green Warbler

Migratorio boreal, nidificando en Canadá y Estados Unidos, y migrando hacia las islas del Caribe, América Central y el extremo norte de América del Sur.

El único registro para el país se realiza en noviembre de 2014.



Reinita de dorso verde (*Setophaga virens*), 6 de noviembre de 2014, Putre, provincia de Antofagasta, foto Fernando Díaz.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
6 noviembre 2014	1	Putre, Provincia de Parinacota	F. Díaz	1, 4

Reinita de Canadá*Cardellina canadensis*

Canada Warbler

Migratorio boreal, nidificando en Canadá y Estados Unidos

y migrando principalmente hacia el noroeste de Sudamérica y por el lado este de los Andes hasta el centro de Perú.

El único registro para el país se realiza en mayo de 2008.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
21 mayo 2008	1	Molinos, valle del río Lluta, Provincia de Arica	R. Peredo, J. Polanco	1, 2 (Barros & Schmitt 2008c)

Chirihue puneño*Sicalis lutea*

Puna Yellow-Finch

Residente en los Andes entre 3800 y 4500 m de altura, desde el sureste de Perú hasta el noreste de Argentina.

Los primeros registros para esta especie en el país se reali-

zan en 1996 cerca de Humalpaca, provincia de Parinacota (Barros 2015b). Los pocos registros se pueden explicar por la baja presencia de observadores de aves en la cordillera del norte del país, sin embargo es muy probable que esta especie nidifique en Chile.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
9 marzo 2008	1	General Lagos, Provincia de Parinacota	B. Knapton	1
Entre 20 y 21 septiembre 2008	+200	Río Seco, norte Visviri, Provincia de Parinacota	I. Azócar, R. Barros, F. Díaz, R. Reyes, R. Tapia	1, 2 (Barros & Díaz 2008)
21 septiembre 2008	4	Visviri, Provincia de Parinacota	I. Azócar, R. Barros, F. Díaz, R. Reyes, R. Tapia	1
7 mayo 2010	5	Bofedal Sitani, Isluga, Provincia de El Tamarugal	R. Barros, F. Díaz, F. Schmitt	1, 2 (Barros & Schmitt 2011a)
11 enero 2014	3	Visviri, Provincia de Parinacota	F. Díaz	1

Corbatita overo*Sporophila lineola*

Lined Seedeater

*Migratorio austral, con una población reproductora al este de Brasil y otra en el norte de Argentina, Paraguay, Bolivia y**sur de Brasil. Ambas poblaciones migran al norte durante el invierno austral.*

El único registro para el país se realiza en diciembre de 2011.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
27 y 30 diciembre 2011	1	Río Putana (4250 msnm), Provincia de El Loa	G. González, D. Robichaud, M. Robichaud	2 (González 2013)

Corbatita de doble collar*Sporophila caerulescens*

Double-collared Seedeater

*Migratorio austral, nidificando desde Bolivia hasta el este de**Brasil y el centro de Argentina. Las poblaciones más sureñas migran al norte durante el invierno austral.*

El único registro para el país se realiza en abril de 2013.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
22 abril 2013	1	Mantagua, Provincia de Valparaíso	W. Baliero	2 (Barros & Schmitt 2014b)

Piranga*Piranga rubra*

Summer Tanager

*Migratorio boreal nidificando en el sur de Estados Unidos y norte de México, y migrando hacia América Central y del**Sur hasta el norte de Bolivia.*

Con un solo registro conocido para el país en Estación La Negra, provincia de Antofagasta, en 1967, Marín (2004) la incorpora a su lista como una "especie rara".

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
29 octubre 2006	1	Valle del río Lluta, Provincia de Arica	R. Nagtegaal	2 (Barros & Schmitt 2007a)

Loica argentina*Sturnella superciliaris*

White-browed Meadowlark

*Rango desde el sureste de Perú hasta el este de Brasil y el norte de Argentina. Movimientos locales pueden seguir inviernos**particularmente secos o fríos.*

Con un único registro para el país en la cordillera de la provincia de Elqui en 1938, Marín (2004) la incorpora a su lista como una “especie rara”.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
19 abril 2013	1	Salar de Atacama, Provincia de El Loa	M.L. Lemus, A. Muñoz, J.C. Torres-Mura	2 (Lemus et al. 2014)

Mirlo de pico corto*Molothrus rufoaxillaris*

Screaming Cowbird

Rango desde el sureste de Bolivia hasta el centro de Brasil y el centro de Argentina. Sedentario. Pero en los últimos años amplió su rango hacia el noreste de Brasil.

“Especie erróneamente citada” para Marín (2004), a partir de un ejemplar mal identificado de Arica, en septiembre de 1986 (Barros 2015a). Desde el 2010 se reporta una serie de registros, confirmando la presencia de esta especie entre las provincias de Maipo y Colchagua.

Fecha	Cantidad	Localidad	Observador	Antecedentes
Entre el 26 diciembre 2010 y 20 febrero 2011	2	Fundo Santa Teresa, Chimbarongo, Provincia de Colchagua	J.J. Donoso	1, 2 (Barros & Schmitt 2011b, Barros 2015a)
16 febrero 2013	1	Agua Buena, Provincia de Colchagua	F. Lira	1, 2 (Barros & Schmitt 2014a, Barros 2015a)
31 octubre 2013	4	Agua Buena, Provincia de Colchagua	R. Barros, V. Maturana	1, 2 (Barros 2015, Barros & Schmitt 2015a)
1 noviembre 2013	2	El Carrizal, Provincia de Colchagua	R. Barros, V. Maturana	1, 2 (Barros 2015a)
1 noviembre 2013	2	Chimbarongo, Provincia de Colchagua	R. Barros, V. Maturana	1, 2 (Barros 2015a)
25 noviembre 2013	1	oriente de San Fernando, Provincia de Colchagua	L. Miranda, F. Schmitt	1
23 enero 2014	2	Agua Buena (poniente), Provincia de Colchagua	F. Díaz	1, 2 (Barros 2015a)
2 febrero 2014	1	Buin, Provincia de Maipo	M. Orsola	1, 2 (Barros 2015a)
19 septiembre 2014	1	Agua Buena, Provincia de Colchagua	Pablo Cáceres	1
19 septiembre 2014	3	Puente Negro, Provincia de Colchagua	Pablo Cáceres	1
4 diciembre 2014	1	Buin, Provincia de Maipo	M. Orsola, P. Pérez	1, 2 (Barros 2015a)
25 diciembre 2014	1	Agua Buena, Provincia de Colchagua	F. Lira	1

Agradecimientos

Agradecemos el trabajo voluntario del Comité de Validación de los registros en eBird-Chile, lo que permite mantener un alto nivel de los datos subidos en esta plataforma. Durante la temporada considerada, el grupo de validación eBird-Chile funcionó gracias a la participación de Paulina Arce, Rodrigo Barros, Pablo Cáceres, Fernando

Díaz, Felipe de Groot, Álvaro Jaramillo, Daniel Martínez, Ricardo Matus, Fernando Medrano, Charly Moreno, Heraldo Norambuena, Ronny Peredo, Victor Raimilla, Manuel Rojas, Fabrice Schmitt, Rodrigo Silva y Carolina Yáñez.

Agradecemos a Juan Aguirre, Rubén Barraza, Steve Bird,

Pablo Cáceres, Víctor Castelleto, Nelson Contardo, Stephen Copsey, Enrique Couve, Philippe Dandois, Fernando Díaz, Jorge Fuentes, Carlos García, Ana Hinojosa, Johanna Hödar, Álvaro Jaramillo, Raphaël Jordan, Nicolás Mercado, Diego Miranda, Charly Moreno, Heraldo Norambuena, Carlos Olavarría, Marcelo Olivares, Sebastián Pardo, Mark Pearman, Ronny Peredo, Jordi Plana, Rodrigo Reyes, Manuel Rojas, Milenka Sánchez, Rodrigo Tapia, Ana María Venegas, Claudio Vidal y Sebastián Yancovic, quienes facilitaron las fotografías que ilustran este artículo.

Agradecemos a todos los observadores y las organizaciones naturalistas por su colaboración, ya sea enviando sus registros en eBird-Chile o comunicándose directamente con nosotros. Pedimos las disculpas anticipadas por eventuales omisiones o errores en los nombres de dichos observadores, los que se detallan a continuación:

José Aguayo, Anselmo Aguilar, Juan Aguirre, José Aldunate, Gail Alfsen, Nicolás Amaro, Américo Araya, Paulina Arce, Hugo Arnal, Etienne Artigau, Ignacio Azócar, Walter Baliero, Rubén Barraza, Rodrigo Barros, Hope Batcheller, Charles Bell, Julio Bendek, Peter Bengtson, Paul Berrigan, Luc Betinelli, Nadia Biaggini, Steve Bird, Sergio Bitrán, Julien Boulanger, Michael Bowen, Matías Bravo, Víctor Bravo, José Luis Brito, Sally Brookman, Eric Buchel, Peter Burke, Pablo Cáceres, Ariel Cabrera, Loreto Caldera, Alex Campbell, Caryl Carr, Alejandra Castro, Juan Carlos Castillo, Amancay Cepeda, John Collins, Nelson Contardo, Juan Mauricio Contreras, Patricio Contreras, Richard Coombs, Stephen Copsey, Humberto Cordero, Jorge Córdova, Eduardo Costoya, Enrique Couve, Maximiliano Daigre, Philippe Dandois, Sebastián Dardanelli, Diego Davis, Felipe de Groot, Jean Paul de la Harpe, Cristófer de la Rivera, Diego Demangel, Raúl Demangel, Lorenzo Demetrio, Fernando Díaz, Hugo Díaz, Juan José Donoso, Roberto Donoso, Raff Drijvers, Sofía Egaña, Víctor Escobar, Cristián Estades, Margarita Fernández, Andrew Farnsworth, Claudius Feger, Jorge Ferrada, Norma Ferriz, Mario Figueroa, Susan Fletcher, Marcelo Flores, Edwin French, Lev Frid, Camila Fuentes, Jorge Fuentes, Juan Pablo Gabella, Alfredo Gahona, José Galaz, Carlos García, Humberto Gómez, Oscar Gómez, Carolina González, Cristián González B., Daniel González, Paulina González, Rodrigo González, Kenji Hamasaki, Samuel Hansson, Rick Heil, Sylvia Hernández, Mauri-

cio Herrera, Raúl Herrera, Ana Hinojosa, Johanna Hödar, Kyle Holloway, Kathleen Horn, Roger Horn, Kristen Horton, Luk Hostens, Rodrigo Hucke-Gaete, Sharon Hull, Santiago Imberti, Dinka Ivulic, Francisca Izquierdo, Alfredo Jara (SAG Arica), Gerardo Jara, Rocío Jara, Álvaro Jaramillo, Javier Jerez, Jaime Jiménez, Rodrigo Jiménez, Andy Johnson, Raphaël Jordan, Andrés Jullian, Yves Kayser, Barbara Knapton, Andrew Lazere, Pedro Lazo, Inti Lefort, Jack Levene, Robert Lewis, Francisco Lira, Paz Lisboa, Samuel Lizana, Verónica López, Guillermo Luna, Francisco Magnasco, Vinko Malinarich (SAG Tarapacá), Daniel Martínez, Viviana Maturana, Ricardo Matus, Adrien Mauss, Tomas Mckay, Fernando Medrano, Felipe Méndez, Gabriela Méndez, Nicolás Mercado, Oscar Mercado, Andrea Minoletti, Diego Miranda, Loreto Miranda, Rodrigo Moraga, Nibaldo Morales, César Moreno, Charly Moreno, Whitney Mortimer, Camilo Moya, Pieter Moysons, Anir Muñoz, Nicolás Muggli, Ulises Nancuante, Rob Nagtegaal, Eduardo Navarro, Fernanda Neder, Emma Newcombe, Heraldo Norambuena, Linda Nuttall, Carlos Olavarría, Marcelo Olivares, Flavio Olivares Z., Freddy Olivares, Ximena Olivares, Miguel Orsola, Rodrigo Ortega, Liliana Ortiz, Patricio Ortiz, Sergio Ostría, Sebastián Pardo, Marcia Parker, Víctor Pastén-Marambio, Mark Pearman, Carola Peña, Ronny Peredo, Claire Pernollet, Robert Petitpas, César Piñones, Ricardo Pino, Cristián Pinto, César Pizarro (CONAF), Cristóbal Pizarro, Jordi Plana, Cristóbal Poblete, Laura Portugal, Edwin Price, Matías Portflitt, Andrés Puiggros, Edgardo Quezada, James Quezada, Victor Raimilla, Tahia Rannou, Diego Reyes, Rodrigo Reyes, Edwin Riveros, Oscar Robayo, Philip Robertson, Denisse Rodríguez, Colin Rogers, Manuel Rojas, Rodrigo Rojas, Benito Rosende, Rafael Rosende, Paola Rossi (SAG Metropolitano), Cameron Rutt, Valeria Sabaj, Sebastián Saiter, Armando Salce, Milenka Sánchez, Erik Sandvig, Fabien Sane, Gonzalo Santibáñez, Carlos Sarmiento, Juan Sarratosa Fabrice Schmitt, Bernardo Segura, Luke Seitz, Nathan Senner, Maximiliano Sepúlveda, Kevin Seymour, Julie Sherwood, Randall Siebert, Ariel Silva, Claudia Silva, Macarena Silva, Rodrigo Silva, Trinidad Solís de Ovando, Mike Sos, Cristina Soto, Joshua Stone, Paulina Stowhas, Rodrigo Tapia, Juan Tassara, Daniel Terán, Carlos Tirado, Nuria Torés, Marcelo Torrejón, Isla Troncoso, Jaime Troncoso, Leo Ugarte, Cristián Uribe, Laura Valdivia, Pedro Valencia, Pilar Valenzuela, Tomás Valle, Carlos Vallejos, Diego

Valverde, David Vander Pluym, Montserrat Vanerio, Carlos Vásquez, Gustavo Vásquez, Nicolás Velasco, Eduardo Velásquez, Renato Velásquez, Ana María Venegas, Claudio Vidal, Andrés Vielma, Diego Villagrán, Esteban Villa-

nueva, Pablo Villegas, María Angélica Vukasovic, Susan Whiting, Angus Wilson, Sebastián Yancovic, Carolina Yáñez, Heather York, Nicolai Zeller, Carlos Zuleta, Boris Zúñiga.

REFERENCIAS

- Aguirre, J. 2006.** Nuevos registros de Gaviotín de Sandwich (*Sterna sandvicensis*) Latham, 1787, en Chile central. Boletín Chileno de Ornitología 12: 37-39.
- Aguirre, J., Johow, F., Seeger, H., Johow, J.C. & Rubio, M. 2009.** Nuevos registros de aves nidificantes en las Islas Desventuradas, Chile insular. Boletín Chileno de Ornitología 15(1): 44-55.
- Aguirre, J. & Simeone, A. 2006.** Nuevos registros de *Xema sabini* frente a las costas de Chile central. Boletín Chileno de Ornitología 12: 59.
- Araya, B., Millie, G. & Magnere, O. 1972.** Un vencejo nuevo para Chile: *Chaetura pelagica* (Linnaeus, 1758) (Apodiformes: Apodidae). Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 16 (188): 11-12.
- Azócar, M.I. & Pinto, C. 2014.** La Tenca de alas blancas (*Mimus triurus*) en Chile. Boletín Chileno de Ornitología 20(1-2): 44-47.
- Barros, R. 2010.** Algunas evidencias inéditas de aves raras en Chile. La Chiricoca 11: 11-25.
- Barros, R. 2014.** El Batitú *Bartramia longicauda* en Chile. La Chiricoca 18: 8-13.
- Barros, R. 2015a.** El Mirlo de pico corto *Molothrus rufoaxillaris*, una nueva especie para Chile. La Chiricoca 19: 36-44.
- Barros, R. 2015b.** Algunos Comentarios a Lista de las Aves de Chile. La Chiricoca 20: 57-78.
- Barros, R. & Díaz, F. 2008.** Expedición XV: Observando aves en Arica y Parinacota. La Chiricoca 7: 3-25.
- Barros, R., Jaramillo, A. & Schmitt, F. 2015.** Lista de las Aves de Chile 2014. La Chiricoca 20: 79-100.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2006.** Resumen de avistamientos, Marzo-junio 2006. La Chiricoca 1: 9-17.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2007a.** Resumen de avistamientos, julio-octubre 2006. La Chiricoca 2: 15-21.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2007b.** Resumen de avistamientos, Noviembre 2006 - Febrero 2007. La Chiricoca 3: 21-29.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2007c.** Resumen de avistamientos, Marzo - Junio 2007. La Chiricoca 4: 21-25.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2008a.** Resumen de avistamientos, Julio - Octubre 2007. La Chiricoca 5: 20-26.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2008b.** Resumen de Avistamientos, Noviembre 2007 - Febrero 2008. La Chiricoca 6: 20-27.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2008c.** Resumen de Avistamientos, Marzo - Junio 2008. La Chiricoca 7: 30-37.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2009a.** Resumen de Avistamientos, Julio - Octubre 2008. La Chiricoca 8: 35-40.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2009b.** Resumen de Avistamientos, Noviembre 2008 - Febrero 2009. La Chiricoca 9: 40-45.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2010a.** Resumen de Avistamientos, Marzo - Octubre 2009. La Chiricoca 10: 14-21.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2010b.** Resumen de Avistamientos, Noviembre 2009 - Febrero 2010. La Chiricoca 11: 35-43.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2011a.** Resumen de Avistamientos, Marzo - Agosto 2010. La Chiricoca 12: 25-33.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2011b.** Resumen de Avistamientos, Septiembre 2010 - Febrero 2011. La Chiricoca 13: 30-50.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2012a.** Resumen de Avistamientos, Marzo - Agosto 2011. La Chiricoca 14: 26-33.

- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2012b.** Resumen de Avistamientos, Septiembre 2011 - Febrero 2012. La Chiricoca 15: 31-38.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2013.** Resumen de Avistamientos, Marzo - Agosto 2012. La Chiricoca 16: 24-37.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2014a.** Resumen de Avistamientos, Septiembre 2012 - Febrero 2013. La Chiricoca 17: 17-26.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2014b.** Resumen de Avistamientos, Marzo - Agosto 2013. La Chiricoca 18: 20-31.
- Barros, R., Schmitt, F. & la red de observadores de aves. 2015.** Resumen de Avistamientos, Septiembre 2013 - Febrero 2014. La Chiricoca 19: 45-57.
- Cabezas, L. A., Ruiz, J., Yates, O. & Bernal, M. 2012.** The black petrel (*Procellaria parkinsoni*) in pelagic waters off northern Chile: a southern extension to the known distribution and interactions with the pelagic longline fishery. *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research* 46: 537-544.
- Cáceres, P. 2012.** Nuevos registros de Cuclillo de pico negro (*Coccyzus melacoryphus*) en Chile. La Chiricoca 14: 11-14.
- Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2015.** The eBird/Clements checklist of birds of the world: v2015. Downloaded from <http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/>
- Couve, E. & Vidal, C. 2005.** Primer registro documentado de Albatros de frente blanca *Thalassarche cauta cauta* en aguas chilenas. *Boletín Chileno de Ornitología* 11: 23-24.
- Demangel R. 2006.** *Circus buffoni* en Lampa, Región Metropolitana. *Boletín Chileno de Ornitología* 12: 60.
- Demetrio, L. 2008.** Primer registro del Halcón pecho anaranjado en Chile. *Red de Rapaces Neotropicales*, *Boletín* 5: 5.
- Díaz, F. & Schmitt, F. 2010.** Primer registro de Garza chiflón (*Syrigma sibilatrix*) en Chile. *Boletín Chileno de Ornitología* 16 (1): 48-50.
- eBird. 2015.** eBird: Una base de datos en línea para la abundancia y distribución de las aves. eBird, Ithaca, New York. Disponible: <http://www.ebird.org> (consultado el 30 agosto 2015).
- Estades, C., Aguirre, J. & Tala, Ch. 2004.** *Theristicus melanopis branickii* en el valle de Azapa. *Boletín Chileno de Ornitología* 10: 41-42.
- Flores, M.A. 2010.** Confirmación de la presencia de la Gallina ciega peruana (*Chordeiles acutipennis*, Hermann 1783) en Chile. *Boletín Chileno de Ornitología* 16 (1):32-36.
- Flores, M., Lazo, P. & Hucke-Gaete, R. 2013.** Estado del conocimiento de los piqueros pantropicales (Sulidae) en las islas oceánicas chilenas y primer registro de piquero café *Sula leucogaster* en Isla de Pascua. *Revista de Biología Marina y Oceanografía* 48 (3): 667-672.
- Gálvez, N. & González, B. 2006.** *Mimus triurus* en Chiloé continental. *Boletín Chileno de Ornitología* 12: 60.
- González, G. 2013.** Primer registro documentado de Corbatita overo (*Sporophila lineola*) en Chile. *Hornero* 28(2): 75-78
- González-Acuña, D., Lazo, P., Chávez, C. & Ardiles, K. 2010.** Piquero de patas rojas (*Sula sula*) en Isla de Pascua, Chile. *Boletín Chileno de Ornitología* 16 (2): 91-94.
- Hansson, S. 2014.** El primer registro de *Limosa lapponica* para Chile. La Chiricoca 18: 4-7.
- Hinojosa, A., & González, D. 2004.** *Dendrocygna viduata* en las cercanías de Parral. *Boletín Chileno de Ornitología* 10: 42.
- Howell, S.N. 2007.** Chilean records of Royal Tern *Sterna maxina*, Black Tern *Chlidonias niger*, Grey-hooded Gull *Larus cirrocephalus* and Manx Shearwater *Puffinus puffinus*. *Cotinga* 27: 84-85.
- Howell, S.N.G. 2012.** Petrels, Albatrosses & Storm-Petrels of North America. Princeton University Press, New Jersey.
- Howell, S.N.G. & Herrera, R. 2010.** First Chilean record of Yellow-crowned Night Heron *Nyctanassa violacea*. *Cotinga* 32: 157-158.
- Jaramillo, A. 2003.** Birds of Chile. Helm Field Guides, Christopher Helm, London.
- Jaramillo, A., Johnson, M.T.J., Rothfels, C.J. & Jhonson, R.A. 2008.** The native and exotic avifauna of Easter

- Island: then and now. Boletín Chileno de Ornitología 14 (1): 8-21.
- Jaramillo, A. & Matus, R. 2010.** Primer registro del Benteveo de vientre azufre (*Myiodynastes luteiventris*) en Chile. Boletín Chileno de Ornitología 16 (2): 99-104.
- Knapton, B. 2002.** A new bird for Chile: the Rufous-webbed Tyrant *Polioxolmis rufipennis*, potentially breeding within the province of Parinacota, Tarapacá Región. Boletín Chileno de Ornitología 9: 37-41.
- La Chiricoca 2007.** Detalles de algunas salidas pelágicas. La Chiricoca 3: 30-32.
- Lemus, M.L., Muñoz, A. & Torres-Mura, J.C. 2014.** Registro de Loica argentina (*Sturnella superciliaris*) en el Salar de Atacama (Región de Antofagasta, Chile). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 63: 65-68
- Marín, M. 2004.** Lista comentada de las Aves de Chile. Lynx Edicions, Bellaterra, Barcelona.
- Marín, M. 2011.** Distributional notes on the shy albatross (*Thalassarche cauta*): its presence off South America in the western Atlantic and Eastern Pacific Oceans. Notornis 58: 101-103.
- Marín, M. & Cáceres, P. 2010.** Sobre las aves de Isla de Pascua. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 59: 75-95.
- Peredo, R., Knapton, B., Jaramillo, A. & Schmitt, F. 2007.** Lista de las Aves de la Desembocadura del Río Llu-ta. La Chiricoca 2: 5-11.
- Phillipi-B., R. A. 1964.** Catálogo de las aves de Chile con su distribución geográfica. Investigaciones Zoológicas Chilenas 11: 1-179.
- Raimilla, V. 2012.** Primer registro documentado del Salteador pardo *Stercorarius antarcticus* (Lesson, 1831) (Stercorariidae) para las costas del Pacífico desde el Archipiélago Diego Ramírez, sur de Chile. Anales del Instituto de la Patagonia 40(2): 153-156.
- Reyes, R. & Tapia, R. 2007.** Detalle de algunas salidas pelágicas a la corriente de Humboldt, temporada Marzo – Junio 2007. La Chiricoca N° 7: 26-28.
- Schmitt, F. 2008.** Observar aves pelágicas en Chile. La Chiricoca 5: 3-13.
- Schmitt, F. 2011.** Primer avistamiento de Fardela de Parkinson (*Procellaria parkinsoni*) desde la costa chilena, y comentarios sobre la identificación de esta especie. La Chiricoca 12: 34-39.
- Schmitt, F. & Barros, R. 2006a.** Algunos avistamientos, de julio 2005 a febrero 2006. Observaciones Chilenas 1: 2-7.
- Schmitt, F. & Barros, R. 2006b.** La Golondrina de cabeza rojiza (*Alopochelidon fucata*): una nueva especie para Chile !!. La Chiricoca 1: 18.
- Schmitt, F. & Barros, R. 2009.** Nuevos avistamientos de Playero semipalmado (*Calidris pusilla*) y Playero occidental (*Calidris mauri*) en Chile central. Boletín Chileno de Ornitología 15 (1): 29-34.
- Schmitt, F. & Cánepa, A. 2007.** First record of Tawny-headed Swallow *Alopochelidon fucata* in Chile. Cotinga 27: 85-86.
- Simeone, A., Luna-Jorquera, G., Bernal, M., Garthe, S., Sepulveda, F., Villablanca, R., Ellenberg, U., Contreras, M., Muñoz, J., & Ponce, T. 2003.** Breeding distribution and abundance of seabirds on islands off north-central Chile. Revista Chilena de Historia Natural 76: 323-333.
- Simeone, A., Bernal, M. & Villablanca, R. 2005.** La Fardela de Nueva Zelanda (*Procellaria westlandica*) y la Golondrina de mar peruana (*Oceanodroma tethys*): ¿por qué hemos pasado por alto su presencia en Chile?. Boletín Chileno de Ornitología 11:25-28.
- Tapia, R. 2005.** Zarapito moteado (*Limosa fedoa*) en estuario del río Aconcagua y playa Punta de Piedra, comunas de Concón y Quintero, Región de Valparaíso. Boletín Chileno de Ornitología 11: 34.
- Torés, N., Johow, P. & Johow, F. 2013.** Nuevo registro para la avifauna de Chile: el Cuclillo de pico amarillo *Coccyzus americanus*. La Chiricoca N° 16: 16-19.
- Torres-Mura, J. C. 2009.** Registro del Chorlo picogruesso, *Charadrius wilsonia* (Aves: Charadriiformes) en Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 58: 93-96.
- Villegas, P. 2013.** Registros de Playero gris (*Tringa incana*) en la región de Tarapacá. La Chiricoca N° 16: 20-23.