

# Sobre la presencia de la Golondrina parda (*Progne tapera*) en Chile

*por Fernando Medrano, Juan Aguirre, Charly Moreno,  
Ariel Silva, María Angélica Vukasovic y Ilenia Lazzoni*



Figura 1. Golondrina parda (*Progne tapera*), 19 de abril 2015, Baquedano (Reg. II), foto Ariel Silva.

El género *Progne* es un grupo de nueve golondrinas de estructura robusta y alas anchas (Narosky & Yzurieta 2010). Estas golondrinas habitualmente se encuentran vinculadas a sectores abiertos (e.g. zonas agrícolas, ambientes antrópicos), donde se perchan en cables (Fjeldsa & Krabbe 1990; Ridgely & Tudor 2009).

Dentro de este grupo se encuentra la **Golondrina parda** (*P. tapera*), la cual es una especie que se distribuye en gran parte del continente sudamericano, considerándose parcialmente migratoria (Chesser 1994). Mientras las poblaciones de la subespecie nominal *P. t. tapera* son residentes en Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela y las Guayanas, las poblaciones de *P. t. fusca* nidifican entre noviembre y marzo desde el sudeste de Bolivia y este de Brasil hasta el centro-sur de Argentina, y presentan una migración latitudinal entre marzo y noviembre hasta el norte de Sudamérica y Panamá (Turner & Rose 1989, Turner 2016a) (Figura 2). En la costa de Perú y en Chile existen escasos registros de esta especie y ninguno de estos se encuentra documentado con evidencias físicas (especímenes de museo, fotografías, etc.).

### Sobre los registros en Chile

El primer registro para el país fue publicado por Evans (1999), quien señala la observación de un ejemplar en el sector del aeropuerto Chacalluta, provincia de Arica, el 21 de enero de 1998, entregando una descripción detallada del individuo, acompañándola con un dibujo del mismo en su artículo. En base a este registro, Marín (2004) categoriza a la Golondrina parda como una especie hipotética para el país (por no existir evidencia física), señalando la posibilidad de que el ejemplar pudiese haber sido confundido con un juvenil de **Golondrina peruana** (*P. murphyi*), especie rara pero regular en los valles del norte de Chile (Barros et al. 2015).

Evans (1999) describe al ejemplar avistado de la siguiente forma: Una especie claramente mayor a las Golondrinas de dorso negro con las que se encontraba. Desde abajo las alas son de un color café tierra oscuro, siendo más oscuro en las coberteras menores y el sector de la axila. Tenía una banda completa pero compuesta por manchas, con una línea vertical que baja hacia el pecho. La cola es furcada y de color café oscuro. En contraste, la garganta, el vientre y la zona cloacal son de un blanco puro. El pico es sólido y negro. Desde arriba, el individuo es café grisá-



**Figura 2.** Mapa de la distribución de la **Golondrina parda** (*Progne tapera*). Modificado de Neotropical Birds Online (2010)

ceo uniforme, con la excepción de la corona, las primarias externas y la cola que son ligeramente más oscuras. Con esta descripción se puede descartar la confusión con un juvenil de Golondrina peruana, pues estos no presentan un color blanco puro en la garganta, vientre y zona cloacal, sino que son de un café grisáceo (Turner 2016b).

Con este único registro conocido, por no existir evidencia, Barros et al. (2015) también la consideran una especie hipotética en su “Lista de las Aves de Chile 2014”, sin hacer más comentarios.

En el presente artículo se da cuenta de cinco registros inéditos para la Golondrina parda en el norte de Chile, publicándose las primeras fotografías de esta especie en el país. El primer registro corresponde a un ejemplar observado en el valle de Chaca, provincia de Arica, el 18 de octubre de 2012, identificado como esta especie por su gran tamaño, el color marrón oscuro del dorso y un collar grisáceo con una prolongación por el medio del pecho. No se obtuvieron evidencias.

El segundo registro es un ejemplar encontrado en Baquedano, provincia de Antofagasta, el 17 de abril de 2015, del que se lograron obtener fotografías, correspondiendo éstas a las primeras evidencias para la especie en Chile



**Figura 3.** Evidencias de ejemplares de **Golondrina parda** (*Progne tapera*) en Chile: **A)** 17 de abril 2015, Baquedano (Reg. II), foto Ariel Silva. **B)** 23 de octubre 2015, Valle de Lluta (Reg. XV), foto Fernando Medrano. **C)** 26 de octubre 2015, Mejillones (Reg. II), foto Fundación Gaviotín Chico. **D)** 07 de noviembre 2015, Baquedano (Reg. II), foto Charly Moreno.

(Figura 3A). Este individuo fue observado solitario en la plaza principal del poblado, destacando principalmente por su tamaño mayor al de una **Golondrina barranquera** (*Riparia riparia*) y el parche vertical de manchas en el pecho. El ejemplar también se observó en días posteriores (Figuras 1 y 4).

El tercer registro fue realizado el 23 de octubre de 2015, en el Valle del río Lluta, provincia de Arica, volando sobre una plantación de maíz y posándose en los cables adyacentes. Este ejemplar se encontraba en una gran bandada mixta de cerca de 50 individuos de **Golondrina de dorso negro** (*Pygochelidon cyanoleuca*), Golondrina barranquera y **Golondrina bermeja** (*Hirundo rustica*) (Figura 3B). El cuarto registro es un ejemplar encontrado muerto en Mejillones, provincia de Antofagasta, el 26 de octubre de 2015, el que fue entregado al personal de la Fundación Gaviotín Chico (Figura 3C). La piel fue enviada al Museo

Nacional de Historia Natural de Santiago y se encuentra depositada en su colección bajo el registro MNHN/AVE 5426.

El quinto registro se realizó nuevamente en el pueblo de Baquedano, provincia de Antofagasta, donde se observaron entre uno y dos ejemplares, en noviembre y diciembre de 2015 (Figura 2 y tabla 1).

Si bien todos estos avistamientos se han realizado en el norte de Chile, esta especie se puede encontrar en gran parte del territorio argentino (Figura 1), existiendo registros hasta el sector de Neuquén y en el Parque Nacional Nahuel Huapi (eBird 2016). Esto, sumado a que los individuos de la población migratoria pueden alcanzar alturas de hasta 4000 msnm durante sus movimientos (Fjeldsa & Krabbe 1990), hace posible la llegada de individuos en prácticamente cualquier sector de Chile al norte de la Región de Los Lagos.

**Tabla 1.** Registros de **Golondrina Parda** (*Progne tapera*) en Chile. Los números de la columna “Evidencias” corresponden a: (1) Foto publicada en este artículo; (2) Sin evidencia (foto, grabación de sonido, etc.).

N°	Fecha	Cantidad	Localidad	Lat/Long	Observadores	Evidencias
1	21.01.1998	1	Aeropuerto Chacalluta	18.353/70.339	Derek Evans	2
2	18.10.2012	1	Valle de Chaca	18.818/70.145	Juan Aguirre	2
3	17.04.2015 al 19.04.2015	1	Baquedano	23.335/69.839	Ariel Silva	1
4	23.10.2015	1	Valle del Río Lluta	18.415/70.234	Juan Aguirre, María Angélica Vukasovic, Charif Tala, Cristián Estades, Ilenia Lazzoni, Fernando Medrano	1
5	26.10.2015	1	Mejillones	23.089/70.347	Fundación Gaviotín Chico	1
6	07.11.2015 al 06.12.2015	1 y 2	Baquedano	23.335/69.839	Ariel Silva, Charly Moreno, Juan Contreras, Caroline Sanchez, Rodrigo Barros, Fernando Medrano, Heraldo Norambuena	1

Tanto el avistamiento de Evans (1999) como la seguidilla de avistamientos del año 2015 se produjeron en medio de la anomalía climática de “El Niño”. Si bien es cierto, no es posible adjudicarlo como el factor causante del mayor número de registros, eventualmente el aumento en las precipitaciones, y por ende en la productividad primaria terrestre pueden haber influido en el éxito reproductivo de los individuos, y con esto un aumento en el tamaño poblacional, por lo que se hace más probable que existan algunos individuos que se pierdan y pasen por el territorio chileno.

### ¡Tú puedes ayudar a entender la presencia de esta especie en Chile!

Para comprender si la presencia de esta especie es regular en el país, o si en su defecto está supeditada a algunos años particulares, es importante tener en mente que esta especie podría estar en las bandadas de golondrinas, y por ende es necesario saber identificarla.

Muchas especies tratadas en algún momento como errantes para Chile, e.g. **Águila pescadora** (*Pandion haliaetus*), **Batitú** (*Bartramia longicauda*), **Golondrina grande** (*Petrochelidon pyrrhonota*), hoy son consideradas visitantes regulares en territorio nacional (Barros et al. 2015). Esto debido principalmente a una mayor presencia de observadores de terreno que gracias a la tecnología disponible (cámaras, grabadoras) logran documentar los registros. Además, la creación de redes que permiten compartir los avistamientos (e.g. eBird, ObsChile) y conocer estos casi en tiempo real, han ayudado a mejorar la calidad y cantidad de los registros, sumando así nuevos observadores y ornitólogos al país.

La identificación de esta especie, comparándola con otras golondrinas residentes en el territorio nacional es relativamente sencilla: es una golondrina robusta, de alas anchas, cabeza cuadrada y pico robusto. Tiene la parte superior (corona y manto) de color marrón y sin rabadilla blanca. Presenta un collar marrón, con una línea vertical de manchas marrones que se encuentra al medio del pecho. Eventualmente podría ser confundida con una Golondrina barranquera, pero la Golondrina parda es más grande y robusta (incluso más grande que una Golondrina bermeja), presenta un pico más ancho y una cabeza más angulosa.

### Agradecimientos

Agradecemos al personal de la Fundación Gaviotín Chico por permitirnos citar su registro y utilizar su fotografía en este artículo. A Bárbara Toro, por la información de la piel depositada en la colección del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago. Adicionalmente, agradecemos los comentarios de Rodrigo Barros y Heraldo Norambuena los que mejoraron sustancialmente este escrito. Fernando Medrano agradece la beca de Magister CONICYT-PCHA / Magister Nacional / 2015-22150082.

### Bibliografía

**Barros, R., Jaramillo, A. & Schmitt, F. 2015.** Lista de las Aves de Chile 2014. La Chiricoca 20: 79-100.

**Chesser, T. 1994.** Migration in South America: an overview of the austral system. Bird Conservation International 4: 91-107.

**eBird. 2016.** eBird Basic Dataset. Cornell Lab of Orni-

thology, Ithaca, New York. Enero, 2016.

**Evans, D. 1999.** The first Brown-chested Martin *Progne tapera* in Chile. *Cotinga* 11: 67

**Fjeldsa, J. & Krabbe, N. 1990.** Birds of the High Andes. Zoological Museum, University of Copenhagen books.

**Marín, M. 2004.** Lista comentada de las aves de Chile. Lynx ediciones. Barcelona, España. 144 pp.

**Narosky, T. & Yzurieta, D. 2010.** Aves de Argentina y Uruguay. Guía de identificación. Vásquez Mazzini Editores. Buenos Aires, Argentina. 432 pp.

**Neotropical Birds Online. 2010.** Brown-chested Martin (*Progne tapera*). Neotropical Birds Online. Ithaca: Cornell Lab of Ornithology. Extraído de Neotropical Birds Online: <http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/>

species/overview?p\_p\_spp=522796 el 13 de Enero de 2016

**Turner, A. & Rose, C. 1989.** A handbook to the swallows and martins of the world. Christopher Helm Publishers. London, UK. 267 pp.

**Turner, A. 2016a.** Brown-chested Martin (*Progne tapera*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. & de Juana, E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Extraído de: <http://www.hbw.com/node/57717> el 5 de Enero de 2016

**Turner, A. 2016b.** Peruvian Martin (*Progne murphyi*). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D. & de Juana, E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Extraído de: <http://www.hbw.com/node/57715> el 13 de Enero de 2016



**Figura 4. Golondrian parda (*Progne tapera*), 19 de abril 2015, Baquedano (Reg. II), foto Ariel Silva.**