Resumen de Avistamientos, Enero - Junio 2016

por Rodrigo Barros y la red de observadores de aves

Pingüino emperador (*Aptenodytes forsteri*), 29 de mayo 2016, orillas del Estrecho de Magallanes, sector muelle Asmar, norte de Punta Arenas (Reg. XII), foto Gerardo López.

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de enero y junio de 2016, y que llegaron principalmente a través de la base de datos eBird, administrada en el país por la ROC.

¡¡¡Si haces observaciones de aves, tus datos siempre serán muy bienvenidos!!!

Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema eBird. Con eBird puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten.

Mientras más información agregues a tus avistamientos, como cantidad, edad, sexo o comportamiento de reproducción, más interesantes y útiles serán tus datos.

Si necesitas información sobre identificación o distribución de las aves en Chile, si quieres anunciar el avistamiento de un ave rara o si tienes cualquier duda sobre las aves chilenas, no dudes en participar en el e-group ObsChile.

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los siguientes 86 observadores:

Gail Alfsen, Myriam Arancibia, Matías Ballarini, Rubén Barraza, José Caro, Jorge Chamia, Romina Chiappe, Tomás Child, Rodrigo Condemarín, Nelson Contardo, Camilo Contreras, Juan Mauricio Contreras, Humberto Cortés, Eduardo Costoya, Enrique Couve, Philippe Dandois, Mauricio González, Felipe de Groote, Darío de la Fuente, Jorge de la Torre, Fernando Díaz, José Díaz, Boris Farías, Mario Figueroa, Edwin French, Jorge Fuentes, Fundación Gaviotín Chico, Jill Gaetzi, Elba Gamonal (CONAF Magallanes), Matías Garrido, Óscar Guineo, Ricardo Guineo, Kristen Horton, Steve Howell, Álvaro Jaramillo, Fidel Lara, Inti Lefort, Gerardo López, Juan Eduardo Machuca, Carl Manning, Judi Manning, Vukasin Marinovic, Valeria Martins, Ricardo Matus, Antonio Maureira, Fernando Medrano, Nicolás Mercado, Charly Moreno, Marcelo Muñoz, Eduardo Navarro, Patricia Núñez, Verónica Núñez, Michael O'Brien, Freddy Olivares, Marcelo Olivares, Vicente Pantoja, Cindy Parliament, Dan Parliament, Katheryne Paulsen (CONAF Magallanes), Ronny Peredo, César Piñones, Cristián Pinto, Alejandra Ponce, Laura Portugal, Andrés Puiggros, Diego Ramírez, Rodrigo Reyes, Karen Rojas, Manuel Rojas, Sebastián Saiter, Caroline Sánchez, Fabrice Schmitt, Ariel Silva, Klya Simmons, Rodrigo Tapia, Ivo Tejeda, Hederd Torres, Leo Ugarte, Carolina Valdés, Laura Valdivia, Pedro Valencia, Paulo Valerio, Carlos Vallejos, Montserrat Vanerio, Claudio Vidal, Patricia Vramicar.

Los avistamientos particularmente raros para los cuales no recibimos "prueba" (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un *.

Perdiz copetona (*Eudromia elegans*): Destaca la observación de 2 ejemplares en los predios de la Ganadera Cañadón Grande, Posesión (Reg. XII), el 28.01 (J. Chamia), correspondiendo al primer registro de esta especie en la Región de Magallanes.

Perdiz austral (*Tinamotis ingoufi*): Siempre rara en el país, 1 ejemplar es encontrado muerto en la Ruta 255, cerca de Kimiri Aike, San Gregorio (Reg. XII), el 04.06 (C. Vidal, E. Couve, R. Tapia), el que luego de ser embalsamado, se depositó en la colección del Instituto de la Patagonia (info R. Matus).

Cisne de cuello negro (*Cygnus melancoryphus*): Muy al norte de su rango habitual, 1 ejemplar está presente en el embalse Conchi, río Loa (Reg. II), entre el 19.02 y el 07.04 (F. de Groote, F. Díaz, M. Garrido).

Pimpollo tobiano (*Podiceps gallardoi*): 1 ejemplar se registra nuevamente en la Laguna Blanquillo, Parque Nacional Torres del Paine (Reg. XII), el 17.02 (K. Paulsen, E. Gamonal. Monitoreo de aves acuáticas del P.N. Torres del Paine, Programa de Conservación y Gestión Ambiental); y un segundo ejemplar está presente en la Laguna Los Palos (Reg. XII) entre el 03.01 y el 29.02 (J. Díaz, M. Ballarini, M. Figueroa, R. Matus).

Pingüino emperador (*Aptenodytes forsteri*): El 29.05 es encontrado 1 ejemplar adulto a orillas del Estrecho de Magallanes, sector del muelle Asmar, norte de Punta Arenas (Reg. XII), el que fue derivado al Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura, siendo liberado a orillas del Estrecho de Magallanes, en Punta Delgada (Reg. XII) el 04.06 (R. Matus, R. Tapia). Este individuo corresponde al segundo registro para la especie en Chile.

Perdiz copetona (*Eudromia elegans*), 28 de enero 2016, predios de la Ganadera Cañadón Grande, Posesión (Reg. XII), foto Jorge Chamia.

Arriba: **Cisne de cuello negro** (*Cygnus melancoryphus*), 19 de febrero 2016, embalse Conchi, río Loa (Reg. II), foto Felipe de Groote. Abajo Izq.: **Pimpollo tobiano** (*Podiceps gallardoi*), 17 de febrero 2016, Laguna Blanquillo, Parque Nacional Torres del Paine (Reg. XII), el 17.02, foto Elba Gamonal (Monitoreo de aves acuáticas del P.N. Torres del Paine, Programa de Conservación y Gestión Ambiental). Abajo Der.: **Pimpollo tobiano** (*Podiceps gallardoi*), 03 de enero 2016, Laguna Los Palos (Reg. XII) foto José Díaz.

Albatros de Buller (*Thalassarche bulleri*): Al sur de su rango habitual, 2 ejemplares son fotografiados al este del Cabo de Hornos (Reg. XII) el 26.01 (M. O'Brien).

Petrel de Kermadec (*Pterodroma neglecta*): Se observan 12 ejemplares en un transecto realizado desde un crucero el 16.03, distante entre 120 y 170 millas náuticas desde la costa de Atacama (Reg. III) y Antofagasta (Reg. II) (F. Schmitt, J. Gaetzi, C. Parliament, D. Parliament, P. Vranicar).

Petrel-paloma de pico ancho (*Pachyptila vittata*): Sorprende el hallazgo de 1 ejemplar en Isla Riesco (Reg. XII) el 26.01 (O. Guineo, R. Guineo), el que se depositó en la colección del Instituto de la Patagonia (info. R. Matus).

Petrel de Parkinson (*Procellaria parkinsoni*): 1 ejemplar es fotografiado al norte de la Península del Taitao (Reg. XI) el 11.03 (S. Howell, F. Schmitt); y otro ejemplar es observado mar adentro frente a las costas de Chañaral (Reg. III) el 16.03 (F. Schmitt, J. Gaetzi, C. Parliament, D. Parliament, P. Vranicar).

Fardela atlántica (*Puffinus puffinus*): 1 ejemplar es fotografiado en una salida pelágica frente a Mejillones (Reg. II) el 25.03 (F. Díaz, M. Garrido, F. de Groote).

Golondrina de mar de cara blanca (*Pelagodroma marina*)**:** Con muy pocos registros para Chile, 4 ejemplares son observados en aguas chilenas frente a Antofagasta (Reg. II) el 16.03.2016, distante entre 160 y 170 millas

Arriba Izq.: **Albatros de Buller** (*Thalassarche bulleri*), 26 de enero 2016, este del Cabo de Hornos (Reg. XII), foto Michael O'Brien. Arriba Der.: **Petrel de Kermadec** (*Pterodroma neglecta*), 16 de marzo 2016, 120 millas náuticas frente a la costa de Chañaral (Reg. III), foto Fabrice Schmitt. Centro Izq.: **Petrel de Parkinson** (*Procellaria parkinsoni*), 11 de marzo 2016, norte de la Península del Taitao (Reg. XI), foto Steve Howell. Centro Der.: **Fardela atlántica** (*Puffinus puffinus*), 25 de marzo 2016, salida pelágica frente a Mejillones (Reg. II), foto Fernando Díaz. Abajo: **Petrel-paloma de pico ancho** (*Pachyptila vittata*), encontrado el 26 de enero 2016, Isla Riesco (Reg. XII), foto Oscar Guineo.

Golondrina de mar de cara blanca (*Pelagodroma marina*), 16 de marzo 2016, 160 millas náuticas frente a la costa de Antofagasta (Reg. II), foto Fabrice Schmitt.

Izquierda: **Golondrina de mar de vientre blanco** (*Fregetta grallaria*), 15 de marzo 2016, entre Valparaíso (Reg. V) y Coquimbo (Reg. IV), foto Fabrice Schmitt. Arriba Der.: **Golondrina de mar de vientre blanco** (*Fregetta grallaria*), 16 de marzo 2016, 120 millas náuticas frente a la costa de Chañaral (Reg. III), foto Fabrice Schmitt. Abajo Der.: **Golondrina de mar peruana** (*Oceanodroma tethys*), 16 de marzo 2016, 120 millas náuticas frente a la costa de Chañaral (Reg. III), foto Fabrice Schmitt.

náuticas desde la costa, logrando fotografiarse uno de ellos (F. Schmitt, J. Gaetzi, C. Parliament, D. Parliament, P. Vranicar).

Golondrina de mar de vientre blanco (*Fregetta grallaria*): Atraído por las luces de una embarcación, en la madrugada del 15.03 se encuentra 1 ejemplar en la cubierta de un barco que estuvo navegando esa noche entre Valparaíso (Reg. V) y Coquimbo (Reg. IV), sin poder precisar el punto exacto de caída, sorprendiendo esta observación por lo cercano que se produce de la costa continental. Para la misma especie también destaca el avistamiento de 11 ejemplares en un transecto realizado desde el mismo barco el 16.03, distante entre 120 y 170 millas náuticas desde la costa de Atacama (Reg. III) y Antofagasta (Reg. II) (F. Schmitt, J. Gaetzi, C. Parliament, D. Parliament, P. Vranicar).

Golondrina de mar peruana (*Oceanodroma tethys*): Se observan entre 1 y 10 ejemplares desde un crucero el 16.03, en un transecto distante entre 120 y 170 millas náuticas desde la costa de Atacama (Reg. III) y Antofagasta (Reg. II) (F. Schmitt, J. Gaetzi, C. Parliament, D. Parliament, P. Vranicar).

Piquero blanco (*Sula dactylatra*): Se observan 6 ejemplares siguiendo un crucero el 16.03, en un transecto distante entre 120 y 150 millas náuticas desde la costa de Atacama (Reg. III) y Antofagasta (Reg. II) (F. Schmitt, J.

Izquierda: **Piquero blanco** (*Sula dactylatra*), 16 de marzo de 2016, 120 millas náuticas frente a la costa de Chañaral (Reg. III), foto Fabrice Schmitt. Derecha: **Pelícano pardo** (*Pelecanus occidentalis*), 19 de junio 2016, playa Changa, Coquimbo (Reg. IV), foto Juan Eduardo Machuca.

Gaetzi, C. Parliament, D. Parliament, P. Vranicar).

Piquero de patas azules (*Sula nebouxii*)*: 1 ejemplar juvenil se observa sobrevolando la Isla de Cachagua (Reg. V) el 27.03 (R. Reyes); y otro ejemplar se registra en Casa de Piedra, Concón (Reg. V) el 13.04 (R. Reyes).

Pelícano pardo (*Pelecanus occidentalis*): 1 ejemplar es observado en el puerto de Arica (Reg. XV), el 14.05 (C. Moreno, A. Puiggros); y otro ejemplar está presente en playa Changa, Coquimbo (Reg. IV), el 19.06 (M. Arancibia, J. Machuca).

Huairavillo de dorso negro (*Ixobrychus exilis*): Destaca la observación de 1 ejemplar en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) entre el 07 y el 15.04 (R. Peredo, C. Moreno, F. Medrano); y de 1 ejemplar encontrado en Mejillones (Reg. II) el 22.06 (Fundación Gaviotín Chico), correspondiendo a las primeras evidencias de esta especie para Chile.

Garza cuca (*Ardea cocoi*): Al norte de su rango habitual en el país, es fotografiado 1 ejemplar en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 04 y 13.04 (F. Lara, J. Fuentes).

Garza tricolor (*Egretta tricolor*): 1 ejemplar está presente en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) entre el 12.03 y el 26.06 (M. Muñoz, J. Fuentes, M. Garrido, J. Machuca, C. Moreno, R. Peredo, A. Puiggros, L. Valdivia, C. Vallejos).

Huairavo de corona amarilla (*Nyctanassa violacea*): En el puerto de Arica (Reg. XV), 1 ejemplar es observado el 14.05 (Ch. Moreno, A. Puiggros).

Tagua común (*Fulica armillata*): Al norte de su rango habitual en el país, 1 ejemplar se observa en la desembocadura del río Loa (límite Regs. I y II) el 18.06 (V. Martins).

Tagua de frente roja (*Fulica rufifrons*): Al norte de su rango conocido en Chile, nuevamente 1 ejemplar es fotografiado en la desembocadura del río Loa (límite Regs. I y II) el 18.06 (V. Martins).

Tagua andina (*Fulica ardesiaca*): Rara en la costa de Chile central, 1 ejemplar es fotografiado en la desembocadura del río Elqui (Reg. IV) entre el 22.05 y 13.06 (H. Cortés, P. Núñez, L. Ugarte, R. Barraza, F. Olivares, M. Olivares).

Huairavillo de dorso negro (*Ixobrychus exilis*). Arriba: 07 de abril 2016, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Ronny Peredo. Abajo: 22 de junio 2016, Mejillones (Reg. II), foto Fundación Gaviotín Chico.

Arriba Izq.: **Garza cuca** (*Ardea cocoi*), 13 de abril 2016, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Jorge Fuentes. Arriba der.: **Garza tricolor** (*Egretta tricolor*), 28 de mayo 2016, desembocadura del río Lluta (Reg. XV) foto Carlos Vallejos. Centro izq.: **Huairavo de corona amarilla** (*Nyctanassa violacea*), 14 de mayo 2016, puerto de Arica (Reg. XV), foto Charly Moreno. Centro der.: **Tagua común** (*Fulica armillata*), 18 de junio 2016, desembocadura del río Loa (límite Regs. I y II), foto Valeria Martins. Abajo izq.: **Tagua de frente roja** (*Fulica rufifrons*), 18 de junio 2016, desembocadura del río Loa (límite Regs. I y II), foto Valeria Martins. Abajo der.: **Tagua andina** (*Fulica ardesiaca*), 22 de mayo 2015, desembocadura del río Elqui (Reg. IV), foto Humberto Cortés.

Chorlo de pico grueso (*Charadrius wilsonia*), 21 de junio de 2016, desembocadura del río Huasco (Reg. III), Philippe Dandois.

Chorlo de pico grueso (*Charadrius wilsonia*): 1 ejemplar es fotografiado en la desembocadura del río Huasco (Reg. III), el 21.06 (P. Dandois), correspondiendo al tercer registro de esta especie para Chile, y la segunda evidencia publicada.

Batitú (*Bartramia longicauda*): Entre el 08.03 y el 18.04 se reportan 53 observaciones que suman 156 ejemplares, entre Arica (Reg. XV) y La Serena (Reg. IV), confirmando su paso regular por Chile en su viaje migratorio de vuelta a sus sitios de reproducción en Norteamérica (G. Alfsen, R. Barraza, J. Contreras, P. Dandois, F. de Groote, F. Díaz, J. Fuentes, M. Garrido, N. Mercado, Ch. Moreno, F. Olivares, M. Olivares, R. Peredo, A. Silva, P. Valerio).

Zarapito moteado (*Limosa fedoa)*: En la desembocadura del río Elqui (Reg. IV), permanece 1 ejemplar entre el 03.01 y el 12.03, el que probablemente corresponda al mismo individuo reportado en este sitio en temporadas anteriores (R. Barraza, M. Garrido, F. Olivares, M. Olivares, I. Tejeda, L. Ugarte, L. Valdivia, P. Valencia).

Playero occidental (*Calidris mauri*): 1 ejemplar está presente en el humedal de Los Choros (Reg. IV) entre el 31.01 y el 15.05 (L. Ugarte, R. Barraza, R. Condemarín, H. Cortés, M. Garrido, I. Lefort, F. Medrano, N. Mercado, V. Núñez, F. Olivares, M. Olivares, C. Piñones, K. Rojas, L. Valdivia, P. Valencia, C. Vallejos); y 1 ejemplar se observa en la desembocadura del río Choapa (Reg. IV) el 10.02 (K. Horton, M. Olivares).

Becacina chica (*Limnodromus griseus*): Con muy pocos registros en Chile, 1 ejemplar es observado en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV), entre el 31.03 y 13.04 (R. Peredo, J. Fuentes, C. Moreno).

Playero manchado (*Actitis macularius*): Raro en la zona central del país, 1 ejemplar está presente en la desembocadura del río Elqui (Reg. IV) entre el 13.02 y el 29.04 (Leo Ugarte, R. Barraza, R. Condemarín, P. Dandois, F. Olivares, M. Olivares, L. Valdivia, P. Valencia, C. Vallejos).

Arriba Izq.: **Batitú** (*Bartramia longicauda*), 27 de marzo 2016, bofedal del Salar de Quisquito (Reg. II), foto Paulo Valerio. Arriba Der.: **Zarapito moteado** (*Limosa fedoa*), 03 de enero 2016, desembocadura del río Elqui (Reg. IV), foto Pedro Valencia. Centro Izq.: **Playero occidental** (*Calidris mauri*), 14 de mayo 2016, humedal de Los Choros (Reg. IV), foto Freddy Olivares. Centro Der.: **Playero occidental** (*Calidris mauri*), 10 de febrero 2016, desembocadura del río Choapa (Reg. IV), foto Marcelo Olivares. Abajo Izq.: **Becacina chica** (*Limnodromus griseus*), 07 de abril 2016, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Ronny Peredo. Abajo Der.: **Playero manchado** (*Actitis macularius*), 19 de abril 2016, desembocadura del río Elqui (Reg. IV), foto Rubén Barraza.

Arriba Izq.: **Gaviota de las Galápagos** (*Creagrus furcatus*), 25 de marzo 2016, salida pelágica frente a Mejillones (Reg. II), foto Fernando Díaz. Arriba Der.: **Gaviota de las Galápagos** (*Creagrus furcatus*), 10 de febrero 2016, desembocadura del río Maule (Reg. VII), foto Eduardo Costoya. Abajo: **Gaviota de Sabine** (*Xema sabini*), 14 de enero 2016, Golfo de Arauco (Reg. VIII), foto Juan Eduardo Machuca.

Gaviota de las Galápagos (*Creagrus furcatus*): 2 ejemplares son observados en una salida pelágica frente a Mejillones (Reg. II), el 25.03 (F. Díaz, F. de Groote, M. Garrido); y otro ejemplar es fotografiado en la desembocadura del río Maule (Reg. VII) el 10.02 (E. Costoya, R. Chiappe).

Gaviota de Sabine (*Xema sabini*): 6 ejemplares se observan en el Golfo de Arauco, en un viaje pelágico rumbo a la Isla Santa María (Reg. VIII) el 14.01 (J. Machuca, V. Marinovic).

Gaviota cáhuil (*Chroicocephalus maculipennis*): Al norte de su rango habitual, nuevamente es observado 1 ejemplar en la desembocadura del río Lluta, (Reg. XV), entre el 01 y el 26.06 (Ch. Moreno, R. Peredo, A. Puiggros, L. Valdivia, C. Vallejos).

Gaviota reidora (*Leucophaeus atricilla*): Es fotografiado 1 ejemplar en la desembocadura del río San José, Arica (Reg. XV) el 27.02 (Ch. Moreno); y otro ejemplar está presente en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 18.04 (J. Fuentes).

Gaviota peruana (*Larus belcheri*): Al sur de su rango habitual, se observa 1 ejemplar en el puerto de San Antonio (Reg. V) el 26.05 (M. Rojas).

Gaviotín chico boreal (*Sternula antillarum*): El 15.06 es fotografiado 1 ejemplar en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV), correspondiendo al segundo registro de la especie en Chile (J. Fuentes).

Gaviotín de Sandwich (*Thalasseus sandvicensis*): 2 ejemplares se observan en la Laguna Cartagena (Reg. V) entre el 14.01 y el 14.02 (N. Contardo, D. de la Fuente, F. Díaz, E. French, M. Garrido, A. Jaramillo, C. Manning, J. Manning, F. Medrano, E. Navarro, V. Pantoja, C. Pinto, L. Portugal, M. Vanerio); y entre 1 y 3 ejemplares se registran en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) entre el 07.01 y el 12.02 (N. Contardo, D. de la Fuente, F. Díaz).

Arriba Izq.: **Gaviota cáhuil** (*Chroicocephalus maculipennis*), 17 de junio 2016, desembocadura del río Lluta, (Reg. XV), foto Ronny Peredo. Arriba Der.: **Gaviota reidora** (*Leucophaeus atricilla*), 27 de febrero 2016, desembocadura del río San José, Arica (Reg. XV), foto Charly Moreno). Centro Izq.: **Gaviota reidora** (*Leucophaeus atricilla*), 18 de abril 2016, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Jorge Fuentes. Centro Der.: **Gaviota peruana** (*Larus belcheri*), 26 de mayo 2016, San Antonio (Reg. V), foto Manuel Rojas. Abajo Izq.: **Gaviotín de Sandwich** (*Thalasseus sandvicensis*), 14 de febrero 2016, Laguna Cartagena (Reg. V), foto Nelson Contardo; Abajo Der.: **Gaviotín de Sandwich** (*Thalasseus sandvicensis*), 15 de enero 2016, desembocadura del río Maipo (Reg. V), foto Nelson Contardo.

Gaviotín chico boreal (*Sternula antillarum*), 15 de junio 2016, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto Jorge Fuentes.

Arriba Izq.: **Paloma manchada** (*Patagioenas maculosa maculosa*), 26 de junio 2016, Los Chacayes (Reg. VI), foto Caroline Sanchez. Arriba Der.: **Tortolita cuyana** (*Columbina picui*), 06 de enero 2016, Baquedano (Reg. II), foto Nelson Contardo. Abajo Izq.: **Tortolita quiguagua** (*Columbina cruziana*), 31 de enero 2016, Andacollito, valle del río Elqui (Reg. IV), foto Camilo Contreras. Abajo Der.: **Perico cordillerano** (*Psilopsiagon aurifrons*), 11 de febrero 2016, río Las Leñas, cordillera de Machalí (Reg. VI), foto Diego Ramírez.

Paloma manchada (*Patagioenas maculosa maculosa*): Sorprende la presencia de 1 ejemplar en Los Chacayes (Reg. VI), el 26.06 (C. Pinto, C. Sanchez), correspondiendo al segundo registro de esta subespecie en la zona central del país.

Tortolita cuyana (*Columbina picui*): 1 ejemplar es registrado nuevamente en Baquedano (Reg. II) entre el 06.01 y el 25.03 (N. Contardo, F. de Groote, F. Díaz, M. Garrido, L. Portugal, A. Silva), probablemente el mismo informado en la temporada anterior.

Tortolita quiguagua (*Columbina cruziana*): Al norte de su rango conocido, 1 ejemplar es fotografiado en Andacollito, valle del río Elqui (Reg. IV) el 31.01 (C. Contreras).

Perico cordillerano (*Psilopsiagon aurifrons*): Al sur del rango conocido, destaca la observación de 2 ejemplares en el río Las Leñas, cordillera de Machalí (Reg. VI) el 11.02 (D. Ramírez).

Mero chico (*Agriornis murinus*): Sorprende la observación de 1 ejemplar en el Humedal Rocuant-Andalién (Reg. VIII) el 30.01 (A. Maureira), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.

Mero chico (*Agriornis murinus*), 30 de enero 2016, Rocuant-Andalién (Reg. VIII), foto Antonio Maureira.

Arriba Izq.: **Suirirí boreal** (*Tyrannus tyrannus*), 19 de enero 2016, valle de Chaca (Reg. XV), foto Matías Garrido. Arriba Der.: **Suirirí boreal** (*Tyrannus tyrannus*), 06 de enero 2016, Baquedano (Reg. II), foto Nelson Contardo. Abajo Izq.: **Suirirí boreal** (*Tyrannus tyrannus*), 13 de febrero 2016, Estero Mantagua (Reg. V), foto Matías Garrido. Abajo Der.: **Cazamoscas tijereta** (*Tyrannus savana*), 19 de marzo de 2016, Baquedano (Reg. II), foto Charly Moreno.

Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*): En el valle de Chaca (Reg. XV) 3 ejemplares están presentes el 19.01 (M. Garrido); entre 1 y 2 ejemplares de la misma especie se observan en Baquedano (Reg. II) entre el 06.01 y el 20.04 (N. Contardo, F. Díaz, C. Moreno, L. Portugal, A. Silva); y 1 ejemplar más es fotografiado en el Estero Mantagua (Reg. V), el 13.02 (J. Caro, N. Contardo, E. French, M. Garrido, F. Medrano).

Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*): 1 y 2 ejemplares se observan en Baquedano (Reg. II) entre el 19 y el 25.03 (F. de Groote, F. Díaz, M. Garrido, Ch. Moreno, A. Silva).

Zorzal negro (*Turdus chiguanco*): Raro en la zona centro -sur del país, 1 ejemplar es observado en Icalma (Reg. IX), el 09.05 (H. Torres); y 1 ejemplar está presente en el Cerro Guido (Reg. XII) el 11.03 (S. Saiter).

Tenca de alas blancas (*Mimus triurus*): 1 ejemplar es observado en la Estancia Los Colorados (Reg. III) el 27.03 (M. Olivares); otro ejemplar se registra en Minera Los Pelambres, cordillera de Salamanca (Reg. IV) el 20.04 (C. Vallejos); y un tercer ejemplar es fotografiado en las Rocas de Santo Domingo (Reg. V) el 01.05 (J. de la Torre).

Rey del bosque (*Pheucticus aureoventris*): 1 macho es fotografiado en la ciudad de Arica (Reg. XV) el 23.05 (R. Peredo), correspondiendo al tercer registro informado para el país y el segundo con evidencia.

Charlatán (*Dolichonyx oryzivorus*): Sorprende la observación de 1 ejemplar en la vertiente sureste del Salar de Ascotán (Reg. II), el 02 y 03.02 (F. de Groote, A. Ponce); y de un segundo ejemplar en el Humedal Rocuant-Andalien (Reg. VIII) el 29.04 (A. Maureira), correspondiendo estos dos registros a los primeros con evidencia para esta especie en Chile.

Arriba Izq.: **Zorzal negro** (*Turdus chiguanco*), 09 de mayo 2016, Icalma (Reg. IX), foto Hederd Torres. Arriba Der.: **Zorzal negro** (*Turdus chiguanco*), 11 de marzo 2016, Cerro Guido (Reg. XII), foto Sebastián Saiter. Centro Izq.: **Tenca de alas blancas** (*Mimus triurus*), 24 de abril 2016, Minera Los Pelambres, cordillera de Salamanca (Reg. IV), foto Carlos Vallejos. Centro Izq.: **Tenca de alas blancas** (*Mimus triurus*), 01 de mayo 2016, Rocas de Santo Domingo (Reg. V), foto Jorge de la Torre. Abajo: **Rey del bosque** (*Pheucticus aureoventris*) macho, 23 de mayo 2016, Arica (Reg. XV), foto Ronny Peredo.



Charlatán (*Dolichonyx oryzivorus*). Arriba: 03 de febrero 2016, Salar de Ascotán (Reg. II), foto Felipe de Groote; Abajo: 29 de abril 2016, Humedal Rocuant-Andalien (Reg. VIII), foto Antonio Maureira.



Mirlo de pico corto (*Molothrus rufoaxillaris*): Destaca la observación de 1 ejemplar juvenil junto a un **Tordo** (*Curaeus curaeus*) en la comuna de Puente Alto, dentro de la ciudad de Santiago (Reg. Metr.) el 11.01, correspondiendo al registro más al norte conocido para la especie en el país (T. Child). A lo anterior se suman varios registros en los alrededores de San Fernando (Reg. VI), con 1 ejemplar en La Paloma el 02 y 29.01 (C. Valdés); 1 ejemplar en el Cementerio Parque San Fernando el 12.02 (V. Pantoja); y 6 ejemplares en San José de Los Lingues el 16.02 (N. Contardo, E. French, V. Pantoja).

OTROS REGISTROS

Como en otras oportunidades, de forma separada informamos de registros interesantes que llegaron recientemente a nuestra base de datos, y que se refieren a observaciones realizadas con anterioridad al período que cubre el presente Resumen de Avistamientos.

Picaflor cordillerano (*Oreotrochilus leucopleurus*): Muy raro en la costa de Chile central, sobresale la observación de 1 ejemplar en el Parque Tumbes (Reg. VIII) el 15.03.2015 (J. Machuca, B. Farías).

Pájaro amarillo (*Pseudocolopteryx citreola*): Al sur de su rango habitual en el país, 1 ejemplar es fotografiado en Puerto Aysén (Reg. XI) en noviembre 2015 (M. González).

Arriba: **Mirlo de pico corto** (*Molothrus rufoaxillaris*) juvenil junto a un **Tordo** (*Curaeus curaeus*), 11 de enero 2016, Puente Alto, Santiago (Reg. Metr.) el 11.01, foto Tomás Child. Centro: **Picaflor cordillerano** (*Oreotrochilus leucopleurus*), 15 de marzo 2015, Parque Tumbes (Reg. VIII), foto Juan Eduardo Machuca. Abajo: **Pájaro amarillo** (*Pseudocolopteryx citreola*), noviembre 2015, Puerto Aysén (Reg. XI), foto Mauricio González.