



Resumen de Avistamientos, Noviembre 2007- Febrero 2008

por Rodrigo Barros, Fabrice Schmitt y la red de observadores de aves.

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de noviembre de 2007 y febrero de 2008, y que llegaron a la base de datos de la Unión de Ornitólogos de Chile.

Si haces observaciones de aves, tus datos serán siempre muy bienvenidos!!!

No dudes en enviar tus avistamientos, sin olvidar de indicar la fecha, la especie, el número de ejemplares observados y el lugar. Además puedes remitir otra información relevante, como edad, sexo, comportamiento de reproducción, alimentación,...etc. Tampoco olvides de anotar siempre tu nombre completo.

Puedes enviar tus avistamientos al e-group [ObsChile](#), a la página web [Aves de Chile](#) o utilizando la [planilla Excel](#) de la Unión de Ornitólogos de Chile.

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los 45 siguientes observadores:

Paz Acuña; Ignacio Azócar; Rodrigo Barros; Thomas Bitsch; Julien Bottinelli; Roberto Cañete; Humberto Cordero; Lorenzo Demetrio; Fernando Díaz Segovia; Raffaele Di Biase; Luís Espinosa; Bryan Field; Juan Pablo Gabella; Alfredo Gahona; Larry Gardella; Bryan Gates; Christian González; Dean Gushee; Raúl Herrera; Francisca Izquierdo; Gerardo Jara; Álvaro Jaramillo; Mauricio López; Verónica López; A. Mauss; Ricardo Matus; Rodrigo Moraga; Ulises Nancuante; Eduardo Navarro; Diego Núñez; Sara Núñez; Flavio Olivares; Rafael Olivares; Sergio Ostria; Mike Pearman; Eduardo Peña; Ronny Peredo; José Raccoursier; Rodrigo Reyes; C. Roussel; Fabrice Schmitt; Alejandro Simeone; Alfredo Ugarte; María Vukasovic y José Yáñez.

Abreviaciones utilizadas:	ej. = ejemplar (es)	par. = pareja (s)
	he. = hembra (s)	m. = macho(s)
	pol. = polluelo(s)	juv. = juvenil(es)
	inm. = inmaduro (s)	ad. = adulto(s)
	plum. = plumaje	inv. = invierno
	can. = canto, canta, cantaba	



Los avistamientos raros para los cuales no recibimos "prueba" (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un *.

Nuestro Comité Editorial invita a los autores de los avistamientos particularmente raros (registro de especies nuevas o con pocos avistamientos en el país; ampliación de repartición; etc.) a publicarlos en revistas científicas, como el Boletín Chileno de Ornitología.

Aunque es poco habitual comenzar esta crónica por una perdiz, esta vez la iniciamos con 3 ej. de **Perdiz austral** (*Tiamotis ingoufi*) observadas en Bahía Posesión (Reg. XII) en diciembre (C. González), lo que constituye uno de los pocos registros de esta especie en Chile.



Perdiz austral (*Tiamotis ingoufi*), Dic-07, Bahía Posesión (Reg. XII), foto C. González.

Durante el censo de aves acuáticas de Wetlands International, se contabilizaron 655 ej. de **Cisne de cuello negro** (*Cygnus melanocoryphus*) el 05.02 en la Laguna Torca (Reg. VII); 203 ej. de **Cisne coscoroba** (*Coscoroba coscoroba*) y 52 ej. de **Pato gargantillo** (*Anas bahamensis*) el 04.02 en la albufera del humedal El Yali (Reg. V); y el 03.02, en el tranque La Cadellada de Lampa (Reg. Met.) se

avistaron 22 ej. de **Pato negro** (*Netta peposaca*) y los primeros 3 ej. de **Piuquén** (*Chloephaga melanoptera*) observados en baja altura de la temporada (R. Barros, F. Díaz Segovia).

También se reportó 1 ej. de **Cisne de cuello negro** en el humedal de Carrizal Bajo (Reg. III) el 05.01 (F. Schmitt); un grupo importante de 243 ej. de **Canquén** (*Chloephaga poliocephala*) el 15.02 en la laguna Jara cerca de Lonquimay (Reg. IX) (R. Barros); 1 par. con 3 juv. volando de **Caiquén** (*Chloephaga picta*) cerca del embalse El Yeso (Reg. Met.) el 09.02 (A. Jaramillo, R. Matus); más 8 ej. de esta última especie en el lago Colbún (Reg. VII) el 14.02 (A. Jaramillo, R. Matus). También, al norte de su rango habitual, se descubrieron 2 m. junto a 3 he. de **Caranca** (*Chloephaga hybrida*) en Punta Lavapié, costa de Arauco (Reg. VIII) el 21.02 (R. Barros).



Caranca (*Chloephaga hybrida*), 21-Feb-08, Punta Lavapié, costa de Arauco (Reg. VIII), foto R. Barros.

Dos avistamientos de **Pato rana de pico an-**

cho (*Oxyura jamaicensis ferruginea*) fueron realizados en la zona central donde la especie es rara: 2 ej. con 3 pol. no volando el 18.11 en el tranque La Cadellada de Lampa (Reg. Met.) (R. Barros y F. Díaz Segovia), y 1 par. el 12.11 en el embalse El Yeso (Reg. Met.) (R. Reyes).

Para las aves pelágicas, aparte de los avistamientos realizados durante las salidas presentadas a continuación del presente artículo, destacan 1 inm. de **Albatros de las islas Chatham*** (*Thalassarche eremita*) observado el 04.02 durante una salida en alta mar desde Valparaíso



Petrel gigante antártico (*Macronectes giganteus*), 28-Dic-07, Arica (Reg. XV), foto R. Herrera.

Simeone, B. Gates, D. Gushee y B. Field). Además, el 10.02 durante un crucero navegando de norte a sur en la longitud 75°52'W, se observó entre los 45°S y 46°S (Reg. XI), 1 ej. de **Albatros de cabeza gris*** (*Thalassarche chrysostoma*), 3 ej. de **Albatros errante*** (*Diomedea exulans*), 1 ej. de **Petrel azulado*** (*Halobaena caerulea*) y 1 ej. de **Fardela blanca de Juan Fernández*** (*Pterodroma externa*), seguramente el registro más austral para esta última especie (L. Gardella).

También se realizó un censo muy interesante de 55 ej. de **Fardela negra** (*Puffinus griseus*) por minuto desde la punta Guabún en la Isla de Chiloé (Reg. X) el 28.11 (H. Cordero).



Pelícano pardo (*Pelecanus occidentalis*), 12-Dic-07, puerto de Arica (Reg. XV), foto A. Jaramillo.

1 juv. de **Pelícano pardo** (*Pelecanus occidentalis*) es observado en el puerto de Arica (Reg. XV) el 12.12 (A. Jaramillo, R. Matus), y 1 ad. de la misma especie es descubierto el 16.12 en Iquique (Reg. I) al lado de algunos ej. de **Pelícano** (*Pelecanus thagus*) (M. Pearman).

Algunos avistamientos interesante de **Garza cuca** (*Ardea cocoi*), una especie siempre más regular en la zona central, con 28 ej. contabilizados en el Lago Rapel (Reg. VI) el 02.11 (U. Nancuante) y 1 inm. en el humedal de Carrizal Bajo (Reg. III) el 05.01 (F.

Schmitt). También se observaron 2 ej. de **Garza azul** (*Egretta caerulea*) desde el puente de Huasco Bajo (Reg. III) el 04.01 (F. Schmitt), un sector donde esta especie se encuentra regularmente, la que aun no cuenta con pruebas de reproducción en Chile.



Aguilucho langostero (*Buteo swainsoni*), Nov-07, centro de rescate Antofagasta (Reg. II), foto A. Ugarte.

También se encontró 1 ej. de **Flamenco chileno** (*Phoenicopterus chilensis*) en la albufera del humedal El Yali (Reg. V) el 04.02, y 2 ej. de la misma especie el 06.02 en la desembocadura del río Mataquito, al sur de Iloca (Reg. VII) (R. Barros, F. Díaz Segovia).

Se registraron varios avistamientos de interés en el grupo de las aves rapaces esta temporada: 2 ej. de **Águila pescadora*** (*Pandion haliaetus*) fueron encontrados en Mejillones (Reg. II) el 28.02 (L. Demetrio) y otro ej. se observó en el lago Colbún (Reg. VII) el 14.02 (A. Jaramillo, R. Matus). El ya famoso m. de **Vari huevetero** (*Circus buffoni*) fue nuevamente registrado en el humedal de Santa Inés, comuna de Lampa (Reg. Met.),

los días 06 y 07.11 (R. Barros, I. Azócar). Pero lo más notable es sin duda el descubrimiento por C. González, en el mes de noviembre, de 1 ej. de **Aguilucho langostero** (*Buteo swainsoni*) en el centro de rescate de Antofagasta (Reg. II). Lamentablemente, no se sabe con claridad de dónde viene esta ave, y cuándo llegó al centro...

En la desembocadura del río Lluta (Reg. XV), apareció 1 juv. de **Tagua gigante** (*Fulica gigantea*), nueva especie para este famoso lugar, del 09 al 15.12 (A. Jaramillo, R. Matus, R. Peredo). Dentro de la misma familia, 1 ej. de **Tagüita del norte** (*Gallinula chloropus*) es registrada a un costado del tranque La Cadellada en Lampa (Reg. Met.) el 08.11 (P. Acuña, V. López, M. Vukasovic), volviendo a observarse el 18.11 (R. Barros, F. Díaz Segovia, I. Azócar); se escucharon 6 ej. de **Pidén austral** (*Rallus antarcticus*) en el parque Torres del Paine (Reg. XII) el 28.11 (A. Jaramillo, R. Matus), y el 05.01 se contabilizaron 20 ej. de **Tagua común** (*Fulica armillata*) junto a 4 ej. de



Tagua gigante (*Fulica gigantea*), 15-Dic-07, desembocadura del río Lluta (Reg. XV), foto R. Peredo.



Tagüita del norte (*Gallinula chloropus*), 08-Nov-07, tranque La Cadellada (Reg. Met.), foto P. Acuña.



Tagua andina (*Fulica ardesiaca*), 5-Ene-08, Carrizal Bajo (Reg. III), foto F. Schmitt.



Zarapito moteado (*Limosa fedoa*), 04-Feb-08, estero Mantagua (Reg. V), foto R. Reyes.

Tagua andina (*Fulica ardesiaca*) en el humedal de Carrizal Bajo (Reg. III) (F. Schmitt).

Como siempre, el grupo de las aves limícolas viene con buena cantidad de sorpresas: 6 ej. de **Chorlo dorado** (*Pluvialis dominica*); 93 ej. de **Chorlo ártico** (*Pluvialis squatarola*); 18 ej. de **Chorlo semipalmado** (*Charadrius semipalmatus*) y 111 ej. de **Chorlo de doble collar** (*Charadrius falklandicus*) fueron contabilizados en la albúfera del humedal El Yali (Reg. V) el 04.02 (R. Barros, F. Díaz Segovia). Otro ej. de **Chorlo dorado** fue descubierto muy al sur, en la punta Espolón de Caulín (Reg. X) el 27.11 (H.

Cordero) y un grupo inusual de 54 ej. de **Chorlo semipalmado** fue también observado en la desembocadura del río Lluta (Reg. XV) el 09.12 (A. Jaramillo, R. Matus). Adelantándose al otoño, el primer **Chorlo chileno** (*Charadrius modestus*) en la zona central, se registró en Curanipe (Reg. VII) el 07.02 (R. Barros, F. Díaz Segovia), y también 1 ej. de **Zarapito moteado** (*Limosa fedoa*) fue observado el 04.02 en el estero Mantagua (Reg. V) (R. Reyes) ¿Será el mismo individuo que regresa a la zona cada año?.

3 ej. de **Playero ártico** (*Calidris canutus*) fueron encontrados en la playa de Choros (Reg. IV) el 17.11 (R. Moraga) y 2 ej. de la misma especie en la punta Espolón de Caulín (Reg. X) el 27.11 (H. Cordero); 1 ej. de **Playero de lomo blanco** (*Calidris fuscicollis*) en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) el 16.12 (F. Schmitt); 1 ej. de **Playero pectoral** (*Calidris melanotos*) en el estero



Playero ártico (*Calidris canutus*), 17-Nov-07, playa de Choros (Reg. IV), foto R. Moraga.



Playero de lomo blanco (*Calidris fuscicollis*), 16-Dic-07, desembocadura río Maipo (Reg. V), foto F. Schmitt.

Mantagua (Reg. V) el 12.02 (R. Reyes), y el tercer registro chileno con fotografía de **Playero occidental** (*Calidris mauri*) en la laguna Petrel de Pichilemu (Reg. VI) el 05.02 (R. Barros, F. Díaz Segovia). También, se informó de una serie de avistamientos de **Playero semipalmado** (*Calidris pusilla*) para la temporada, demostrando que esta especie es seguramente regular en la zona central: 1 ej. los días 16.12 y 10.02 en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) (A. Jaramillo, R. Matus, F. Schmitt); 1 ej. en Quenuir Bajo (Reg. X) el 19.01 (L. Espinosa); 1 ej. en Caulín (Reg. X) del 21.01 al 04.02 (L. Espinosa, A. Jaramillo, R. Matus); y los efectivos record de 21 ej. en el albufera del humedal El Yali (Reg. V) el 04.02 y 8 ej. en la laguna Petrel de Pichilemu (Reg. VI) el 05.02 (R. Barros, F. Díaz Segovia).

Se observó 1 ad. de morfo claro de **Salteador pomarino*** (*Stercorarius pomarinus*) durante una salida pelágica desde Iquique (Reg. II) el 16.12 (M. Pearman), y 1 ej. de **Salteador de cola larga*** (*Stercorarius longicaudus*) desde la playa de La Serena (Reg. IV) el 28.02 (A. Mauss, J. Bottinelli, T. Bitsch, C. Roussel).

1 ej. de **Gaviota andina** (*Larus serranus*) fue encontrado en baja altura en el tranque Los Molles, comuna de Santo Domingo (Reg. V), el 04.02 (R. Barros, F. Díaz Segovia), y 1 ej. de **Gaviota peruana** (*Larus belcheri*) fue descubierta en la isla Choros (Reg. IV) el 26.02 (A. Mauss, J. Bottinelli, T. Bitsch, C. Roussel).

Para los gaviotines, lo más notable fue un grupo de 960 ej. de **Gaviotín sudamericano** (*Sterna hirundinacea*) en la laguna Petrel de Pichilemu (Reg. VI) el 05.02 (R. Barros, F. Díaz Segovia); 2 ej. de **Gaviotín boreal** (*Sterna hirundo*) en la laguna de Cartagena (Reg. V) los días 05 y 16.12 (A. Jaramillo, R. Matus, U. Nancuante), más 8 ej. de la misma especie en la desembocadura del río Maipo (Reg. V) el 05.12 (A. Jaramillo, R. Matus); y 1 ej. de **Gaviotín de Sandwich** (*Sterna sandvicensis*) en la des-



Playero semipalmado (*Calidris pusilla*) y Playero occidental (*Calidris mauri*), 05-Feb-08, laguna Petrel, Pichilemu (Reg. VI), foto F. Díaz.



Playero semipalmado (*Calidris pusilla*), 21-Feb-08, Caulín, Chiloé (Reg. X), foto L. Espinosa.



Playero semipalmado (*Calidris pusilla*), 10-Feb-08, desembocadura río Maipo (Reg. V), foto F. Schmitt.

Gallina ciega boreal (*Chordeiles minor*), 02-Ene-08, Iquique (Reg. I), foto S. Ostria.

embocadura del río Maipo (Reg. V) el 03.02 (R. Barros, F. Díaz Segovia).

El avistamiento mas sorprendente de la temporada es seguramente el descubrimiento el 02.01 por S. Ostria de un gallina ciega no identificada en el balcón de su casa en Iquique (Reg. I). Después del envío de algunas fotografías a I. Azócar y una identificación realizada por A. Jaramillo, S.



Ostria se pudo enterar que el ave que había fotografiado en su balcón fue nada menos que una nueva especie para Chile: la **Gallina ciega boreal** (*Chordeiles minor*)!!!

1 ej. de **Pájaro amarillo** (*Pseudocolopteryx flaviventris*) es descubierto cerca de Rengo (Reg. VI) el 09.02 (R. Barros, F. Díaz Segovia) y otro es observado en la laguna El Peral (Reg. V) el 10.02 (A. Jaramillo, R. Matus); 1 ej. de **Mero de Tarapacá** (*Agriornis microptera*) está presente en el parque Torres del Paine (Reg. XII) el 28.11 (R. Matus, A. Jaramillo); y 1 ej. del errante **Cazamoscas tijereta** (*Tyrannus savana*) es encontrado en el humedal de Carrizal Bajo (Reg. III) el 02.12 (F. Olivares, G. Jara, A. Gahona).



Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*), 02-Dic-07, Carrizal Bajo (Reg. III), foto G. Jara.



Mero de Tarapacá (*Agriornis microptera*), 28-Dic-07, Torres del Paine (Reg. XII), foto A. Jaramillo.



Pibí occidental (*Contopus sordidulus*), 12-Dic-07, valle de Chaca (Reg. XV), foto A. Jaramillo.



Pibí sp. (*Contopus sp.*), Nov-07, María Elena, valle del río Loa (Reg. II), foto C. González.

Pero lo más espectacular de la temporada para el grupo de los passeriformes, es el descubrimiento de dos cazamoscas del género *Contopus*, un género nuevo para Chile: 1 ej. de **Pibí occidental** (*Contopus sordidulus*), descubierto en la valle de Chaca (Reg. XV) el 12.12 (A. Jaramillo, R. Matus), que corresponde al primer registro para Chile!!! y 1 ej. de **Pibí sp.** (*Contopus sp.*), probablemente de la misma especie que el anterior, observado cerca de María Elena en la valle del río Loa (Reg. II) en noviembre (C. González, R. Olivares, A. Ugarte).



Golondrina barranquera (*Riparia riparia*), 05-Dic-07, Batuco (Reg. Metr.), foto A. Jaramillo.

También se observaron 2 ej. de **Golondrina barranquera** (*Riparia riparia*) y 30 ej. de **Golondrina bermeja** (*Hirundo rustica*) en Batuco (Reg. Metr.) el 05.12 (A. Jaramillo, R. Matus); 15 ej. de **Chirihue dorado** (*Sicalis auriventris*) en la Sierra Baguales (Reg. XII) el 28.11 (A. Jaramillo, R. Matus); y el **Chirihue azafrán** (*Sicalis flaveola*) sigue su expansión en Chile con avistamientos en nuevas localidades: 1 m. can. en Paragua (Reg. X) el 02.02 (A. Jaramillo), 1 m. cerca de Entre Lagos (Reg. X) el 08.02 (A. Jaramillo, R. Matus), 1 ej. aparentemente anidando en una palmera en Los Ángeles (Reg. VIII) el 12.2 (E.

Peña), 1 par. en Puerto Saavedra (Reg. IX) y 1 par. en Nehuentué (Reg. IX) en noviembre (R. Cañete).

