

Excursiones Pelágicas a la Corriente de Humboldt, Noviembre 2007-Febrero 2008



por Rodrigo Reyes

Se informaron cuatro salidas pelágicas durante esta temporada, todas desde la V Región de Valparaíso.

En la salida del 24 de noviembre, destaca la gran cantidad de Fardela blanca (*Puffinus creatopus*), algunos Yunco (*Pelecanoides garnotii*) todavía quedan y no se han ido a sus sitios de nidificación, una solitaria Gaviota de Sabine (*Xema sabini*) y unos Rayadores (*Rynchops niger*) "rayando" la superficie del mar; en la salida del 27 de diciembre, destacan, cuatro ejemplares de Golondrina de mar chica (*Oceanites gracilis*), dos ejemplares de Fardela blanca de Juan Fernández (*Pterodroma externa*) y un ejemplar de Fardela blanca de Más a Tierra (*Pterodroma defilippiana*); en la salida del 13 de diciembre, hubo dos registros muy interesantes, el primero, un ejemplar de Golondrina de mar chica (*Oceanites gracilis*), y el segundo, un ejemplar de Gaviota peruana (*Larus belcheri*), dos especies poco comunes en la zona central; y en la salida del 13 de febrero, destaca un ejemplar de Albatros real del sur (*Diomedea epomophora*) y un ejemplar de Fardela blanca de Juan Fernández (*Pterodroma externa*).



Gaviota dominicana (*Larus dominicanus*), Gaviota garuma (*Larus modestus*), y Gaviotín elegante (*Sterna elegans*), 13-Dic-07, Quintero (Reg. V), foto R. Reyes.

Detalle de las salidas realizadas.

● 24 de noviembre, salida desde Quintero

Participantes: Isabel Arriagada, Gavin Edmonston, Sue Edmonston, Antonio Lizana, Rodrigo Reyes y Jochen Schwarz.

Clima: parcialmente nublado y viento moderado (el mar algo agitado, bastante "movido").

Zarpe: 07:00am.

Regreso: 12:00pm.

● 27 de noviembre, salida desde Valparaíso

Participantes: Barry Walker y un grupo de turistas extranjeros

● **13 de diciembre, salida desde Quintero**

Participantes: Rodrigo Reyes y un grupo de turistas extranjeros.

Clima: nublado hasta las 09:30am. luego despejado. Poco viento.

Zarpe: 07:00am.

Regreso: 13:00pm.

● **13 de febrero, salida desde Valparaíso**

Participantes: Rick Leslie, Janna Leslie, Antonio Lizana, Rodrigo Reyes y Jochen Schwarz.

Clima: despejado y poco viento.

Zarpe: 07:00am.

Regreso: 12:30pm.

Albatros real del sur (*Diomedea epomophora epomophora*), 13-Feb-08, Valparaíso (Reg. V), foto R. Reyes.

Compañeros

Con recubrimiento Easy to Clean

SWAROVSKI
OPTIK
www.swarovskioptik.com

Christian Junemann, Isabel la Católica 4188, Las Condes, Santiago-Chile,
cjunemann@interactiva.cl, 56 09 820 2149 mobile, 56 02 817 31 49 fax



Lista de Aves Observadas (todas las aves observadas desde la embarcación, aves nadando, volando)

	24 nov.	27 nov.	13 dic.	13 feb.
Pingüino de Humboldt (<i>Spheniscus humboldti</i>)	0	x	1	2
Albatros real del norte (<i>Diomedea sanfordi</i>)	+4	+10	0	+3
Albatros real del sur (<i>Diomedea epomophora</i>)	0	1	0	1
Albatros de ceja negra (<i>Thalassarche melanophris</i>)	+7	+25	+6	+4
Albatros de Salvin (<i>Thalassarche salvini</i>)	+15	+25	+11	+12
Petrel gigante antártico (<i>Macronectes giganteus</i>)	+2	20	0	1
Petrel gigante subantártico (<i>Macronectes halli</i>)	+6	1	1	1
Fardela blanca (<i>Puffinus creatopus</i>)	+200	+150	+100	+30
Fardela negra (<i>Puffinus griseus</i>)	+300	x	+2000	+200
Fardela negra grande (<i>Procellaria aequinoctialis</i>)	+7	20	+9	+3
Fardela de Nueva Zelanda (<i>Procellaria westlandica</i>)	+4	+4	+3	+15
Petrel moteado (<i>Daption capense</i>)	+40	+300	+10	+15
Petrel plateado (<i>Fulmarus glacialisoides</i>)	0	+100	0	0
Fardela blanca de Más a Tierra (<i>Pterodroma defilippiana</i>)	0	+2	0	0
Fardela blanca de Juan Fernández (<i>Pterodroma externa</i>)	0	2	0	1
Golondrina de mar (<i>Oceanites oceanicus</i>)	+20	x	+50	+20
Golondrina de mar chica (<i>Oceanites gracilis</i>)*	0	4	1	0
Yunco (<i>Pelecanoides garnotii</i>)	5	1	2	6
Pelicano (<i>Pelecanus thagus</i>)	+100	x	+30	+150
Piquero (<i>Sula variegata</i>)	+50	x	+200	+100
Guanay (<i>Phalacrocorax bougainvillii</i>)	+100	x	+50	+30
Lile (<i>Phalacrocorax gaimardi</i>)	0	0	0	1
Yeco (<i>Phalacrocorax brasilianus</i>)	+30	x	+10	+8
Pollito de mar rojizo (<i>Phalaropus fulicaria</i>)	+35	4	3	0
Salteador chileno (<i>Stercorarius chilensis</i>)	2	1	+4	1
Gaviota dominicana (<i>Larus dominicanus</i>)	+50	x	+50	+150
Gaviota peruana (<i>Larus belcheri</i>)*	0	0	1	0
Gaviota garuma (<i>Larus modestus</i>)	9	0	+20	+4
Gaviota de Franklin (<i>Larus pipixcan</i>)	+120	x	+15	+25
Gaviota de Sabine (<i>Xema sabini</i>)*	1	0	0	0
Gaviotín monja (<i>Larosterna inca</i>)	+10	x	+10	2
Gaviotín sudamericano (<i>Sterna hirundinacea</i>)	+50	0	+200	+3
Gaviotín elegante (<i>Sterna elegans</i>)	+20	0	+100	0
Gaviotín boreal (<i>Sterna hirundo</i>)	x	0	+50	0
Gaviotín ártico (<i>Sterna paradisicaea</i>)	x	0	0	0
Rayador (<i>Rynchops niger</i>)	4	0	0	0

x especie presente pero no contabilizada.

* avistamientos de especies raras para los cuales no hay foto.