

## Presentación Fotográfica del Caiquén

por Rodrigo Reyes

*En este número, Rodrigo Reyes nos presenta una especie que le interesa particularmente, el Caiquén (*Chloephaga picta*). Invitamos a los fotógrafos de aves chilenas a presentarnos una de sus especies favoritas; publicaremos con gusto sus fotografías y textos en uno de los próximos números de La Chiricoca.*



**Caiquén** (*Chloephaga picta*), Ene-06, Valle Piuquén, Cordillera de los Andes (Reg. Metr.), foto R. Reyes.

El Caiquén posee un marcado dimorfismo sexual. El macho tiene la cabeza, cuello, pecho y vientre blanco y el manto es barrado de blanco, pardo y negro; tiene el pico y las patas negras.

La hembra en cambio, posee la cabeza y cuello rojizos, el pecho y el manto es pardo con barras negruzcas y rufas, tiene el vientre como el manto, aunque más blanco; el pico es negro y las patas amarillas.

La hembra puede confundirse con el Canquén colorado (*Chloephaga rubidiceps*) y con el Canquén (*Chloephaga poliocephala*), especialmente con el juvenil de esta especie.



Pareja de Caiquén (*Chloephaga picta*), foto R. Reyes.

Su nombre genérico *Chloephaga* proviene del griego, *kloe* que significa "pasto" y *faga* que significa "comedoras".

Su hábitat comprende zonas abiertas como campos, llanuras y planicies con abundante vegetación rastrera, especialmente pastos tiernos. También en pantanos y otros humedales, bordes de lagunas, arroyos patagónicos y bofedales en la cordillera.



Caiquén (*Chloephaga picta*), Mar-08, Estancia Chacabuco (Reg. XI), foto R. Reyes.



**Caiquén** (*Chloephaga picta*), Ene-06, Valle Piuquénes, Cordillera de los Andes (Reg. Metr.), foto R. Reyes.

En cuanto a la nidificación suele elegir zonas bajas como planicies, pero casi siempre cerca de lagos y lagunas, también en medio de pequeños islotes en lagos, lagunas, ríos y esteros. Aprovecha cualquier hoyo o depresión en el suelo para la construcción de su nido, forrado con plumas, especialmente con sus propias plumas, principalmente aquellas suaves como plumón.



**Caiquén** (*Chloephaga picta*), Ene-06, Valle Piuquénes, Cordillera de los Andes (Reg. Metr.), foto R. Reyes.

Generalmente, una vez que nacen los polluelos, estos se dirigen al agua y allí comienzan una vida casi exclusivamente acuática. Los adultos permanecen junto a ellos o los vigilan de muy cerca desde la orilla, hasta que las crías son capaces de volar, que es recién ahí cuando abandonan el agua.



**Caiquén** (*Chloephaga picta*), Mar-08, Estancia Chacabuco (Reg. XI), foto R. Reyes.

Estas aves son exclusivamente vegetarianas: pastos tiernos, hojas, granos y semillas, constituyen su dieta. Se alimentan casi sólo en tierra, aunque en ocasiones también en el agua.

En Chile, el Caiquén se encuentra desde la Región Metropolitana, específicamente en la Cordillera de los Andes, hasta la Región de Magallanes. Es común desde Aysén hasta Tierra del Fuego.

En esta especie, existen dos fases, una fase barrada y una fase blanca. En el norte de su rango es más común la fase barrada, mientras que en el sur se encuentra principalmente la fase blanca.

En la zona central, se conoce muy poco sobre esta especie, particularmente el tamaño de su población y sus migraciones. Por eso, no dudes a enviar todos tus avistamientos en [eBird](#) !!!

