Excursiones Pelágicas a la Corriente de Humboldt, Marzo-Junio 2008

por Rodrigo Reyes

Se realizaron cuatro salidas pelágicas durante esta temporada, todas desde Valparaíso

En la salida del 7 de marzo, destaca la presencia de un individuo de Fardela de dorso gris (*Puffinus bulleri*) y seis ejemplares de Fardela blanca de Juan Fernández (*Pterodroma externa*); en la salida del 12 de abril, se anota la migración de Fardela negra (*Puffinus griseus*) con más de 15.000 individuos observados, pero también destaca un ejemplar de Far-



Fardela de dorso gris (*Puffinus bulleri*), 07-Mar-08, Valparaíso (Reg. V), foto F. Schmitt.

dela blanca de Masatierra (*Pterodroma defilippiana*), la enorme cantidad de Yunco (*Pelecanoides garnoti*) y dos ejemplares de Picaflor (*Sephanoides sephanoides*) perdidos en el mar durante su migración hacia el norte; el 31 de mayo, no se observó ningún individuo de Fardela blanca (*Puffinus creatopus*), la que migra en el Pacifico norte durante el invierno austral, pero si una gran cantidad de Yunco (*Pelecanoides garnoti*); finalmente en la salida del 28 de junio, destaca la interesante cantidad de Albatros de Salvin (*Thalassarche salvini*), el gran número de Gaviota garuma (*Larus modestus*) y la presencia del Gaviotín sudamericano (*Sterna hirundinacea*).

Detalle de las salidas realizadas:

■ 7 de marzo, salida desde Valparaíso

Participantes: Ignacio Azócar, Thomas Bitsch, Julien Bottinelli, Adrien Mauss, Rodrigo Reyes, Cécilia Roussel, Fabrice Schmitt.

Clima: despejado (la primera hora y media), luego nubosidad parcial, después nublado y lluvia. Viento moderado.

Zarpe: 11:50am. Regreso: 17:50pm.

• 12 de abril, salida desde Valparaíso

Participantes: Andrea Arellano, Pablo Cáceres, Roger Mc Neill, Fabrice Schmitt y Rodrigo Tapia.

Clima: en la mañana nublado, soleado a partir de las 12. El mar estuvo bastante movido lo que no facilitó las observaciones.

31 de mayo, salida desde Valparaíso

Participantes: Ignacio Azócar, Rodrigo Barros, Fernando Díaz, Samuel Lizana, Erik Sandvig, Rodrigo Reyes y Rodrigo Tapia.

Clima: despejado. Poco viento.

Zarpe: 07:30am. Regreso: 13:30pm.

28 de junio, salida desde Valparaíso

Participantes: Rodrigo Barros, Luís Espinosa, Lee Harding, Axel Hultman, Antonio Núñez, Rodrigo Reyes y Rodrigo Tapia. Clima: despejado variando a nubosidad parcial, mar rizado y fuerte viento.

Zarpe: 07:30am. Regreso: 13:30pm.







Fardela blanca de Juan Fernandez (Pterodoma externa), 07-Mar-08, Valparaíso (Reg. V), foto F. Schmitt.

Lista de Aves Observadas (se anotan todas las aves observadas desde la embarcación, aves nadando, volando y/o posadas en islotes o requeríos rodeados por mar):

	7 mar.	12 abr.	31 may.	28 jun.
Pingüino de Humboldt (<i>Spheniscus humboldti</i>)	3	2	1	1
Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus)	0	0	+10	25
Albatros real del norte (<i>Diomedea epomophora sanfordi</i>)	0	3	+5	+2
Albatros de ceja negra (Thalassarche melanophrys)	0	+100	+100	+15
Albatros de Salvin (Thalassarche salvini)	+5	+400	+150	+40
Petrel gigante sp. (Macronectes sp.)			1	+2
Petrel gigante antártico (Macronectes giganteus)	0	1	+1	1
Petrel gigante subantártico (Macronectes halli)	0	3	+1	1
Fardela negra grande (Procellaria aequinoctialis)	+20	+200	+120	+50
Fardela de Nueva Zelanda (Procellaria westlandica)	+7	+20	+12	+5
Petrel moteado (<i>Daption capense</i>)	0	0	+4	+10
Petrel plateado (<i>Fulmarus glacialoides</i>)	0	0	1	1
Fardela negra (<i>Puffinus griseus</i>)	+200	+15000	+100	+4000
Fardela blanca (<i>Puffinus creatopus</i>)	+25	+30	0	0
Fardela de dorso gris (<i>Puffinus bulleri</i>)	1	0	0	0
Fardela blanca de Masatierra (Pterodroma defilippiana)	0	1	0	0
Fardela blanca de Juan Fernández (Pterodroma externa)	+6	3	0	0
Golondrina de mar (Oceanites oceanicus)	+70	0	+10	6
Yunco (<i>Pelecanoides garnoti</i>)	+12	+500	+150	+80



Albatros de Salvin y Fardela de Nueva Zelanda, 7-Mar-08. Valparaíso, foto F. Schmitt.

	7 mar.	12 abr.	31 may.	28 jun.
Pelícano (<i>Pelecanus thagus</i>)	×	+50	+150	×
Piquero (<i>Sula variegata</i>)	+100	+500	×	cientos
Guanay (Phalacrocorax bougainvillii)	+30	20	×	15
Lile (<i>Phalacrocorax gaimardi</i>)	1	10	2	0
Yeco (<i>Phalacrocorax brasilianus</i>)	×	10	×	X
Pollito de mar rojizo (<i>Phalaropus fulicaria</i>)	0	1	0	0
Salteador chileno (Stercorarius chilensis)	1	6	2	+4
Gaviota dominicana (Larus dominicanus)	×	+150	×	miles
Gaviota garuma (<i>Larus modestus</i>)	0	+200	+100	+2000
Gaviota de Franklin (Larus pipixcan)	×	+500	+15	1
Gaviota cáhuil (<i>Larus maculipennis</i>)	0	0	×	+20
Gaviotín monja (<i>Larosterna inca</i>)	×	2	+50	+100
Gaviotín sp. (<i>Sterna sp.</i>)		4	7	
Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea)	0	0	0	12
Gaviotín elegante (Sterna elegans)	0	2	0	0
Picaflor chico (<i>Sephanoides sephanoides</i>)	0	2	0	0

 $^{{\}sf x}$ especie presente pero no contabilizada.

^{*} avistamientos de especies raras para los cuales no hay foto.



Albatros de Salvin (*Thalasarche salvini*), 31-May-08. Valparaíso, foto I. Azócar.