

Resumen de Avistamientos, Enero- Diciembre 2017

por Rodrigo Barros y la red de observadores de aves

Petrel plateado boreal (*Fulmarus glaciaris*), salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso), 11 febrero 2017, foto Fernando Díaz.

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de Enero y Diciembre de 2017, y que llegaron principalmente a través de la base de datos <u>eBird</u>, administrada en el país por la ROC.

Si haces observaciones de aves, tus datos siempre serán muy bienvenidos.

Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema eBird. Con eBird puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten.

Mientras más información agregues a tus avistamientos, como cantidad, edad, sexo o comportamiento de reproducción, más interesantes y útiles serán tus datos.

Si necesitas información sobre identificación o distribución de las aves en Chile, si quieres anunciar el avistamiento de un ave rara o si tienes cualquier duda sobre las aves chilenas, no dudes en participar en el e-group ObsChile.

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los siguientes 125 observadores:

Jorge Abarca, Pilar Aguirre, Jorge Alava, Belén Allendes, Luis Araya, Verónica Araya, Justin Baldwin, Matías Ballarini, Tabare Barreto, Rodrigo Barros, Josh Beck, Bahar Bilgen, Julien Birard, John Black, José Briones, Félix Caamaño, Pablo Cáceres, Diego Calderón, Rodrigo Calderón, Camila Canales, Melissa Carmody, Carlo Catoni, Matías Cavieres, Humberto Cortés, Marco Cortés, Yannig Coulomb, David Couve, Esteban Daniels, Esteban Daquin, Diego Davis, Felipe de Groote, Darío de la Fuente, Cristofer de la Rivera, Fernando Díaz, Ignacio Díaz, José Díaz, Raffaele Di Biase, Nicolás Escobar, Mario Figueroa, Francisco Flores, Edwin French, Jorge Fuentes, Dafna Gallil, Matías Garrido, Felipe González, Luis González (Turismos Orca), María Antonieta González, Mauricio González, Iván Guerra, Steve Howell, Pamela Huaiquimil, Daniel Imbernón, Santiago Imberti, Marcie Jacklin, Marie Jacklin, Mats Jonasson, Fidel Lara, Gustavo Lezana, José Luis Lineros, Francisco Lira, Carolyn Long, Eva Lydick, Mauricio Marchan, Pío Marshall, Daniel Martínez, Valeria Martins, Becky Marvil, Klaudio Maturana, Viviana Maturana, Ricardo Matus, Fernando Medrano, Diego Miranda, Jake Mohlmann, Santiago Montaner, Daniel Morales, Charly Moreno, María Fernanda Mosqueira, Cristián Muñoz, Marcelo Muñoz, Eduardo Navarro, Freddy Olivares, Marcelo Olivares, Liliana Ortiz, Magnus Oskarsson, Ricardo Oyarzún, Carlos Pallacán, Vicente Pantoja, Guido Pavez, Ronny Peredo, Cristián Pinto, César Piñones, Andrés Puiggros, Eduardo Quintanilla, Mario Razeto, Rodrigo Reyes, Juan Pablo Rider, Paola Rossi (SAG), SAG Arica, Sebastián Saiter, Fabrice Schmitt, Jürgen Schulmeister, Ariel Silva, José Manuel Silva, Rodrigo Silva, Bryan Sperry, Noah Strycker, Claudio Stuardo, Rodrigo Tapia, Ivo Tejeda, Daniel Terán, Robert Tizard, Jorge Toledo, Marcelo Torrejón, Romina Triviño, Phil Ullman, Gilda Valderrama, Pedro Valencia, Carolina Vargas, Mario Vásquez, Esteban Villanueva, Caterina Vivero, Ivor Williams, Sebastián Yancovic (Manu Project), Rigoberto Yáñez, Ricardo Zambrano.

Los avistamientos particularmente raros para los cuales no recibimos "prueba" (foto, grabación de sonido, etc.) son señalados con un *.





Arriba: Pato silbón pampa (Dendrocygna viduata), Parque Humedal Los Batros, San Pedro de la Paz (Reg. Biobío) 06 diciembre 2017, foto Caterina Vivero. Centro Izq.: Pato silbón de ala blanca (Dendrocygna autumnalis) desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 23 febrero 2017, foto Verónica Araya. Centro Der.: Pato silbón de ala blanca (Dendrocygna autumnalis), Laguna Cartagena (Reg. Valparaíso), 14 noviembre 2017, foto Rigoberto Yáñez. Abajo Izq.: Pato de alas azules (Spatula discors), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 16 noviembre 2017, foto Verónica Araya. Abajo Der.: Pato real (Mareca sibilatrix), desembocadura del río Loa (Reg. Tarapacá), 29 julio 2017, foto Charly Moreno.



Pimpollo tobiano (*Podiceps gallardoi*), Laguna Santa María, Tierra del Fuego (Reg. Magallanes), 15 enero 2017, foto Becky Marvil.

Pato silbón pampa (*Dendrocygna viduata*): Con pocos registros en el país, un ejemplar es fotografiado en el Parque Humedal Los Batros, en San Pedro de la Paz (Reg. Biobío) el 06.12 (C. Vivero).

Pato silbón de ala blanca (*Dendrocygna autumnalis*): Un ejemplar se registra en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 23.02 (V. Araya, J. Fuentes); y otro más es fotografiado en la Laguna Cartagena (Reg. Valparaíso) el 14.11 (R. Yáñez), correspondiendo estos avistamientos a uno de los pocos de la especie en Chile.

Pato de alas azules (*Spatula discors*): Aparentemente una pareja está presente en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 15.11 y 28.11 (B. Bilgen, J. Mohlmann, V. Araya, R. Di Biase, F. Lara, R. Peredo, C. Piñones, R. Tapia), aunque solo el macho es reportado en todo el período, y solo algunos observadores dan cuenta de la hembra, la que es fácil de confundir con la hembra de **Pato colorado** (*Spatula cyanoptera*), especie abundante en este sitio.

Pato real (*Mareca sibilatrix*): Bastante al norte de su rango conocido en el país, un ejemplar es avistado en la desembocadura del río Loa (Reg. Tarapacá) entre el 17.07 y 29.07 (J. Briones, V. Martins, C. Moreno).

Pimpollo tobiano (*Podiceps gallardoi*): Siempre raro en Chile, un ejemplar se observa en Laguna Los Palos (Reg. Magallanes) el 04.02* (R. Matus); y otro más está presente en la Laguna Santa María, Tierra del Fuego (Reg. Magallanes) entre el 09.01 y el 06.04 (D. Calderón, R. Calderón, M.F. Mosqueira, M. Ballarini y 19 observadores más).

Guácharo (*Steatornis caripensis*): Sorprende el encuentro de un ejemplar en la ciudad de Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 06.06 (info SAG Arica), siendo el tercer registro conocido de esta especie en el país.

Vencejo de collar (*Streptoprocne zonaris*): Un ejemplar es observado en el sector de la Cascada Invertida (Reg. Maule) el 23.01* (C. Catoni), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.



Arriba: **Guácharo** (*Steatornis caripensis*), ciudad de Arica (Reg. Arica y Parinacota), 06 junio 2017, foto SAG Arica. Abajo: **Vencejo de collar** (*Streptoprocne zonaris*), Cascada Invertida (Reg. Maule), 29 diciembre 2017, foto Daniel Morales.



Picaflor azul (Colibri coruscans), Socoroma (Reg. Arica y Parinacota), 16 abril 2017, foto José Luis Lineros.

El 23.12 se observa nuevamente un ejemplar en el mismo sitio (F. Caamaño) y el 29.12, otros 9 ejemplares más (D. Imbernón, D. Morales). Detalles de estos registros se pueden revisar en: Tejeda, I., Garrido, M., Montecino, S., French, E., Imbernón, D. & De la Fuente, D. 2018. Primeros registros de Vencejo de collar (*Streptoprocne zonaris*) en Chile. La Chiricoca 23: 15-20.

Picaflor azul (*Colibri coruscans*): Destaca la observación de un ejemplar echado sobre su nido en Socoroma (Reg. Arica y Parinacota) el 16.04 (J. L. Lineros), cuya fotografía sería la primera evidencia de nidificación de esta especie en el país.

Tagüita purpúrea (*Porphyrio martinica*): Con siempre pocos registros en Chile, un juvenil está presente en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 26.06 y el 20.10 (J. Abarca, F. Díaz, J. Fuentes, F. Medrano, C. Moreno, I. Teje-

da, R. Tizard); un adulto es fotografiado en el mismo sitio el 19.12 (J. Fuentes); y en Tocopilla (Reg. Antofagasta), un ejemplar juvenil es observado el 01.07 (F. González).

Burrito negruzco (*Porzana spiloptera*): Sorprende la observación de un ejemplar en la Laguna del Inca (Reg. Valparaíso) el 02.04 (R. Oyarzún), donde se obtienen las primeras fotografías de esta nueva especie para Chile. La identificación de este ejemplar solo se logró en marzo de 2019, cuando nuevos registros de la especie se realizaron en la región del Biobío. Para más detalles, ver artículo sobre esta especie en este mismo número de La Chiricoca (páginas 4 al 10).

Chorlo de pico grueso (*Charadrius wilsonia*): Con solo 3 registros anteriores en el país, un ejemplar está presente en la desembocadura del río Huasco (Reg. Atacama) entre el 24.06 y 20.08 (C. Moreno,



Arriba Izq.: **Tagüita purpúrea** (*Porphyrio martinica*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 26 junio 2017, foto Jorge Abarca. Centro Izq.: **Tagüita purpúrea** (*Porphyrio martinica*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 19 diciembre 2017, foto Jorge Fuentes. Arriba Der.: **Tagüita purpúrea** (*Porphyrio martinica*) Tocopilla (Reg. Antofagasta), 01 julio 2017, foto Felipe González. Abajo:**Burrito negruzco** (*Porzana spiloptera*), Laguna del Inca (Reg. Valparaíso), 02 abril 2017, foto Ricardo Oyarzún.



Chorlo de pico grueso (Charadrius wilsonia), desembocadura del río Huasco (Reg. Atacama), 24 junio 2017, foto Freddy Olivares.

F. Olivares, B. Allendes, F. Díaz, K. Maturana, E. Navarro, R. Silva). El año 2016 se observó un ejemplar en el mismo sitio y en la misma fecha, pudiendo corresponder al mismo individuo.

Pilpilén austral (Haematopus leucopodus): Bastante al norte de su rango habitual en el país, un ejemplar es fotografiado en la playa Los Burros, península de Hualpén (Reg. Biobío) el 04.01 (M. Marchan).

Caití (*Recurvirostra andina*): Siempre raro en la costa, 2 ejemplares se observan en la desembocadura del río Copiapó (Reg. Atacama) el 04.07 (M. Cortés).

Zarapito polinésico (*Numenius tahitiensis*): Destaca la observación de un ejemplar en el sector Pakaia, Isla de Pascua (Reg. Valparaíso) el 28.11 (Info S. Yancovic, Manu Project, @RapaNuiBirds), correspondiendo a la primera evidencia concluyente para esta especie en el país.

Zarapito moteado (*Limosa fedoa*): Un ejemplar está presente en la desembocadura del estero Tongoy

(Reg. Coquimbo) entre el 11 y 29.12 (F. Olivares, M. Torrejón, C. Vargas, H. Cortés, I. Díaz, F. Flores).

Pollito de mar boreal (*Phalaropus lobatus*): Con siempre pocas evidencias de su presencia en el país, destaca el registro de 5 ejemplares en una salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 22.03 (R. Tapia).

Playero manchado (*Actitis macularius*): Raro en la zona sur del país, un ejemplar es observado a orillas del río Trancura (Reg. Araucanía) el 10.02 (P. Marshall).

Pitotoy solitario (*Tringa solitaria*): Sorprende un ejemplar en una laguna del sector Valle Volcanes, en Puerto Montt (Reg. Los Lagos), el 09.10 (G. Lezana), cuyas fotografías documentan uno de los pocos registros con evidencia para esta especie en Chile.

Playero gris (*Tringa incana*): Siempre raro en el país, un ejemplar es observado en el Motu Nui, Isla de Pascua (Reg. Valparaíso) el 11.04* (M. Jonasson).



Arriba Izq.: Pilpilén austral (*Haematopus leucopodus*), playa Los Burros, península de Hualpén (Reg. Biobío), 04 enero 2017, foto Mauricio Marchan. Arriba Der.: Caití (*Recurvirostra andina*), desembocadura del río Copiapó (Reg. Atacama), 04 julio 2017, foto Marcos Cortés. Abajo: Zarapito polinésico (*Numenius tahitiensis*), sector Pakaia, Isla de Pascua (Reg. Valparaíso), 28 noviembre 2017, foto Hotel Vai Moana.

Gaviota de Sabine (*Xema sabini*): Destaca la observación de un ejemplar en la desembocadura del Río de las Minas, Punta Arenas (Reg. Magallanes), entre el 06 y 29.04 (F. Medrano, M. Carmody, C. De la Rivera, J. Díaz, S. Imberti, S. Saiter, J. Schulmeister, R. Tapia), bastante al sur de sus registros regulares en el país.

Gaviota reidora (*Leucophaeus atricilla*): Un ejemplar se observa en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 09.01 y 18.01 (J. Fuentes, F. Díaz, F. Medrano) y el 13.05 (J. Abarca, J. Fuentes, I. Guerra, C. Moreno, A. Puiggros); además de 3 ejemplares observados en una salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 22.03* (R. Tapia).



Arriba Izq.: **Zarapito moteado** (*Limosa fedoa*), desembocadura del estero Tongoy (Reg. Coquimbo), 11 diciembre 2017, foto Freddy Olivares. Arriba der.: **Pollito de mar boreal** (*Phalaropus lobatus*), salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota), 22 marzo 2017, foto Rodrigo Tapia. Abajo Izq.: **Playero manchado** (*Actitis macularius*), río Trancura (Reg. Araucanía), 10 febrero 2017, foto Pio Marshall. Abajo Der.: **Pitotoy solitario** (*Tringa solitaria*), sector Valle Volcanes, Puerto Montt (Reg. Los Lagos), 09 octubre 2017, foto Gustavo Lezana.

Gaviotín apizarrado (Onychoprion fuscatus): Raro en la costa de Chile continental, un ejemplar es fotografiado en la desembocadura del río Elqui (Reg. Coquimbo) el 13.01 (M. Olivares).

Gaviotín chico boreal (*Sternula antillarum*): Nuevamente se observa en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre 1 y 3 ejemplares, los que están presentes entre el 25.07 y el 18.10 (M.A. González, V. Araya, F. Díaz, F. Lara, F. Medrano, C. Moreno, R. Peredo, I. Tejeda).

Pingüino papúa (Pygoscelis papua): Con pocos registros en el país, un ejemplar es fotografiado en

Agua Fresca, al sur de Punta Arenas (Reg. Magallanes) el 16.07 (Info R. Matus); y otro ejemplar es observado en el Canal Beagle (Reg. Magallanes) el 15.01* (F. Schmitt).


Pingüino antártico (*Pygoscelis antarcticus*): Siempre raro en Chile, un ejemplar se observa en Río Amarillo, al sur de Punta Arenas (Reg. Magallanes) el 07.12 (J. Schulmeister).

Albatros de las Galápagos (*Phoebastria irrorata*): Con muy pocos registros en el país, un ejemplar es fotografiado en una salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 22.03 (R. Tapia); y otro



Arriba: Gaviota de Sabine (*Xema sabini*), desembocadura del Río de las Minas, Punta Arenas (Reg. Magallanes), 17 abril 2017, foto Jürgen Schulmeister. Centro Izq.: Gaviota reidora (*Leucophaeus atricilla*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 18 enero 2017, foto Fernando Medrano. Centro Der.: Gaviota reidora (*Leucophaeus atricilla*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 13 mayo 2017, foto Charly Moreno. Abajo Izq.: Gaviotín apizarrado (*Onychoprion fuscatus*), desembocadura del río Elqui (Reg. Coquimbo), 13 enero 2017, foto Marcelo Olivares. Abajo Der.: Gaviotín chico boreal (*Sternula antillarum*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 29 julio 2017, foto Ronny Peredo.





Arriba: **Pingüino papúa** (*Pygoscelis papua*), Agua Fresca, al sur de Punta Arenas (Reg. Magallanes), 16 julio 2017, foto Info R. Matus. Abajo: **Pingüino antártico** (*Pygoscelis antarcticus*), Río Amarillo, al sur de Punta Arenas (Reg. Magallanes), 07 diciembre 2017, foto Jürgen Schulmeister.

ejemplar está presente en las cercanías de la Reserva Marina Isla Chañaral (Reg. Coquimbo) el 24.01 (L. González - Turismos Orca).

Albatros de frente blanca (*Thalassarche cauta*): En una salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso) son observados 2 ejemplares el 22.07 (R. Barros, F. Díaz, E. French, M. Garrido, D. Martínez, R. Matus, S. Montaner, E. Navarro, C. Stuardo, D. Terán, E. Villanueva); y un ejemplar es fotografiado frente a la isla Contreras (Reg. Magallanes) el 19.02 (F. Schmitt, S. Howell, E. Lydick, B. Sperry, P. Ullman).

Golondrina de mar de vientre blanco (*Fregetta grallaria*): Rara frente a las costas de Chile continental, al menos un ejemplar es observado 17 millas frente a Punta Lavapié (Reg. Biobío) el 16.02 (F. Schmitt, S. Howell, E. Lydick, B. Sperry, P. Ullman).

Golondrina de mar fueguina (*Oceanites oceanicus chilensis*): Nuevamente se registra esta especie en zonas interiores de Chile central, con un ejemplar encontrado en Pisco Elqui (Reg. Coquimbo) el 06.02 (P. Aguirre); y otro ejemplar en Los Queñes (Reg. Maule) el 21.03 (M. Cavieres).



Arriba Izq.: **Albatros de las Galápagos** (*Phoebastria irrorata*), salida pelágica frente a Arica (Reg. Arica y Parinacota), 22 marzo 2017, foto Rodrigo Tapia. Arriba Der.: **Albatros de las Galápagos** (*Phoebastria irrorata*), cercanías de la Reserva Marina Isla Chañaral (Reg. Coquimbo), 24 enero 2017, foto Turismos Orca. Abajo Izq.: **Albatros de frente blanca** (*Thalassarche cauta*), salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso), 22 julio 2017, foto Eduardo Navarro. Abajo Der.: **Albatros de frente blanca** (*Thalassarche cauta*), frente a la isla Contreras (Reg. Magallanes), 19 febrero 2017, foto Steve Howell.

Golondrina de mar subantártica (*Garrodia nereis*): Un ejemplar es observado en una salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso) el 27.05, siendo las fotografías obtenidas la primera evidencia conocida de esta especie en Chile (E. Quintanilla, B. Allendes, R. Barros, P. Cáceres, F. Díaz, M. Garrido, K. Maturana, E. Navarro, C. Pinto, J. Toledo).

Golondrina de mar de cara blanca (*Pelagodroma marina*): A lo menos 6 ejemplares son observados 43 millas frente a las costas de la Región de la Araucanía el 16.02 (F. Schmitt, S. Howell, E. Lydick, B. Sperry, P. Ullman); y otro ejemplar es registrado frente a la Península de Taitao (Reg. Aysén) el 18.02 por el mismo grupo de observadores.

Golondrina de mar peruana (Oceanodroma tethys): La noche del 26.04 son encontrados 5 volantones en el suelo y 5 más revoloteando sobre las luces de la Aduana del Loa (Reg. Antofagasta). La noche del 28.04 se registran 25 volantones más en el mismo sitio (5 en el suelo y 20 revoloteando sobre las luces), además de 3 volantones bajo luces en Caleta Chipana, 10 km. más al norte de la Aduana. Lo anterior sugiere la existencia de una colonia de reproducción no lejos de esta área, la que correspondería a la segunda para esta especie en Chile (R. Barros, R. Silva).

Golondrina de mar de collar (Oceanodroma hornbyi): Destaca el descubrimiento de la primera




Arriba: Golondrina de mar de vientre blanco (*Fregetta grallaria*), 17 millas frente a Punta Lavapié (Reg. Biobío), 16 enero 2017, foto Fabrice Schmitt. Abajo Izq.: Golondrina de mar fueguina (*Oceanites oceanicus chilensis*), Pisco Elqui (Reg. Coquimbo), 06 febrero 2017, foto Pilar Aguirre. Abajo Der.: Golondrina de mar fueguina (*Oceanites oceanicus chilensis*), Los Queñes (Reg. Maule), 21 marzo 2017, foto Matías Cavieres.

colonia de nidificación de esta especie, la que es encontrada en Pampa del Indio Muerto, al norte de Diego de Almagro (Reg. Atacama) el 03.04 (R. Barros, F. de Groote, F. Medrano, I. Tejeda). Más detalles de este descubrimiento se pueden revisar en: Barros, R., Medrano, F., Silva, R. & de Groote, F. 2018. First breeding site record of Hornby's Storm Petrel *Oceanodroma hornbyi* in the Atacama Desert, Chile. Ardea 106: 203–207.

Petrel plateado boreal (Fulmarus glaciaris): Un

ejemplar de morfo oscuro es fotografiado en una salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso) el 11.02 (J. Beck, F. Díaz, M. Garrido, M. Muñoz, C. Piñones, G. Valderrama) correspondiendo no solo al primer registro de esta especie en Chile, sino también al primero de la especie para Sudamérica. Más detalles de este avistamiento se pueden revisar en: Marín, M., Díaz, F., González, R., Garrido, M. & Beck, J. 2017. First South American record of the Northern Fulmar *Fulmarus glacialis*. Marine Ornithology 45: 121–122.









Arriba Izq.: **Petrel de collar gris** (*Pterodroma mollis*), Estrecho de Magallanes (Reg. Magallanes), 16 marzo 2017, foto Ivo Tejeda. Abajo Izq.: **Petrel de Cook** (*Pterodroma cookii*), 43 millas frente a las costas de Puerto Saavedra (Reg. Araucanía), 16 febrero 2017, foto Steve Howell. Derecha: **Petrel paloma de pico ancho** (*Pachyptila vittata*), Isla de Pascua (Reg. Valparaíso), 01 julio 2017, foto Ángela Pakarati.

Petrel de collar gris (*Pterodroma mollis*): Un ejemplar es registrado en el Estrecho de Magallanes, desde el ferry que conecta Punta Arenas con Porvenir (Reg. Magallanes) el 16.03 (M. Garrido, I. Tejeda), correspondiendo al segundo registro con evidencia para la especie en el país; y otro ejemplar es observado a tres millas del Cabo de Hornos (Reg. Magallanes) el 14.03* (N. Strycker).

Petrel de Cook (*Pterodroma cookii*): Con pocos registros documentados para el país, es fotografiado un ejemplar 43 millas frente a las costas de Puerto

Saavedra (Reg. Araucanía) el 16.02 (F. Schmitt, S. Howell, E. Lydick, B. Sperry, P. Ullman).

Petrel paloma de pico ancho (*Pachyptila vittata*): Es encontrado un ejemplar en Isla de Pascua (Reg. Valparaíso) el 01.07 por Ángela Pakarati (Info S. Yancovic, Manu Project, @RapaNuiBirds), correspondiendo al primer registro de esta especie en la isla y el cuarto documentado para el país.

Fardela atlántica (*Puffinus puffinus*): Un ejemplar es fotografiado en una salida pelágica frente a Quintero (Reg. Valparaíso) el 28.01 (M. Oskarsson,



Arriba Izq.: **Fardela atlántica** (*Puffinus puffinus*), salida pelágica frente a Quintero (Reg. Valparaíso), 28 enero 2017, foto Magnus Oskarsson. Arriba Der.: **Fardela atlántica** (*Puffinus puffinus*), 32 millas frente a Cobquera (Reg. Biobío), 16 febrero 2017, foto Fabrice Schmitt. Abajo: **Fardela atlántica** (*Puffinus puffinus*), Seno del Reloncaví (Reg. Los Lagos), 30 diciembre 2017, foto Justin Baldwin.



Arriba: **Ave fragata magnífica** (*Fregata magnificens*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 04 febrero 2017, foto Charly Moreno. Abajo Izq.: **Piquero blanco/de Nazca** (*Sula dactylatra/granti*), cercanías de la Reserva Marina Isla Chañaral (Reg. Coquimbo), 01 enero 2017, foto Luis González - Turismos Orca. Abajo Der.: **Piquero café** (*Sula leucogaster*), Motu Iti, Isla de Pascua (Reg. Valparaíso), 01 abril 2017, foto Cristián Pinto.

R. Reyes); otro más se observa aproximadamente a 32 millas mar adentro, frente a las costas de Cobquecura (Reg. Biobío) el 16.02 (F. Schmitt, S. Howell, E. Lydick, B. Sperry, P. Ullman); y un tercero para la temporada es registrado en el Seno del Reloncaví (Reg. Los Lagos) el 30.12 (J. Baldwin).

Ave fragata magnífica (Fregata magnificens): Una hembra es fotografiada en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 04.02 (J. Fuentes, C. Moreno), correspondiendo a la primera evidencia de esta especie en el país.

Piquero blanco/de Nazca (*Sula dactylatra/granti*): Un ejemplar es observado en las cercanías de la

Reserva Marina Isla Chañaral (Reg. Coquimbo) el 01.01 (Luis González - Turismos Orca), cuya fotografía no permite precisar la especie.

Piquero café (*Sula leucogaster*): Un ejemplar es registrado en el sector de los Motus, Isla de Pascua (Reg. Valparaíso) entre el 27.03 y el 01.04 (D. de la Fuente, C. Pinto), siendo observado trasladando material para el nido, lo que representa el primer indicio de reproducción de esta especie en la isla.

Huairavo de corona amarilla (*Nyctanassa violacea*): Un ejemplar es registrado en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 10.06 y 13.09 (V. Araya, E. Daquin, F. Díaz, J.



Arriba Izq.: Garcita azulada (*Butorides striata*), desembocadura del río Copiapó (Reg. Atacama), 16 febrero 2017, foto Darío de la Fuente. Arriba Der.: Garcita azulada (*Butorides striata*), Hacienda María Isabel, valle de Copaipó, (Reg. Atacama), 07 septiembre 2017, foto Diego Davis. Abajo Izq.: Garza tricolor (*Egretta tricolor*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 07 julio 2017, foto Verónica Araya. Abajo Der.: Huairavo de corona amarilla (*Nyctanassa violacea*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 18 junio 2017, foto Verónica Araya.

Fuentes, M.A. González, F. Lara, F. Medrano, C. Moreno, R. Peredo).

Garcita azulada (*Butorides striata*): Un ejemplar está presente en la desembocadura del río Copia-pó (Reg. Atacama) el 16.02 (D. de la Fuente); y otro se registra en el tranque de la Hacienda María Isabel, valle de Copaipó (Reg. Atacama), el 07.09 (D. Davis).

Garza tricolor (*Egretta tricolor*): Permanece un ejemplar en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 07.07 y 26.08 (V. Araya, J. Fuentes, M.A. González, F. Lara, C. Moreno, C.

Pallacán, R. Peredo).

Fiofío sp. (*Myiopagis sp.*): En el marco de levantamientos de información en terreno para el proyecto NuevaUnión, es fotografiado un Tyránido de difícil identificación, aproximadamente a 2.600 msnm en Quebrada Seca, cordillera de Vallenar (Reg. Atacama), el 28.03 (I. Fernández, A. Vielma, R. Donoso, L. Ortiz). Luego de discutir las fotografías obtenidas con varios especialistas, se confirmó como un ejemplar del género Myopagis, probablemente un *Myiopagis viridicata*, lo que corresponde a una nueva especie para Chile.







Arriba: **Saca-tu-real** *rubinus* (*Pyrocephalus rubinus rubinus*), río Vacas Heladas, sector Las Hediondas (Reg. Coquimbo), 05 marzo 2017, foto Freddy Olivares. Abajo: **Picabuey** (*Machetornis rixosa*), desembocadura de la Laguna Icalma (Reg. Araucanía), 08 febrero 2017, foto Rodrigo Barros.



Arriba Izq.: **Benteveo** (*Pitangus sulphuratus*), Molinos (Reg. Arica y Parinacota), 25 febrero 2017, foto Charly Moreno. Arriba Der.: **Benteveo** (*Pitangus sulphuratus*), Camarones (Reg. Arica y Parinacota), 27 octubre 2017, foto Fernando Medrano. Abajo: **Benteveo** (*Pitangus sulphuratus*): Jardín Botánico de la Universidad de Talca (Reg. Maule), 23 mayo 2017, foto Luis Araya.

Mosqueta boreal/saucera (Empidonax alnorum/ trailli): Un ejemplar es fotografiado en Molinos, valle del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 23.02 (J. Fuentes), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile. Es altamente probable que se trate de *E. alnorum*, pero solo con las imágenes obtenidas, no es posible descartar a *E. traillii*. Estas dos especies se pueden identificar con seguridad solo a través del canto.

Saca-tu-real *rubinus* (*Pyrocephalus rubinus* ru*binus*): Un macho es registrado en el río Vacas

Heladas, sector Las Hediondas (Reg. Coquimbo), entre el 26.02 y 05.03 (P. Valencia, H. Cortés, F. Olivares, M. Olivares), correspondiendo a una de las pocas evidencias de la subespecie nominal en el país.

Picabuey (*Machetornis rixosa*): Es fotografiado un ejemplar cerca de la desembocadura de la Laguna Icalma (Reg. Araucanía) el 08.02, correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile (R. Barros, V. Maturana).





Arriba: Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*), rotonda Saucache, Arica (Reg. Arica y Parinacota), 16 marzo 2017, foto Andres Puiggros. Centro: Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 01 enero 2017, foto Ricardo Zambrano. Abajo Izq.: Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*), Caleta Chañaral de Aceituno (Reg. Atacama), 11 diciembre 2017, foto Guido Pavez. Abajo Der.: Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*), valle de Azapa (Reg. Arica y Parinacota), 21 octubre 2017, foto Fernando Medrano.



Izquierda: **Suirirí boreal** (*Tyrannus tyrannus*), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 06 enero 2017, foto Jorge Fuentes. Arriba Der.: **Suirirí boreal** (*Tyrannus tyrannus*), Las Maitas, valle del río Azapa (Reg. Arica y Parinacota), 17 enero 2017, foto Iván Guerra. Abajo Der.: **Suirirí boreal** (*Tyrannus tyrannus*), Molinos, valle del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 28 noviembre 2017, foto Rodrigo Tapia.

Benteveo (*Pitangus sulphuratus*): Un ejemplar es fotografiado en Molinos (Reg. Arica y Parinacota) el 25.02 (C. Moreno, J. Fuentes); otro ejemplar es observado en Camarones (Reg. Arica y Parinacota) el 26.05 (J. Fuentes, F. Olivares) y fotografiado el 27.10 (F. Medrano); y un ejemplar está presente en el Jardín Botánico de la Universidad de Talca (Reg. Maule) entre el 23.05 y el 04.06 (L. Araya, D. Miranda, C. Muñoz, D. Gallil, C. Canales, D. de la Fuente, V. Pantoja, I. Tejeda).

Benteveo de vientre azufre (*Myiodynastes luteiventris*): Un ejemplar es observado en Molinos (Reg. Arica y Parinacota) entre el 23 y 25.02 (J. Fuentes, C. Moreno), correspondiendo al segundo registro de esta especie en el país.

Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*): 2 ejemplares son observados en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 01.01 (R. Zambrano); otros 3 ejemplares se observan en la rotonda Saucache, Arica (Reg. Arica y Parinacota) el

16.03 (A. Puiggros); uno más en el valle de Azapa (Reg. Arica y Parinacota) el 21.10 (F. Medrano); y un ejemplar está presente en Caleta Chañaral de Aceituno (Reg. Atacama) el 11.12 (G. Pavez).

Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*): Un ejemplar está presente en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 06.01 (J. Fuentes); otro ejemplar es fotografiado en Las Maitas, valle del río Azapa (Reg. Arica y Parinacota), el 17.01 (I. Guerra); y uno más se reporta en Molinos, valle del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 28.11 (R. Tapia).

Burlisto castaño (*Casiornis rufus*): Destaca la observación de un ejemplar en Putre (Reg. Arica y Parinacota) el 13.03 (M. González), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.

Golondrina doméstica (*Progne chalybea*): Un ejemplar es registrado en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 06.01* (J. Fuentes), probablemente el mismo ejemplar observado





Arriba: Golondrina negra (*Progne elegans*), Chile Chico (Reg. Aysén), 31 enero 2017, foto Eduardo Quintanilla. Centro Izq.: Zorzal negro (*Turdus chiguanco*), Agua Buena (Reg. O'Higgins), 30 julio 2017, foto Francisco Lira. Centro Der.: Zorzal negro (*Turdus chiguanco*), Juntas del Toro (Reg. Coquimbo), 08 julio 2017, foto Freddy Olivares. Abajo, Izq.: Zorzal negro (*Turdus chiguanco*), La Colorada (Reg. Coquimbo), 08 diciembre 2017, foto Freddy Olivares. Abajo Der.: Zorzal negro (*Turdus chiguanco*), Ojos de Agua, cajón del río Aconcagua (Reg. Valparaíso), 28 octubre 2017, foto Pamela Huaiquimil.



Charlatán (Dolichonyx oryzivorus), desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), 08 noviembre 2017, foto Paola Rossi (SAG).

a fines del 2016 en el mismo sitio, e informado en el Resumen de Avistamientos de La Chiricoca N° 23.

Golondrina negra (*Progne elegans*): Con pocos registros en Chile, hasta un máximo de 3 ejemplares son observados en Chile Chico (Reg. Aysén) entre el 31.01 y 01.02 (E. Quintanilla), destacando la observación de una hembra alimentando dos pollos el 31.01, en un nido ubicado en el techo de una construcción, correspondiendo al primer registro de nidificación de esta especie en el país.

Zorzal negro (*Turdus chiguanco*): Siempre raro en la zona central del país, 2 ejemplares se observan en Juntas del Toro (Reg. Coquimbo) entre el 08 y 16.07 (F. Olivares, C. Vargas, B. Allendes, K. Maturana); un ejemplar se registra en La Colorada (Reg. Coquimbo) el 08.12 (F. Olivares, C. Vargas); un ejemplar es fotografiado en Ojos de Agua, cajón del río Aconcagua (Reg. Valparaíso) el 28.10 (P. Huaiquimil); y un ejemplar está presente en Agua Buena (Reg. O'Higgins) entre el 24.06 y el 17.09 (F. Lira).

Charlatán (*Dolichonyx oryzivorus*): El 08.11 un equipo del SAG captura un ejemplar en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), correspondiendo al tercer registro con evidencia para esta especie en el país (info Paola Rossi-SAG).

Arañero cara negra (*Geothlypis aequinoctialis*): Destaca la observación de un ejemplar en el Humedal Quebrada El Yeco, al norte de Mirasol (Reg. Valparaíso) el 25 y 26.05 (N. Escobar, R. Triviño, F. Díaz, M. Garrido, F. Medrano, E. Navarro, E. Quintanilla), correspondiendo al primer registro de esta especie para Chile.

Candelita americana (*Setophaga ruticilla*): Con pocos avistamientos en el país, un ejemplar es fotografiado en Baquedano (Reg. Antofagasta) el 07.01 (A. Silva).

Pitiayumí (*Setophaga pitiayumi*): En los jardines de la Universidad de Concepción, Concepción (Reg. Biobío), el 14.06 es fotografiado un ejemplar (M. Razeto), que corresponde al primer registro de esta especie en el país.



Arriba: **Arañero cara negra** (*Geothlypis aequinoctialis*), Humedal Quebrada El Yeco, Mirasol (Reg. Valparaíso), 26 mayo 2017, foto Romina Triviño. Abajo Izq.: **Candelita americana** (*Setophaga ruticilla*), Baquedano (Reg. Antofagasta), 07 enero 2017, foto Ariel Silva. Abajo Der.: **Pitiayumí** (*Setophaga pitiayumi*), Universidad de Concepción, Concepción (Reg. Biobío), 14 junio 2017, foto Mario Razeto.

Rey del bosque (*Pheucticus aureoventris*): Entre el Pukará de Quitor y la Garganta del Diablo, en San Pedro de Atacama (Reg. Antofagasta), el 08.05 es fotografiado un ejemplar (J.M. Silva), correspondiendo al cuarto registro de esta especie para Chile, y al tercero con evidencia fotográfica.

Pepitero (Saltator aurantiirostris): Un ejemplar es

observado en Panguipulli (Reg. Los Ríos) el 18.09 (M. Vásquez), correspondiendo probablemente a la subespecie *nasica*, propia del centro-oeste de Argentina (sin poder descartar del todo a la subespecie *aurantiirostris*, del norte de Argentina), y no a la observada regularmente en el extremo norte de Chile (*spp. albociliaris*).



Arriba: **Rey del bosque** (*Pheucticus aureoventris*), entre el Pukará de Quitor y la Garganta del Diablo, en San Pedro de Atacama (Reg. Antofagasta), 08 mayo 2017, foto José Silva. Abajo: **Pepitero** (*Saltator aurantiirostris*), Panguipulli (Reg. Los Ríos), 18 septiembre 2017, foto Mario Vásquez.