



Pareja de Gallina ciega chica,
Cerro Chuño, Arica.
25 de mayo de 2023
foto: Pablo Gutiérrez

Notas sobre la reproducción de la Gallina ciega chica (*Quechuavis decussata*) y su depredación por parte de un Vari ceniciente (*Circus cinereus*) en Arica.

por Pablo Gutiérrez, Montserrat Del Campo-Parod y Marcela Astudillo

Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC)

La Gallina ciega chica (*Quechuavis decussata*) es un pequeño caprimúlvido que se distribuye entre la costa de Perú y el extremo norte de Chile. Es relativamente común en zonas áridas, valles agrícolas y lechos de ríos en la Región de Arica y Parinacota, con menor presencia en Tarapacá y con escasos registros en el norte de Antofagasta (del Hoyo *et al.* 2024, eBird 2025). Pese a ser un ave común en su rango, muchos aspectos de su historia natural son aún desconocidos o escasamente descritos, tales como su reproducción, movimientos, dieta y depredadores asociados (Salazar 2018).

A modo general, las distintas especies de gallinas ciegas (Caprimulgidae) comparten características en común en cuanto a su nidificación. La hembra coloca uno a dos huevos de color blanquecino de manera directa en el suelo, sin recubrimientos, los

cuales son incubados en promedio desde 16 a 22 días (Winkler *et al.* 2024). En el caso de la Gallina ciega chica, los antecedentes de su reproducción son limitados y en su mayoría fueron descritos cuando la especie aún se consideraba una subespecie de la Gallina ciega común (*Systellura longirostris*). Los huevos son de color blanquecino y de un tamaño de 26,9–27,8 mm × 19,8–20,4 mm (Schonwetter 1966). En Chile los registros de nidificación son escasos: Goodall *et al.* (1946) reportaron un nido encontrado en el valle del río Lluta, Arica, con un polluelo recién salido del huevo a mediados de noviembre de 1943, atribuyéndolo a la subespecie *atripunctata* de la Gallina ciega común. Luego Johnson (1967) corrigió la identificación de este hallazgo, vinculándolo a *decussata*. De manera más reciente, en 2018, se observó un polluelo de pocos días de edad en el mismo valle del río Lluta, a fines de septiembre (Lara *en eBird* 2018).

FIGURA 1
Vari ceniciento depredando
ejemplar de Gallina ciega chica,
cerro Chuño, Arica.
17 de julio de 2025.
foto: Pablo Gutiérrez



FIGURA 2

Plumerío de Gallina ciega chica depredada, cerro Chuño, Arica.

17 de julio de 2025.

FOTO: Pablo Gutiérrez

FIGURA 3

Sitio de nidificación de Gallina ciega chica, cerro Chuño, Arica.

17 de julio de 2025.

FOTO: Pablo Gutiérrez

El día 17 de julio de 2025, durante un traslado vehicular en el cerro Chuño, Arica, avistamos un ejemplar de Vari ceniciento (*Circus cinereus*) en vuelo sobre el camino. Esta rapaz se distribuye desde los Andes de Colombia y Ecuador hasta Tierra del Fuego y gran parte del Cono Sur (Bierregaard *et al.* 2020), sin embargo, en la Región de Arica y Parinacota es un ave escasa, con menos de 15 registros

en los últimos cinco años, detectándose de forma ocasional individuos solitarios aparentemente en movimiento a otros sitios (eBird 2025). Por esta razón, decidimos seguir al ejemplar para observar y documentar su comportamiento. El ave sobrevoló la pampa a baja altura por unos momentos, para luego posarse en el suelo y tomar rápidamente una presa con sus garras cerca de una zona con rocas. Observamos por unos minutos a una distancia prudente para evitar estresar al ave, acercándonos una vez que ésta había terminado de alimentarse, alejándose luego del sitio (Figura 1). Cabe destacar que mientras el vari se alimentaba, se encontraba un Halcón perdiguero (*Falco femoralis*) posado a unos 10 metros de distancia, hostigando al primero cuando éste emprendió el vuelo.

En el sitio donde se alimentó el Vari ceniciento observamos un gran plumerío (Figura 2), pudiendo identificar al individuo depredado como un macho de Gallina ciega chica (*Quechuaavis decussata*). Sorpresivamente, a pocos metros de las plumas, detectamos un pequeño huevo, evidenciando que el vari había cazado a la gallina ciega mientras incubaba. El sitio de nidificación se encontraba a 361 MSNM y correspondía a una pequeña oquedad, de profundidad menor a 1 cm, en suelo arenoso junto a una roca de mediano tamaño (Figura 3). El hábitat inmediato del sitio del nido es una planicie sin pendiente en la cima del Cerro Chuño, desprovista de vegetación y con presencia de sustrato arenoso y piedras de pequeño y mediano tamaño no superpuestas entre sí. El huevo era de color crema blanquecino, sin pintas ni manchas y con un peso de 6.2 gramos (Figura 4). Se tomaron las medidas del huevo, con un alto de 27.1mm y ancho de 20.5mm, las que coinciden con lo descrito por Schonwetter (1966). El huevo fue también revisado a través de una fuente de luz, observando irrigación en su interior, confirmando que se trataba de un huevo activo con un embrión en desarrollo.





FIGURA 4
Pesaje de huevo de Gallina ciega
chica, cerro Chuño, Arica.
17 de julio de 2025.
foto: Montserrat Del Campo-Parod

Este registro incidental y su posterior descripción logran entregar nuevos antecedentes a la reproducción de la Gallina ciega chica, detallándose en específico: nueva fenología asociada a incubación en invierno, presencia del macho en el rol de incubación, nueva presa para el Vari ceniciento y nuevo depredador para la Gallina ciega chica. Por otro lado, se describe el sitio de nidificación y se confirman las medidas del huevo descritas por Schonwetter hace 60 años. Resulta relevante recalcar que numerosos aspectos de la historia natural de las especies del país permanecen poco estudiados y los eventos o hallazgos documentados por observadores y observadoras constituyen un aporte relevante para el avance del conocimiento científico.

Literatura citada

- Bierregaard R.O; G.M.Kirwan, P.F.D.Boesman, & J.S.Marks. **2020**. Cinereous Harrier (*Circus cinereus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.cinhar1.01>
- del Hoyo J; N.Collar, & G.M.Kirwan. **2024**. Tschudi's Nightjar (*Quechuavis decussata*), version 1.1. In Birds of the World (J. del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bawnig3.01.1>
- eBird. **2025**. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>.
- Goodall J.D; A.W.Johnson & R.A.Philippi B. **1946**. Las Aves de Chile su conocimiento y sus costumbres. Tomo Primero. Platt Establecimientos Gráficos S.A. Buenos Aires, Argentina
- Johnson A.W. **1967**. The Birds of Chile and Adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru, Volume II. Platt Establecimientos Gráficos S.A. Buenos Aires, Argentina
- Salazar J. **2018**. Gallina ciega chica *Systellura decussata* (pág. 144-145). En: Medrano F; R.Barros, H.V. Norambuena, R. Matus & F. Schmitt. 2018. Atlas de las aves nidificantes de Chile. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Santiago, Chile.
- Schonwetter M. **1966**. Handbuch der Oologie. Lieferung 11. Berlin: Akademie-Verlag.
- Winkler D.W; S.M.Billerman, & I.J.Lovette. **2024**. Nightjars and Allies (Caprimulgidae), version 2.0. In Birds of the World (S.M.Billerman, B.K.Keeney, P.G.Rodewald, and T.S.Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.caprim2.02>