



Trile de cabeza canela
(*Chrysomus ruficapillus*)
Quilmo, Chillán Viejo
(Reg. Ñuble)
04 de noviembre 2019
foto: Karla Díaz

El Trile de cabeza canela (*Chrysomus ruficapillus*) en Chile

por Karla Díaz¹ & Rodrigo Barros²

1. Consultora Ambiental Pilmaiquén
2. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (roc)

El Trile de cabeza canela (*Chrysomus ruficapillus*) es un ictérico sudamericano que se encuentra regularmente en marismas (permanentes o temporales), arrozales, praderas húmedas y campos agrícolas, entre Guayana Francesa y Argentina. Se reconocen dos subespecies: *C. r. frontalis*, en la costa de la Guayana Francesa y este de Brasil; y *C. r. ruficapillus*, en el este de Bolivia, sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste y centro de Argentina. Presenta dimorfismo sexual, siendo el macho de color negro con ligero brillo azulado, con la corona y la garganta castañas; y la hembra de un color café apagado, con estrías pardas oscuras. Es una especie gregaria en todas las estaciones del año, formando grandes colonias en la época de nidificación. La mayoría se desplaza estacionalmente, dependiendo de los cambios en el nivel del agua o de los ciclos de cosecha del arroz, migrando al norte las poblaciones más meridionales durante el invierno austral (Fraga 2020).

El único registro de esta especie para Chile lo realizó Toribio Larraín Gandarillas a principios de marzo de 1920, en su propiedad de Malloco, Región Metropolitana, quien observó varios grupitos de cuatro a seis individuos alimentándose de insectos entre perales y manzanos de un huerto, cazando un macho juvenil que pasó a formar parte de la colección del museo del Seminario de los RR.PP. Redentoristas de San Bernardo (Housse 1941, 1945). Martínez y González (2004) consignan que este registro histórico no fue considerado por publicaciones posteriores (e.g. Goodall *et al.* 1946; Philippi 1964; Johnson 1967; Araya y Millie 1986). No obstante aquello, Marín (2004) lo rescata, sumando al Trile de cabeza canela a su Lista de la Aves de Chile como una «especie rara». Habiendo desaparecido el museo de San Bernardo y no existiendo antecedentes sobre el destino del espécimen, Barros (2015) propuso eliminar a *Chrysomus ruficapillus* de la lista para el país, considerando además que podría corresponder a una especie introducida como ave de jaula.

FIGURA 1
Quilmo, Chillán Viejo
(Reg. Ñuble)
04 de noviembre 2019
foto: Karla Díaz





FIGURAS 2, 3 y 4
Trile de cabeza canela
(*Chrysomus ruficapillus*)
Quilmo, Chillán Viejo
(Reg. Ñuble)
04 de noviembre 2019
FOTO: Karla Díaz

Tendrían que pasar casi 100 años para tener noticias nuevamente de la presencia de esta especie en Chile. El 04 de noviembre de 2019, en el contexto de un trabajo de limnología en unas pequeñas lagunas al sur del estero Quilmo ($36^{\circ}41'37,74''\text{S}$ – $72^{\circ}09'44,73''\text{O}$), comuna de Chillán Viejo, Región de Ñuble (Figura 1), KD logró avistar un macho que se encontraba en un totoral junto a un grupo de entre 10 a 15 individuos de **Trile** (*Agelasticus thilius*). Dentro de las vocalizaciones escuchadas había una distinta que le llamó la atención, lo que la llevó a internarse dentro del totoral, logrando fotografiar al ejemplar en cuestión (Figuras de portada, 2, 3 y 4). Este registro correspondería al segundo de la especie en Chile, y al primero con evidencia verificable.

Respecto a su origen, parece razonable pensar que su llegada al país haya ocurrido de forma natural, toda vez que corresponde a un migrante austral parcial, donde sus poblaciones más meridionales se dispersan en otoño hacia latitudes más norteñas (Mazar Barnett & Pearman 2001). Por otro lado, la Región de Ñuble presenta potenciales pasos fronterizos con Argentina de altitudes menores a 2.000 MSNM que facilitarían el cruce de la cordillera de los Andes, existiendo registros de la especie en las provincias argentinas a la misma latitud, incluso más al sur: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro (Arenas 2017, eBird 2025).

Literatura citada

Araya, B. & G.Millie. 1986. Guía de campo de las aves de Chile. Primera edición, Editorial Universitaria, Santiago.

Arenas, C. 2017. Primer registro de Varillero Congo (*Chrysomus ruficapillus*) para la Provincia del Neuquén, Argentina. Nótulas Faunísticas - Segunda Serie, 225: 1-3

Barros, R. 2015. Algunos Comentarios a la Lista de las Aves de Chile. La Chiricoca 20: 57-78.

Fraga, R. 2020. Chestnut-capped Blackbird (*Chrysomus ruficapillus*), version 1.0. En Birds of the World (J. del Hoyo, A.Elliott, J.Sargatal, D.A.Christie & E. de Juana, Editores). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

Goodall, J.D; A.W.Johnson & R.A.Philippi 1946. Las aves de Chile, su conocimiento y sus costumbres.Tomo Primero. Platt Establecimientos Gráficos S.A; Buenos Aires.

Housse, R.E. 1941. Dos nuevas especies en la avifauna de Chile. El Hornero 8(1): 46-55.

Housse, R.E. 1945. Las aves de Chile en su clasificación moderna, su vida y costumbres. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago.

Johnson, A.W. 1967. The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Perú. Tomo Segundo. Platt Establecimientos Gráficos S.A; Buenos Aires.

Marín, M. 2004. Lista comentada de las aves de Chile. Lynx Edicions, Barcelona.

Martínez, D. & G.González. 2004. Las Aves de Chile, nueva guía de campo. Ediciones del Naturalista, Santiago.

Mazar Barnett, J. & M.Pearman. 2001. Lista comentada de las aves argentinas. Lynx Edicions, Barcelona.

Philippi-B, R.A. 1964. Catálogo de las aves de Chile con su distribución geográfica. Investigaciones Zoológicas Chilenas 11:1-179.